

[実態調査]

第4回透析医療費実態調査報告（その2）

鈴木 満 吉田豊彦 山崎親雄

1 実態調査の目的

2 集計方法

3 集計結果

- 1) 病院・診療所の全施設集計結果
 - 2) 病院と診療所別の集計結果
 - 3) 200床以上の病院と200床以下の病院および診療所間の集計結果とその比較
 - 4) 男女別集計結果
 - 5) 診療所と病院の男女別集計結果
- 以上については、本誌第16巻1号85頁を参照。

6) 年齢別比較の集計結果

40歳未満（N=346）、40歳以上から65歳未満（N=2,944）、65歳以上から70歳未満（N=623）および70歳以上の4群に分けて診療行為別を比較した。表6-1は、表6-3から表6-7までの結果を、表6-2は、表6-8のP値を要約した表である。

[請求合計]

40歳未満の群では45,233点、40歳以上から65歳未満では44,805点、65歳以上から70歳未満では44,095点、70歳以上では43,692点であった。40歳未満の群と40歳以上から65歳未満の群および65歳以上から70歳未満の群と70歳以上の群の間では有意差を認めない。表6-2に示すようにその他の年齢群間では有意差がある。請求合計の平均点では、加齢に伴って請求点数が低い。

[除夜障手]

請求合計と同様で、40歳未満の群と40歳以上から65歳未満の群および65歳以上から70歳未満の群と70歳以上の群の間では有意差を認めない。表6-2に示すようにその他の年齢群間では有意差がある。除夜障手の平均点では、加齢に伴って請求合計と異なり点数が高い。

[20:投薬]

投薬の請求点数は40歳未満で1,504点、40歳以上から65歳未満で1,735点、65歳以上から70歳未満で1,904点、そして70歳以上で1,834点を示した。40歳以上から65歳未満の群と70歳以上の群間に有意差は認めない。65歳以上から70歳未満の群と70歳以上の群間にも同様に有意差を認めない。

[30:注射]

注射の請求点数は、40歳未満で3,872点、40歳以上から65歳未満で4,009点、65歳以上から70歳未満で4,567点、そして70歳以上で4,688点である。加齢に伴って請求合計が高くなるが、40歳未満の群と40歳以上から65歳未満の群および65歳以上から70歳未満の群と70歳以上の群の間では有意差を認めない。表6-8の[うちEPO]をみると、EPOの使用量（請求点数）は、40歳未満と40歳以上から65歳未満の群間では有意差がないが、40歳未満と65歳以上から70歳未満の群間および40歳未満と70歳以上の群間には有意差が認められる。40歳以上から65歳未満と65歳以上から70歳未満の群間および65歳以上から70歳未満と70歳以上の群間には、有意差がない。

[13:指導]、[14:在宅]、[夜間]、[50:手術]、[60:検査]、[70:画像]そして[80:その他]には

年齢別の有意差は認められない。

7) 透析医療費の透析歴別比較

透析歴別の医療費比較を透析歴10年未満（N=2,879）、10年以上15年未満（N=829）と15年以上（N=990）の3群に分けて比較した。その総括表が表7-1である。表7-1の詳細は、表7-3, 4, 5, 6に示すごとくである。表7-2は、表7-7のP値の主な診療行為を一覧に示した表である。10年未満の平均年齢は58.7歳で平均透析歴は4.3年である。10年以上15年未満の平均年齢は56.8歳で平均透析歴は12.1年である。15年以上では、平均年齢は56.1歳で平均透析歴は19.8年であった。

[請求合計]

透析歴10年未満は44,559点で10年以上15年未満は44,505点となり、15年以上では44,665点であった（表7-1）。請求合計に、3群間の有意差は認められない（表7-2）。

[除夜障手]

透析歴10年未満は42,569点で10年以上15年未満は42,179点となり、15年以上では41,741点であった（表7-1）。10年未満の群と10年以上15年未満の群間のみ有意差が認められる（表7-2）。

[20:投薬]

投薬の平均点数は、透析歴10年未満は1,813点で10年以上15年未満は1,683点となり、15年以上では1,683点であった（表7-1）。3群間に投薬点数に有意差はない。

[30:注射]

注射の平均点数は、透析歴10年未満は4,341点で10年以上15年未満は4,257点となり、15年以上では3,769点であった（表7-1）。

うちEPOの請求点数は、それぞれ、4,199点、4,299点、3,893点である（表7-3, 4, 5）。10年未満と10年以上15年未満の群間のみ有意差がない（表7-7）。したがって、15年以上は、EPOの使用量に伴う請求点数が10年未満と10年以上15年未満の2群より低い。

[40:処置]

処置の平均点数は、透析歴10年未満は33,887点で10年以上15年未満は34,170点となり、15年以上では34,695点であった（表7-1）。10年未満と15

年以上で約1,000点の有意差があり15年以上の処置点数が高い（表7-2）。処置項目で併せて請求されるダイアライザ（ダイア計）、透析時間、夜間加算と障害加算をみると、ダイア計で10年未満と15年以上に有意差があり（表7-7）、ダイア計は10年未満が4,580点（表7-3）、15年以上は4,694点（表7-5）であり、15年以上の群で10年未満より高いダイアライザを使用している。

[13:指導]、[14:在宅]、[夜間]、[50:手術]、[60:検査]、[70:画像]そして[80:その他]には透析歴の長短による有意差は認められない。

8) 院内処方と院外処方群の比較

院内処方は3,423人になされ、院外処方は1,228人の27.7%にされている。表8-1は、院内・院外処方別比較とP値を示す。他に86人が併用され（表8-4）、薬が投薬されていない患者が11人いる（表8-5）。表8-2、表8-3および表8-6の総括表が表8-1である。

[請求合計]

請求合計は、院内処方が院外処方より1,002点高い。

[除夜障手]

請求合計と同様に、院内処方が院外処方より1,237点高い。

[20:投薬]

投薬は、院内処方の群は1,792点で院外処方は22点であり、院内処方が院外処方より、当然、1,770点高い。

[30:注射]

注射に有意差はない。

[40:処置]

院外処方の群が298点、院内処方群より高い。

年齢と透析歴と共に、[13:指導]、[14:在宅]、[夜間]、[50:手術]、[60:検査]、[70:画像]そして[80:その他]には院内・院外処方別の有意差は認められない。

9) DM群と非DM群の透析医療費比較

インシュリン注射を行っている患者群をDM群とし、それ以外の群を非DM群として比較した。表9-1は、表9-4および表9-5の比較表である。表9-2

は、表 9-6 と表 9-7 に示した病院における DM・非 DM 群の比較および表 9-14 の P 値をまとめた表である。表 9-3 は診療所における (表 9-12, 13) DM・非 DM 群の比較および表 9-14 の P 値をまとめた。病院の規模別による (表 9-8, 9, 10, 11) DM・非 DM 群の比較は資料提示のみとする。

9-1) DM・非 DM 別比較 (表 9-1)

病院診療所の DM (N=348) の [請求合計] は、47,666 点で非 DM (N=4,400) は 44,293 点で、当然、インシュリン注射・合併症に対する注射の投与および投薬により DM 群が高い。[除夜障手] でも同様で、DM 群は [20:投薬] で 733 点、[30:注射] で 446 点が高い。[14:在宅] は DM 群で 1,956 点が請求されるが、非 DM 群での請求はない。

9-2) 病院における DM・非 DM 別比較 (表 9-2)

DM 群は平均年齢が 61.7 歳で非 DM 群の 57.6 歳と比較して年齢が 4.1 歳高い。平均透析歴は 4.9 年で非 DM 群の 9.4 年より 4.5 年短い。

[請求合計]

DM 群 (N=210) は 48,044 点で非 DM 群 (N=2,373) の 44,496 点よりも 3,548 点高い。

[除夜障手]

請求合計と同様に、DM 群が 45,516 点で非 DM 群の 42,337 点より 3,179 点高い。

[14:在宅]

在宅は DM 群でのみ 1,890 点が、当然、請求されている。

[20:投薬]

投薬は、DM 群は 2,636 点で非 DM 群の 1,791 点より 845 点高い。

[80:その他]

DM 群で 1,028 点、非 DM 群が 938 点の請求があり、DM 群が高い。

[13:指導] [30:注射] [40:処置] [夜間] [50:手術] [60:検査] [70:画像] には、病院における DM・非 DM 別比較の有意差は認められない。

9-3) 診療所における DM・非 DM 別比較 (表 9-3)

DM 群は平均年齢が 60.7 歳で非 DM 群の 57.4 歳と比較して DM 群の年齢が 3.3 歳高い。平均透析歴

は 5.5 年で非 DM 群の 9.2 年より 3.7 年短い。

[請求合計]

DM 群 (N=138) は 47,091 点で非 DM 群 (N=2,027) の 44,057 点よりも 3,034 点高い。

[除夜障手]

請求合計と同様に、DM 群が 44,559 点で非 DM 群の 41,777 点より 2,782 点高い。

[14:在宅]

在宅は DM 群でのみ 2,056 点が請求され、当然、非 DM 群には請求されていない。

[20:投薬]

投薬は、DM 群は 2,133 点で非 DM 群の 1,579 点より 554 点高い。

[80:その他]

病院とは異なり、診療所では有意差がない。

[13:指導] [30:注射] [40:処置] [夜間] [50:手術] [60:検査] [70:画像] には、病院と同様に診療所における DM・非 DM 別比較の有意差は認められない。

4. 第 1 回調査から今回までの比較 (表 10-1, 2)

2000 年度調査では協力施設数が 128 施設で、有効調査総数は 4,748 人であった。調査回数を経るごとに増加している。ただし、1999 年と比較すると、病院に通院する透析患者が 544 人増加したが診療所のそれは 315 人減少した。

月当たりの透析回数は 13 回で、平均年齢は 57.8 歳と 1 年前の 56.9 歳より 0.9 歳高くなっていた。透析歴は 9.0 年と前回調査より 0.3 年長くなり、4 年前の 1997 年の 8.5 年とは 0.5 年の透析歴の延長がある。

診療行為別にみると、平成 12 年改定 (2000 年 4 月) で慢性維持透析患者外来医学管理料が 2,900 点から 2,800 点に引き下げられたことによって、1999 年 6 月では 3,025.8 点であった管理指導料が 2,920.6 点に下がっている。

インシュリンの在宅自己注射指導管理料を表す在宅注射の請求頻度は 7.3% を示し、1999 年よりも 1% 増加した。ちなみに 1997 年には 7.8% であったが 34 施設での集計であり、1998 年以降の 6.1%、6.3% (1999 年) と今回の 7.3% の推移から自己注射を行っている糖尿病患者の透析医療への移行が確実に増加していると考えられる。

投薬は、薬価の引き下げにもかかわらず1,755.5点と改定前の1,684.3点より月額で71.2点増加したが、1999年調査の院内処方群の投薬請求は1,740.8点であり、2000年調査の院内処方群の投薬請求は1,791.8点である。1999年調査で院外処方が13.3%から26.5%に倍増したための影響と考える。また、今回調査で病院の平均投薬点数が1,858.0点で診療所の平均投薬点数が1,618.3点と病院の投薬点数が有意に高い要因は病院の患者数が約500人増加し診療所の患者が約300人減少したことによるとも考えうる。

EPOの注射を受けている患者は全体の79.6%であり、1999年の前回調査より0.9%増加している。第1回調査では72.7%であったが、経年的に増加している。

今回調査による夜間加算の請求は30.3%で1999年の前回調査の31.1%とは0.8%の減少であったが、第1回調査から30%前後を推移している。

障害者加算は20.8%の患者に請求されている。1999年の前回調査では17.6%で3.2%の増加がみられた。

いわゆる包括外の検査については、575.1点が請求されている。1999年の前回調査では665.3点で、90.2点減少している。今回調査から生体検査を分析することにした。4,748人の内、検査が請求された患者数は1,554人であり、928人に生体検査が、661人に検体検査が行われている。生体検査の平均点数は

708.0点で中央値および最頻値が550点を示していることから、主に超音波検査が請求されたと推測される。

画像診断は、4,748人中3,768人(79.4%)に行われ、217.7点が請求されている。第1回調査では365.8点であった。1999年の前回調査では4,519人中3,713人(82.2%)に161.2点が請求されている。

透析食は、点数が不変であるところから、変化はない。

院外処方は、27.7%の1,228人に処方箋が発行されている。1998年の第2回調査で13.3%を示し第3回調査では、ほぼ、倍増したが、2000年の今回調査では1.2%の増加である。

請求合計から夜間加算、障害者加算と手術・麻酔の診療行為を除いた外来通院透析の標準請求点数といえる除夜障害手術は、第1回調査から減少を継続して月額42,303.5点である。1999年の前回調査より792.0点の減少である。

透析1回当たりでの請求点数は、3,254.1点であり、1999年の前回調査より1回当たり60.9点の減少である。減少点数は予測より少なかったが、前回調査は改定直後であったので、2001年に行われる第5回調査結果との比較が望まれる。

第3回調査から行われたⅡ型ダイアライザの使用率は98.2%である。すなわち、Ⅰ型のダイアライザの使用は4,748人中の86人(1.8%)のみである。

表 6-1 年齢別比較

年 齢	<40 (N=346)	40~64 (N=2,944)	65~69 (N=623)	70~ (N=825)
請求合計 (点)	45,233	44,805	44,095	43,692
除夜障手 (点)	41,710	42,050	42,874	43,047
年齢 (歳)	33.1	53.9	66.9	75.2
透析歴 (年)	7.6	9.9	8.5	6.5
指導 (点)	2,911	2,920	2,918	2,929
在宅 (点)	1,780	2,071	1,534	2,029
投薬 (点)	1,504	1,735	1,904	1,834
処方 (点)	223	242	252	241
注射 (点)	3,872	4,009	4,567	4,688
処置 (点)	35,435	34,668	33,132	32,586
夜間 (点)	5,950	5,900	5,707	5,314
手術 (点)	512	703	755	432
検査 (点)	582	569	561	608
画像 (点)	292	208	210	228
その他 (点)	935	947	978	956

表 6-2 年齢別比較における P-value

年 齢	<40 40~64	<40 65~69	<40 ≥70	40~64 65~69	40~64 ≥70	65~69 ≥70
請求合計	NS	0.0004	1.2×10^{-7}	0.0014	1.1×10^{-8}	NS
除夜障手	NS	8.1×10^{-6}	2.0×10^{-7}	1.1×10^{-6}	7.1×10^{-11}	NS
透析歴	1.5×10^{-8}	NS	0.0023	5.6×10^{-6}	4.3×10^{-35}	2.1×10^{-9}
指導	NS	NS	NS	NS	NS	NS
在宅	NS	NS	NS	NS	NS	NS
投薬	0.0017	4.3×10^{-6}	7.6×10^{-5}	0.0038	NS	NS
処方	NS	0.0008	NS	NS	NS	NS
注射	NS	0.0016	0.0002	2.9×10^{-5}	1.4×10^{-8}	NS
処置	1.6×10^{-5}	2.1×10^{-35}	2.2×10^{-77}	4.7×10^{-31}	8.4×10^{-74}	5.7×10^{-8}
夜間	NS	NS	NS	NS	NS	NS
手術	NS	NS	NS	NS	NS	NS
検査	NS	NS	NS	NS	NS	NS
画像	NS	NS	NS	NS	NS	NS
その他	NS	NS	NS	NS	NS	NS

表6-3 年齢別集計結果表 -病院・診療所計- 40歳未満-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	346	343	346	346	86	2	27
平均	33.13872832	7.643556851	892.6271676	2911.479769	130	80	450
標準偏差	4.716096716	5.62228504	107.3251717	167.7728827	0	0	0
標準誤差	0.25353893	0.303574857	5.769836975	9.019526052	0	0	0
中央値(メジアン)	34	6.11	910	2810	130	80	450
最頻値(モード)	39	6.06	967	2800	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	14	9	116	9	257	260	302
平均	294	174	81.03448276	1780	223.1128405	1503.673077	3872.036424
標準偏差	0	0	136.4734681	618.4171327	103.1344262	1042.560697	2944.037985
標準誤差	0	0	12.67124341	206.1390442	6.433348752	64.6568697	169.4103492
中央値(メジアン)	294	174	10	1700	210	1309.5	3677
最頻値(モード)	294	174	10	1120	168	1090	4277
	うちEPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標本数	281	346	295	51	1	1	2
平均	3793.850534	35435.13584	4559.555932	4344.666667	3913	3861	9180
標準偏差	1927.340392	3274.824724	318.0584639	623.7195096	#DIV/0!	#DIV/0!	5769.991334
標準誤差	114.9754884	176.0556678	18.51807971	87.33820073	0	0	4080
中央値(メジアン)	3843	36454	4589	4459	3913	3861	9180
最頻値(モード)	4277	38519	4589	4459	#N/A	#N/A	#N/A
	ダイア計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標本数	346	346	191	32	63	2	0
平均	4603.413295	27429.62428	5950.26178	1560	512.4444444	6920	#DIV/0!
標準偏差	507.6879959	160.8045997	1469.474462	0	3009.538925	9164.103884	#DIV/0!
標準誤差	27.29347575	8.644908838	106.3274404	0	379.1662646	6480	65535
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	6920	#NUM!
最頻値(モード)	4589	27430	6500	1560	156	#N/A	#N/A
	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標本数	59	0	0	2	111	62	46
平均	127.6101695	#DIV/0!	#DIV/0!	6771.5	582.4774775	678.5	366.2608696
標準偏差	47.4269009	#DIV/0!	#DIV/0!	9374.114598	696.772362	647.221394	311.716355
標準誤差	6.17445658	65535	65535	6628.5	66.13470586	82.19719923	45.96006915
中央値(メジアン)	156	#NUM!	#NUM!	6771.5	380	550	335
最頻値(モード)	156	#N/A	#N/A	#N/A	25	550	380
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標本数	269	237	62	331	93	329	346
平均	292.1784387	26.6371308	904.9354839	934.918429	405.0430108	819.1914894	45232.59538
標準偏差	974.8389944	81.73299837	1292.03163	237.9497961	205.3357227	3.473302432	4596.696566
標準誤差	59.4369825	5.30912876	164.0881811	13.07890364	21.29232256	0.191489362	247.1199384
中央値(メジアン)	17	17	363	819	405	819	44964
最頻値(モード)	17	17	103	819	324	819	47645
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜間手	除夜間手在
標本数	346	346	346	346	346	346	346
平均	41947.91329	45088.31792	41803.63584	41854.60694	44995.01156	41710.32948	41664.0289
標準偏差	3933.551248	4610.91316	3887.72237	3710.202969	4367.527204	3658.580338	3639.085062
標準誤差	211.4690252	247.8842272	209.0052494	199.4617473	234.7997171	196.6864975	195.6384249
中央値(メジアン)	41384.5	44740.5	41334	41384.5	44740.5	41334	41314
最頻値(モード)	41145	40509	44946	41145	43966	43966	43966

表 6-4 年齢別集計結果表 -病院・診療所計-40~64 歳-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標 本 数	2,944	2,920	2,944	2,944	662	22	249
平 均	53.87805707	9.906708904	895.5720109	2920.194293	130	80	448.1927711
標準偏差	6.380483923	7.11374545	103.3586085	186.5382102	0	0	20.1242859
標準誤差	0.117593879	0.131645766	1.904924428	3.437944826	0	0	1.2753248
中央値(メジアン)	54	8.12	910	2810	130	80	450
最 頻 値 (モード)	52	3.07	967	2800	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標 本 数	122	47	1,125	204	2,207	2,218	2,553
平 均	290.3852459	174	98.51288889	2070.607843	242.4327141	1734.875113	4009.164512
標準偏差	22.86013771	0	165.5290264	3161.24861	118.5378811	1129.492893	2795.366168
標準誤差	2.069659622	0	4.935122072	221.3316734	2.523225084	23.98295716	55.32396492
中央値(メジアン)	294	174	20	1700	210	1509.5	3982
最 頻 値 (モード)	294	174	10	1120	168	1967	4277
	うち EPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標 本 数	2,251	2,944	2,320	579	9	28	23
平 均	4095.269214	34667.81352	4567.509052	4424.048359	3913	3765.535714	12328.69565
標準偏差	2104.219688	3109.47033	290.5916685	300.9569014	0	505.1495182	2697.142097
標準誤差	44.35099139	57.30829851	6.033081138	12.50734199	0	95.46428571	562.3930041
中央値(メジアン)	4277	33449	4589	4459	3913	3861	13260
最 頻 値 (モード)	4277	32019	4589	4459	3913	3861	13260
	ダイア計	4~5時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標 本 数	2,944	2,944	1,145	619	555	36	3
平 均	4613.572351	27421.56929	5900.436681	1557.285945	702.772973	7317.861111	2981
標準偏差	753.0204682	205.3873046	1514.6862	43.62684493	3511.284132	9510.473334	1823.195821
標準誤差	13.87835136	3.785338246	44.7630763	1.753510948	149.0457107	1585.078889	1052.622598
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	1865	3132
最 頻 値 (モード)	4589	27430	6500	1560	156	13400	#N/A
	うちベンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標 本 数	510	4	7	21	945	558	400
平 均	138.1156863	18724.25	15443.71429	570.4761905	568.7396825	705.5071685	296.23
標準偏差	43.13168429	13274.38999	4338.896508	749.5234899	641.9654259	655.1360809	227.1265689
標準誤差	1.909903082	6637.194995	1639.948732	163.5594346	20.88313686	27.73412183	11.35632844
中央値(メジアン)	156	22368.5	13471	286	364	550	280
最 頻 値 (モード)	156	#N/A	13471	286	25	550	380
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標 本 数	2,307	2,109	466	2,825	785	2,800	2,944
平 均	207.8352839	26.06448554	793.1781116	946.6637168	444.3745223	818.775	44804.56624
標準偏差	677.6823877	61.87270871	951.8077765	319.1336751	210.0142849	6.067744566	5051.457218
標準誤差	14.10920039	1.347289234	44.09164382	6.00431416	7.495731257	0.114669594	93.0995917
中央値(メジアン)	17	17	356	819	405	819	44280
最 頻 値 (モード)	17	17	96	819	324	819	41289
	除 夜 間	除 障 害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標 本 数	2,944	2,944	2,944	2,944	2,944	2,944	2,944
平 均	42509.72928	44477.13417	42182.29721	42377.24321	44344.6481	42049.81114	41906.33152
標準偏差	4344.613212	4969.396169	4197.355449	3951.012837	4648.493434	3799.421877	3618.365982
標準誤差	80.07228384	91.58718651	77.35828725	72.81813269	85.67287063	70.02427423	66.68736981
中央値(メジアン)	41857	43872	41611	41799.5	43789	41550	41469
最 頻 値 (モード)	41206	45906	41206	39406	45906	41206	41206

表6-5 年齢別集計結果表 -病院・診療所計-65~69歳-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	623	620	623	623	122	7	51
平均	66.86998395	8.493451613	892.6853933	2918.038523	130	80	445.5882353
標準偏差	1.437032435	6.615772119	97.82506482	189.0458572	0	0	31.50630189
標準誤差	0.057573489	0.265695802	3.919278463	7.573962339	0	0	4.411764706
中央値(メジアン)	67	7.03	910	2810	130	80	450
最頻値(モード)	65	2.05	967	2800	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	22	15	254	64	448	452	565
平均	294	174	99.66535433	1534.4375	252.3035714	1904.35177	4566.79823
標準偏差	0	0	154.4350479	560.7461264	115.2955614	1148.555621	3150.109587
標準誤差	0	0	9.690116731	70.0932658	5.447203262	54.02351208	132.5261064
中央値(メジアン)	294	174	20	1522.5	240	1660.5	4277
最頻値(モード)	294	174	10	300	168	1768	4277
	うちEPO	40：処方	Ⅱ型(353)	Ⅱ型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標本数	521	623	427	186	9	6	3
平均	4313.180422	33132.22311	4556.908665	4372.327957	3143.777778	3168	9860
標準偏差	2201.869738	2239.368398	345.3183652	547.3633459	1232.916641	1073.590984	5888.972746
標準誤差	96.46566468	89.71840037	16.71112696	40.13462777	410.9722138	438.2916837	3400
中央値(メジアン)	4277	32019	4589	4459	3913	3861	13260
最頻値(モード)	4277	32019	4589	4459	3913	3861	13260
	ダイア計	4~5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標本数	623	623	70	165	138	10	0
平均	4552.0626	27430	5707.142857	1554.181818	755.1884058	6904.7	#DIV/0!
標準偏差	597.6994999	119.6471232	1932.732647	74.73589864	3815.811294	10241.54721	#DIV/0!
標準誤差	23.94632482	4.79356077	231.0057354	5.818181818	324.8234284	3238.661596	65535
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	620	#NUM!
最頻値(モード)	4589	27430	6500	1560	156	#N/A	#N/A
	うちベンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標本数	123	1	2	6	212	128	92
平均	141.9512195	15000	14380	286	560.6698113	723.5390625	240.4021739
標準偏差	45.87382082	#DIV/0!	15765.65279	0	558.9251401	571.9667809	183.327849
標準誤差	4.136303126	0	11148	0	38.38713623	50.55519867	19.11324951
中央値(メジアン)	156	15000	14380	286	423.5	550	176
最頻値(モード)	156	#N/A	#N/A	286	550	550	380
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標本数	503	458	120	599	185	594	623
平均	210.1769384	22.2510917	721.2083333	977.9933222	461.1567568	819.1060606	44094.50722
標準偏差	555.0740758	29.57289419	775.8373833	370.5613341	228.9051262	2.584921311	4921.712055
標準誤差	24.74952977	1.381850597	70.8239393	15.14072565	16.82943959	0.106060606	197.1842298
中央値(メジアン)	17	17	351	819	405	819	43201
最頻値(モード)	17	17	96	819	405	819	48251
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標本数	623	623	623	623	623	623	623
平均	43453.25522	43682.88604	43041.63403	43285.97432	43515.60514	42874.35313	42716.72231
標準偏差	4626.640721	4766.61465	4466.424661	4140.027862	4335.714314	3980.950562	3922.25306
標準誤差	185.3624464	190.9703834	178.9435255	165.8667139	173.706726	159.4934164	157.1417507
中央値(メジアン)	42666	42796	42489	42662	42765	42412	42286
最頻値(モード)	41204	38333	38333	41204	38333	38333	38333

表 6-6 年齢別集計結果表 -病院・診療所計-70 歳以上-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標 本 数	825	815	825	825	159	6	65
平 均	75.21939394	6.524392638	894.830303	2929.179394	130	80	450
標準偏差	4.488562825	5.731437731	108.5647331	196.4593125	0	0	0
標準誤差	0.156271699	0.200763507	3.77973885	6.839835322	0	0	0
中央値(メジアン)	74	5.05	910	2810	130	80	450
最 頻 値 (モード)	72	3.07	967	2800	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標 本 数	51	7	310	71	587	589	771
平 均	291.1176471	174	129.3806452	2029.056338	240.6081772	1834.320883	4688.365759
標準偏差	20.58411724	0	184.185209	2457.095236	116.8166636	1147.519681	3248.348934
標準誤差	2.882352941	0	10.46101691	291.6035558	4.821539707	47.28272475	116.9864293
中央値(メジアン)	294	174	30	1455	210	1594	4287
最 頻 値 (モード)	294	174	10	300	168	474	4277
	うち EPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標 本 数	720	825	411	384	19	13	8
平 均	4359.795833	32585.66909	4553.309002	4391.114583	3691.210526	3701.076923	11347.5
標準偏差	2277.23832	1569.330514	304.5914968	474.4979894	671.8746228	576.610854	3794.521427
標準誤差	84.86766141	54.63707547	15.02439054	24.21412412	154.1386097	159.9230769	1341.565916
中央値(メジアン)	4277	32019	4589	4459	3913	3861	13260
最 頻 値 (モード)	7852	32019	4589	4459	3913	3861	13260
	ダイア計	4~5時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標 本 数	825	825	35	170	188	15	2
平 均	4565.606061	27430	5314.285714	1560	432.0904255	2628.4	2345
標準偏差	813.234629	0	2297.971338	0	2230.213385	4236.273646	0
標準誤差	28.31319559	0	388.4280507	0	162.6550282	1093.801152	0
中央値(メジアン)	4539	27430	6500	1560	156	830	2345
最 頻 値 (モード)	4589	27430	6500	1560	156	2345	2345
	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標 本 数	167	1	0	8	284	179	122
平 均	141.9101796	28652	# DIV/0!	1576.125	607.584507	718.452514	314.0983607
標準偏差	35.91654087	# DIV/0!	# DIV/0!	3367.229062	697.9544949	668.5849149	481.0225061
標準誤差	2.779305375	0	65535	1190.495252	41.41597964	49.97238279	43.54973146
中央値(メジアン)	156	28652	# NUM!	286	371	550	200
最 頻 値 (モード)	156	# N/A	# N/A	286	25	1000	96
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標 本 数	686	603	170	790	251	781	825
平 均	227.8367347	21.84245439	737.5	956.3974684	432.4900398	817.7900128	43692.46909
標準偏差	699.2722888	24.79577827	904.0737275	285.8960592	227.0561228	24.36973644	4473.417622
標準誤差	26.69834005	1.009762151	69.33928963	10.17172531	14.33165539	0.87201773	155.7444107
中央値(メジアン)	17	17	363	819	405	819	43001
最 頻 値 (モード)	17	17	103	819	324	819	43536
	除 夜 間	除 障 害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標 本 数	825	825	825	825	825	825	825
平 均	43467.01455	43371.01455	43145.56	43368.51394	43272.51394	43047.05939	42872.43758
標準偏差	4364.584453	4363.304161	4246.160542	4230.774409	4246.31787	4123.083282	4023.254801
標準誤差	151.9553262	151.9107521	147.8323348	147.2966584	147.8378123	143.5473346	140.071753
中央値(メジアン)	42828	42772	42578	42786	42718	42522	42355
最 頻 値 (モード)	39441	43536	43536	42845	42845	42845	42845

表 6-8 年齢別集計結果表 - 病院・診療所計 - TTEST -

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
40歳未満 40～64歳 P値	0	1.48671E-08	0.617611269	0.406377947	#DIV/0!	#DIV/0!	0.641675292
40歳未満 65～69歳 P値	0	0.044601415	0.99316284	0.59052676	#DIV/0!	#DIV/0!	0.470456018
40歳未満 70歳以上 P値	0	0.002332962	0.750612891	0.142802181	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～64歳 65～69歳 P値	0	5.63001E-06	0.522780191	0.79376788	#DIV/0!	#DIV/0!	0.450772341
40～64歳 70歳以上 P値	0	4.27464E-35	0.85704977	0.226967875	#DIV/0!	#DIV/0!	0.470122061
65～69歳 70歳以上 P値	5.1732E-275	2.1015E-09	0.697879566	0.277734785	#DIV/0!	#DIV/0!	0.260720811
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
40歳未満 40～64歳 P値	0.556382095	#DIV/0!	0.271869187	0.783620065	0.012320464	0.001668485	0.422884855
40歳未満 65～69歳 P値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.265405001	0.228241532	0.000821298	4.28512E-06	0.001607682
40歳未満 70歳以上 P値	0.604230788	#DIV/0!	0.010385414	0.763980237	0.03847439	7.56032E-05	0.000153743
40～64歳 65～69歳 P値	0.460800245	#DIV/0!	0.919218418	0.178631125	0.106577643	0.003771979	2.87305E-05
40～64歳 70歳以上 P値	0.843527283	#DIV/0!	0.004643474	0.919914171	0.739577843	0.058455057	1.41077E-08
65～69歳 70歳以上 P値	0.51511235	#DIV/0!	0.041017173	0.118009299	0.108825683	0.329502055	0.493809459
	うち EPO	40：処置	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
40歳未満 40～64歳 P値	0.0224239	1.62505E-05	0.661484231	0.108504217	#DIV/0!	#DIV/0!	0.154262527
40歳未満 65～69歳 P値	0.000922336	2.06612E-35	0.916763647	0.756817574	#DIV/0!	#DIV/0!	0.906725269
40歳未満 70歳以上 P値	0.000243198	2.17205E-77	0.791983897	0.528483444	#DIV/0!	#DIV/0!	0.521905766
40～64歳 65～69歳 P値	0.034831125	4.65949E-31	0.501900615	0.102933212	0.079643945	0.042554394	0.205675387
40～64歳 70歳以上 P値	0.004041755	8.40778E-74	0.364809356	0.187896227	0.33590339	0.718092717	0.431879884
65～69歳 70歳以上 P値	0.718267644	5.68682E-08	0.873075639	0.673841192	0.137706905	0.171972025	0.625471162
	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
40歳未満 40～64歳 P値	0.806870008	0.481150017	0.672627798	0.725207536	0.679548931	0.95435292	#DIV/0!
40歳未満 65～69歳 P値	0.177256375	0.967085504	0.279606135	0.660801771	0.656494139	0.998483918	#DIV/0!
40歳未満 70歳以上 P値	0.422937665	0.946472904	0.034130632	#DIV/0!	0.821760162	0.246511365	#DIV/0!
40～64歳 65～69歳 P値	0.055561152	0.322453034	0.3086723	0.493572531	0.877504554	0.905348632	#DIV/0!
40～64歳 70歳以上 P値	0.112286058	0.238513648	0.027020997	0.41775191	0.321916066	0.073746118	0.671676785
65～69歳 70歳以上 P値	0.7261539	1	0.359205205	0.310802446	0.338114714	0.159720006	#DIV/0!
	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
40歳未満 40～64歳 P値	0.080212661	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000913519	0.832673676	0.75795446	0.058435079
40歳未満 65～69歳 P値	0.052428386	#DIV/0!	#DIV/0!	0.083245022	0.760332028	0.626665774	0.003397678
40歳未満 70歳以上 P値	0.016880646	#DIV/0!	#DIV/0!	0.188567649	0.747993931	0.683049713	0.495731535
40～64歳 65～69歳 P値	0.382325545	#DIV/0!	0.858769449	0.368067684	0.865672223	0.774000363	0.028406838
40～64歳 70歳以上 P値	0.305168833	#DIV/0!	#DIV/0!	0.197479305	0.38121718	0.819020208	0.572156056
65～69歳 70歳以上 P値	0.993190458	#DIV/0!	#DIV/0!	0.371261854	0.421329172	0.944452016	0.164635424
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
40歳未満 40～64歳 P値	0.06700156	0.896343931	0.407482993	0.516547829	0.08730571	0.221948374	0.132524676
40歳未満 65～69歳 P値	0.136919513	0.305039553	0.233022325	0.056655966	0.047078704	0.671724453	0.000434722
40歳未満 70歳以上 P値	0.255798803	0.194795293	0.270364665	0.229130946	0.307924528	0.299301662	1.16816E-07
40～64歳 65～69歳 P値	0.94230462	0.198103208	0.444418229	0.034171338	0.33691638	0.192063442	0.001378614
40～64歳 70歳以上 P値	0.500548507	0.101481141	0.50850322	0.43855314	0.444475763	0.053059943	1.11235E-08
65～69歳 70歳以上 P値	0.639570163	0.806868371	0.872907512	0.220385884	0.194823624	0.190256469	0.105146016
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
40歳未満 40～64歳 P値	0.021669892	0.029323411	0.109836712	0.01923376	0.013296026	0.114607494	0.23904642
40歳未満 65～69歳 P値	3.83943E-07	9.6317E-06	1.68126E-05	1.11084E-07	4.62571E-07	8.08179E-06	4.3611E-05
40歳未満 70歳以上 P値	2.80452E-08	2.04605E-09	4.95765E-07	9.16506E-09	4.76783E-10	2.02262E-07	1.61963E-06
40～64歳 65～69歳 P値	1.17666E-06	0.000266249	4.58985E-06	2.45139E-07	4.39365E-05	1.10975E-06	5.9238E-07
40～64歳 70歳以上 P値	2.4634E-08	7.2824E-09	6.72868E-09	4.03901E-10	2.68992E-09	7.10946E-11	4.40567E-11
65～69歳 70歳以上 P値	0.953856865	0.19591394	0.652119482	0.710719839	0.285328624	0.423302587	0.461186258

表 7-1 透析歴別比較

透析歴	<10 (N=2,879)	10~14 (N=829)	15≤ (N=990)
請求合計 (点)	44,559	44,505	44,665
除夜障手 (点)	42,569	42,179	41,741
年齢 (歳)	58.7	56.8	56.1
透析歴 (年)	4.3	12.1	19.8
指導 (点)	2,915	2,926	2,926
在宅 (点)	1,892	2,330	2,320
投薬 (点)	1,813	1,683	1,683
処方 (点)	239	242	253
注射 (点)	4,341	4,257	3,769
処置 (点)	33,887	34,170	34,965
夜間 (点)	5,869	5,803	5,980
手術 (点)	583	884	711
検査 (点)	572	562	594
画像 (点)	204	249	237
その他 (点)	944	952	977

表 7-2 透析歴別比較における P-value

透析歴	<10 10~14	10< ≥15	10~14 ≥15
請求合計	NS	NS	NS
除夜障手	NS	6.8×10^{-9}	NS
年齢	0.0003	1.9×10^{-8}	NS
指導	NS	NS	NS
在宅	NS	NS	NS
投薬	NS	NS	NS
処方	NS	0.0034	NS
注射	NS	1.4×10^{-6}	0.0011
処置	NS	3.0×10^{-23}	4.0×10^{-8}
夜間	NS	NS	NS
手術	NS	NS	NS
検査	NS	NS	NS
画像	NS	NS	NS
その他	NS	NS	NS

表 7-3 透析歴別集計結果表 -病院・診療所計- 10年未満-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標 本 数	2,879	2,879	2,879	2,879	611	23	225
平 均	58.65404654	4.348509899	892.9569295	2914.72942	130	80	447
標準偏差	13.25640431	2.634987589	104.4372202	180.5582362	0	0	25.86451651
標準誤差	0.247061406	0.049108621	1.946410645	3.365088351	0	0	1.724301101
中央値(メジアン)	59	4.07	910	2810	130	80	450
最 頻 値 (モード)	52	3.07	967	2800	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標 本 数	129	49	1,077	297	2,126	2,134	2,615
平 均	290.5813953	174	95.12534819	1892.306397	238.6011289	1813.487348	4341.013384
標準偏差	22.24146524	0	165.1031447	2228.576692	115.9410149	1154.127761	2966.06026
標準誤差	1.958251823	0	5.030920954	129.3151355	2.514522162	24.98369562	58.0021542
中央値(メジアン)	294	174	20	1617	210	1593.5	4277
最 頻 値 (モード)	294	174	10	1120	168	904	4277
	うち EPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標 本 数	2,450	2,879	2,037	805	24	21	14
平 均	4198.668571	33887.33519	4560.263623	4406.591304	3674.708333	3861	12895.71429
標準偏差	2119.334933	2836.471142	337.3259585	404.869521	818.2270058	0	1363.032334
標準誤差	42.81703151	52.8636976	7.474019878	14.2697756	167.0198882	0	364.2857143
中央値(メジアン)	4277	32023	4589	4459	3913	3861	13260
最 頻 値 (モード)	4277	32019	4589	4459	3913	3861	13260
	ダイア計	4～5時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標 本 数	2,879	2,879	791	460	635	32	2
平 均	4580.19347	27427.75617	5868.52086	1558.695652	582.9070866	6920.09375	2345
標準偏差	623.2078766	130.4499947	1582.469697	23.05706624	3084.160805	8674.979529	0
標準誤差	11.61480977	2.431214255	56.26614493	1.075041257	122.3911882	1533.534213	0
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	1767.5	2345
最 頻 値 (モード)	4589	27430	6500	1560	156	13400	2345
	うちベンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標 本 数	590	3	5	16	865	528	331
平 均	143.4372881	23749.66667	16153.2	1367.25	571.8254335	721.0965909	266.2779456
標準偏差	38.72468623	7807.0494	9343.437868	3293.688884	656.5969917	654.8775717	255.609411
標準誤差	1.594270102	4507.402073	4178.512443	823.4222211	22.32496748	28.49988815	14.04956386
中央値(メジアン)	156	26245	13518	286	360	550	200
最 頻 値 (モード)	156	#N/A	#N/A	286	25	550	380
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標 本 数	2,345	2,113	501	2,760	791	2,733	2,879
平 均	204.4144989	24.92001893	721.3972056	944.4992754	432.0657396	818.5159166	44559.08371
標準偏差	666.1218408	50.15879841	885.7095754	310.2119504	208.3814558	14.40532475	4917.436814
標準誤差	13.75568588	1.091182458	39.57058556	5.90478356	7.409191606	0.275551791	91.64693724
中央値(メジアン)	17	17	264	819	405	819	43874
最 頻 値 (モード)	17	17	103	819	324	819	43568
	除 夜 間	除 障 害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標 本 数	2,879	2,879	2,879	2,879	2,879	2,879	2,879
平 均	42946.7183	44310.0389	42697.6735	42818.15075	44181.47134	42569.10594	42373.89406
標準偏差	4331.566499	4841.83557	4202.826148	3999.564023	4559.616065	3868.469803	3733.385177
標準誤差	80.72799267	90.23794659	78.32864127	74.54041746	84.97818338	72.09719669	69.57960619
中央値(メジアン)	42275	43596	42060	42245	43561	42045	41921
最 頻 値 (モード)	43568	48905	41125	42565	40206	41533	40206

表 7-5 透析歴別集計結果表 -病院・診療所計-15年以上-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標 本 数	990	990	990	990	208	6	74
平 均	56.07979798	19.80391919	896.0909091	2926.060606	130	80	450
標準偏差	9.488148957	3.649820084	111.6344597	189.9294648	0	0	0
標準誤差	0.301553169	0.115998897	3.547976034	6.036354641	0	0	0
中央値(メジアン)	56	19.07	910	2820	130	80	450
最 頻 値 (モード)	52	17.09	967	2800	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標 本 数	45	10	386	16	722	731	823
平 均	294	174	126.9689119	2320.4375	253.3518006	1683.221614	3769.430134
標準偏差	0	0	162.9879577	2826.332157	120.0793233	1096.430664	2944.356531
標準誤差	0	0	8.29586862	706.5830393	4.468889673	40.55295301	102.6338168
中央値(メジアン)	294	174	30	1490	240	1465	3091
最 頻 値 (モード)	294	174	10	300	168	1025	4277
	うち EPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標 本 数	663	990	749	220	3	9	19
平 均	3893.199095	34964.89798	4557.149533	4424.7	3311	3333	11595.78947
標準偏差	2173.085294	3172.053265	308.013736	251.5618083	1042.694586	1058.189137	3585.517653
標準誤差	84.39563954	100.8144706	11.25457697	16.96029365	602	352.7297124	822.5741637
中央値(メジアン)	3630	33579	4589	4459	3913	3861	13260
最 頻 値 (モード)	4277	32019	4589	4459	3913	3861	13260
	ダイア計	4～5時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標 本 数	990	990	368	376	152	18	3
平 均	4693.928283	27415.78788	5979.619565	1557.12766	710.9407895	3275.888889	2981
標準偏差	1107.629982	255.4785661	1426.297532	49.87712561	3376.636369	4849.938494	1823.195821
標準誤差	35.2027917	8.119641837	74.35089855	2.572216353	273.8813752	1143.141466	1052.622598
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	1185	3132
最 頻 値 (モード)	4589	27430	6500	1560	156	1600	#N/A
	うちベンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標 本 数	130	2	0	11	372	217	173
平 均	125.8769231	23572	#DIV/0!	1235.363636	593.9193548	744.7511521	301.9768786
標準偏差	49.7616046	7184.204897	#DIV/0!	2874.76553	645.4491772	676.8268918	212.3401164
標準誤差	4.364381437	5080	65535	866.7744204	33.46498091	45.94600325	16.1439201
中央値(メジアン)	156	23572	#NUM!	286	380	550	300
最 頻 値 (モード)	156	#N/A	#N/A	286	380	550	380
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標 本 数	739	663	166	956	289	949	990
平 均	237.1948579	25.24886878	830.0361446	976.5303347	459.6297578	819	44664.62323
標準偏差	689.2118294	59.51457635	903.9942739	366.6568907	217.7538221	0	4719.363831
標準誤差	25.35306697	2.31135462	70.16356309	11.85853133	12.80904836	0	149.9912286
中央値(メジアン)	17	17	425	819	405	819	44280
最 頻 値 (モード)	17	17	103	819	324	819	45906
	除 夜 間	除 障 害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標 本 数	990	990	990	990	990	990	990
平 均	42441.89596	44073.22929	41850.50202	42332.74141	43964.07475	41741.34747	41703.84545
標準偏差	4350.723254	4585.648316	4125.350536	4078.399071	4388.480722	3854.797184	3817.710135
標準誤差	138.275062	145.7414706	131.1122468	129.6200313	139.4750731	122.5134968	121.334793
中央値(メジアン)	41589	43700.5	41050.5	41523.5	43657	40978.5	40972.5
最 頻 値 (モード)	39406	45906	39406	39406	45906	39406	39406

表 7-7 透析歴別集計結果表 -病院・診療所計-TTEST=P 値-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
10年未満 10～14年 P 値	0.000300803	0	0.335857566	0.109823288	#DIV/0!	#DIV/0!	0.351096062
10年未満 15年以上 P 値	1.85205E-08	0	0.427507036	0.091740559	#DIV/0!	#DIV/0!	0.319745772
10～14年 15年以上 P 値	0.109142625	0	0.876141679	0.973294173	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
10年未満 10～14年 P 値	0.85759804	#DIV/0!	0.613827407	0.360540412	0.480741399	0.013189557	0.501873699
10年未満 15年以上 P 値	0.304862533	#DIV/0!	0.001131124	0.461196004	0.003374114	0.007928823	1.44849E-06
10～14年 15年以上 P 値	0.259444975	#DIV/0!	0.032161721	0.99447768	0.090506351	0.999915109	0.001133971
	うち EPO	40：処置	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
10年未満 10～14年 P 値	0.285183926	0.012092894	0.112185607	0.136195409	0.443245026	0.067065463	0.001543346
10年未満 15年以上 P 値	0.001088441	2.9645E-23	0.824264662	0.52828835	0.485241989	0.026461934	0.208173806
10～14年 15年以上 P 値	0.000815835	3.98109E-08	0.05874577	0.109963578	0.896069218	0.600469922	0.07410403
	ダイア計	4～5時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
10年未満 10～14年 P 値	0.132472504	0.587611215	0.558765744	0.207378372	0.32563915	0.713285247	#DIV/0!
10年未満 15年以上 P 値	7.12178E-05	0.057991642	0.251503594	0.547261503	0.651972792	0.107698693	0.671676785
10～14年 15年以上 P 値	0.000314119	0.404439656	0.148340247	0.528042472	0.696323778	0.133136422	#DIV/0!
	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
10年未満 10～14年 P 値	0.002893642	#DIV/0!	0.668637795	0.389762264	0.818373308	0.085437894	0.003796595
10年未満 15年以上 P 値	1.09709E-05	0.981190481	#DIV/0!	0.915264705	0.585524372	0.657482041	0.115974328
10～14年 15年以上 P 値	0.340971066	#DIV/0!	#DIV/0!	0.401986625	0.510694141	0.064583105	0.137472407
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
10年未満 10～14年 P 値	0.146119661	0.848652543	0.031884827	0.53737199	0.212746148	0.530133044	0.788478773
10年未満 15年以上 P 値	0.246197216	0.886906427	0.173470057	0.008699339	0.057536788	0.300768166	0.552944966
10～14年 15年以上 P 値	0.76676557	0.819971183	0.477952009	0.116858583	0.702882245	0.120828256	0.495310641
	除 夜 間	除 障 害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
10年未満 10～14年 P 値	0.051064596	0.684444756	0.030471534	0.021775098	0.562559587	0.011108107	0.046406099
10年未満 15年以上 P 値	0.001599233	0.180993325	4.21568E-08	0.001061295	0.194056232	6.80274E-09	1.35541E-06
10～14年 15年以上 P 値	0.427759665	0.492691272	0.016851012	0.528935489	0.602068038	0.017723936	0.034502551

表 8-1 院内・院外処方別比較

	院内 (N=3,423)	院外 (N=1,228)	P
請求合計 (点)	44,782	43,780	6.1×10^{-10}
除夜障手 (点)	42,611	41,374	4.9×10^{-22}
年齢 (歳)	57.6	58.5	NS
透析歴 (年)	8.9	9.0	NS
指導 (点)	2,922	2,914	NS
在宅 (点)	1,951	1,979	NS
投薬 (点)	1,792	22	7.2×10^{-12}
処方 (点)	244	—	—
注射 (点)	4,191	4,193	NS
処置 (点)	34,063	34,361	0.0023
夜間 (点)	5,870	5,925	NS
手術 (点)	577	759	NS
検査 (点)	583	555	NS
画像 (点)	204	240	NS
その他 (点)	829	1,250	—

表 8-2 院内・院外別処方集計結果表 -病院・診療所計-院内-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標 本 数	3,413	3,373	3,423	3,423	709	35	288
平 均	57.55317902	8.946237771	894.8536372	2922.033596	130	80	447.65625
標準偏差	12.10981404	6.817150033	104.2627896	192.619334	0	0	22.88381263
標準誤差	0.207285694	0.117380156	1.782074645	3.292277449	0	0	1.348441591
中央値(メジアン)	58	7.07	910	2820	130	80	450
最 頻 値 (モード)	58	3.07	967	2800	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標 本 数	145	71	1,650	260	3,423	3,423	3,034
平 均	289.9448276	174	84.5030303	1950.992308	244.1910605	1791.845457	4190.816744
標準偏差	24.1597057	0	158.0608892	2371.870003	115.5857709	1121.187222	2896.381275
標準誤差	2.006354353	0	3.891190103	147.0971332	1.975608675	19.16349377	52.58331271
中央値(メジアン)	294	174	20	1650	210	1558	4277
最 頻 値 (モード)	294	174	10	1455	168	474	4277
	うち EPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標 本 数	2,736	3,423	2,535	828	34	40	15
平 均	4161.730263	34063.32282	4562.284024	4392.719807	3585.441176	3638.25	12920
標準偏差	2121.003722	2901.833056	325.9735982	447.4052628	832.9951505	681.7577113	1316.814338
標準誤差	40.54930212	49.59854931	6.474309318	15.5484077	142.8574897	107.795359	340
中央値(メジアン)	4277	32113	4589	4459	3913	3861	13260
最 頻 値 (モード)	4277	32019	4589	4459	3913	3861	13260
	ダイア計	4～5時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標 本 数	3,423	3,423	1,009	708	702	36	4
平 均	4576.043529	27424.79696	5869.672944	1558.305085	576.8589744	6644.138889	2625.25
標準偏差	605.2324955	182.2697934	1573.153993	36.62505657	2930.696444	7523.448028	1519.65399
標準誤差	10.34472114	3.115381608	49.52513336	1.376453915	110.6120092	1253.908005	759.8269951
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	2345	2345
最 頻 値 (モード)	4589	27430	6500	1560	156	13400	2345
	うちベンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標 本 数	637	5	5	35	1,049	604	448
平 均	139.9372057	17979.4	11418.4	1120.514286	582.6482364	752.9337748	285.578125
標準偏差	41.89507499	11615.98381	4576.530815	2728.339199	664.5573178	671.1736476	314.5347307
標準誤差	1.659943308	5194.825884	2046.686801	461.1734965	20.5184571	27.30966841	14.86036921
中央値(メジアン)	156	18492	13471	286	380	550	240
最 頻 値 (モード)	156	#N/A	13471	286	550	550	380
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標 本 数	2,682	2,351	651	3,228	0	3,226	3,423
平 均	203.766965	27.01999149	622.8602151	829.4634449	#DIV/0!	818.5703658	44782.07946
標準偏差	658.4547664	65.74243767	831.5799978	221.8997523	#DIV/0!	13.21266162	4743.131022
標準誤差	12.71442016	1.355874487	32.59218977	3.905620615	65535	0.232625935	81.07027981
中央値(メジアン)	17	17	184	819	#NUM!	819	44274
最 頻 値 (モード)	17	17	103	819	#N/A	819	45906
	除 夜 間	除 障 害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標 本 数	3,423	3,423	3,423	3,423	3,423	3,423	3,423
平 均	43051.87204	44459.7657	42729.55828	42933.56792	44341.46158	42611.25416	42463.0631
標準偏差	4195.936905	4667.141705	4066.47326	3943.61969	4464.208215	3809.883038	3685.368616
標準誤差	71.71755901	79.77145945	69.5047477	67.40491676	76.30289096	65.11907061	62.99085215
中央値(メジアン)	42425	43861	42205	42375	43787	42172	42045
最 頻 値 (モード)	39406	45906	39406	39406	45906	39406	39406

表 8-6 院内・院外別処方集計結果表 -病院・診療所計-TTEST=P 値-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
院内 院外 P 値	0.015046412	0.97164693	0.390238011	0.195400591	# DIV/0!	# DIV/0!	0.32697856
院内 両方 P 値	0.815441354	0.092092908	0.024608188	0.100725471	# DIV/0!	# DIV/0!	0.723422543
院内 なし P 値	0.09140409	0.517279118	0.671986169	0.717209561	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
院外 両方 P 値	0.345003142	0.108064592	0.012295777	0.027178741	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
院外 なし P 値	0.054518109	0.523741559	0.590997935	0.576123205	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
両方 なし P 値	0.178806196	0.23697746	0.769802291	0.808840576	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
院内 院外 P 値	0.203289392	# DIV/0!	1.08218E-52	0.935050163	# DIV/0!	7.18675E-12	0.982930551
院内 両方 P 値	0.708863438	# DIV/0!	0.209056718	0.917430268	2.44892E-15	9.53557E-19	0.135920897
院内 なし P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	0.747763558	# DIV/0!	# DIV/0!	0.26455895
院外 両方 P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	4.36795E-06	0.959455453	# DIV/0!	0.003350826	0.174343919
院外 なし P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	0.823934694	# DIV/0!	# DIV/0!	0.295156267
両方 なし P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	0.400483561	# DIV/0!	# DIV/0!	0.178285243
	うち EPO	40：処置	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
院内 院外 P 値	0.581841043	0.00231456	0.525559439	0.297151109	0.505748654	0.396190022	0.128723658
院内 両方 P 値	0.489962331	0.079734575	0.52566674	0.497647233	# DIV/0!	# DIV/0!	0.668352639
院内 なし P 値	0.533155952	0.032771609	0.013796741	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	2.39918E-07
院外 両方 P 値	0.415630329	0.447171078	0.499578083	0.639490546	# DIV/0!	# DIV/0!	0.396350134
院外 なし P 値	0.587249451	0.087796973	0.000281476	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	0.020586824
両方 なし P 値	0.439763457	0.228661827	0.000468135	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	0.001222401
	ダイヤ計	4~5 時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
院内 院外 P 値	0.017682455	0.916274202	0.544197821	0.526775576	0.462690374	0.540014052	# DIV/0!
院内 両方 P 値	0.000161855	0.791266815	0.875978266	0.005442656	0.102735734	0.99657147	# DIV/0!
院内 なし P 値	0.008068521	0.924588841	0.702627138	0.926334657	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
院外 両方 P 値	0.051781814	0.722996821	0.735857507	0.115335661	0.330611671	0.798230113	# DIV/0!
院外 なし P 値	0.121415938	0.899127646	0.634675597	0.901190014	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
両方 なし P 値	0.664194296	# DIV/0!	0.779464032	0.630123586	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
院内 院外 P 値	0.146820828	# DIV/0!	0.12706137	# DIV/0!	0.438709309	0.001572834	0.186424493
院内 両方 P 値	0.882116835	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	0.720297431	0.425346252	0.927336764
院内 なし P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	0.78502079	0.48363852	# DIV/0!
院外 両方 P 値	0.572836921	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	0.50463457	0.053794024	0.674289161
院外 なし P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	0.843228673	0.644861712	# DIV/0!
両方 なし P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	0.707855075	0.359359964	# DIV/0!
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
院内 院外 P 値	0.146265482	0.000704644	3.49354E-21	0	# DIV/0!	0.32973385	6.13003E-10
院内 両方 P 値	0.004969012	0.562985132	0.000462399	4.96961E-66	# DIV/0!	0.76846367	0.045190793
院内 なし P 値	0.59872447	0.647611123	0.62790146	0.245039023	# DIV/0!	0.914137546	0.682449635
院外 両方 P 値	0.044725551	0.131841812	0.585398009	0.500767577	0.392115604	0.879788607	0.000536973
院外 なし P 値	0.53714186	0.560960299	0.176717503	0.000157826	# DIV/0!	0.955828454	0.790302941
両方 なし P 値	0.367862604	0.405245281	0.240751236	0.0118268	# DIV/0!	# DIV/0!	0.455395933
	除 夜 間	除 障 害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
院内 院外 P 値	3.18788E-17	2.49163E-10	2.02515E-18	1.76241E-20	7.84061E-12	4.90885E-22	5.61243E-23
院内 両方 P 値	0.019244639	0.03494454	0.012456612	0.052897877	0.086676219	0.03623623	0.025418551
院内 なし P 値	0.268526032	0.555601624	0.179892276	0.275859544	0.589966246	0.180017492	0.138107596
院外 両方 P 値	1.33836E-05	0.000304617	4.21238E-06	7.78273E-06	0.000348239	2.02507E-06	5.7502E-07
院外 なし P 値	0.890838859	0.908668171	0.746733104	0.958323643	0.829794026	0.796625503	0.702691025
両方 なし P 値	0.214467282	0.373383616	0.153807383	0.175060138	0.359180573	0.110060936	0.08227555

表9-1 DM・非DM別比較

	DM (N=348)	非DM (N=4,400)
請求合計（点）	47,666	44,293
除夜障手（点）	45,137	42,079
年齢（歳）	61.3	57.5
透析歴（年）	5.2	9.3
指導（点）	2,898	2,922
在宅（点）	1,956	—
投薬（点）	2,433	1,700
処方（点）	264	240
注射（点）	4,611	4,165
処置（点）	34,327	34,141
夜間（点）	5,806	5,886
手術（点）	1,003	605
検査（点）	568	576
画像（点）	183	221
その他（点）	987	949

表9-2 病院におけるDM・非DM別比較

	DM (N=210)	非DM (N=2,373)	P
請求合計（点）	48,044	44,496	6.4×10^{-22}
除夜障手（点）	45,516	42,337	1.1×10^{-28}
年齢（歳）	61.7	57.6	3.9×10^{-6}
透析歴（年）	4.9	9.4	1.9×10^{-19}
指導（点）	2,885	2,884	NS
在宅（点）	1,890	—	—
投薬（点）	2,636	1,791	9.9×10^{-18}
処方（点）	262	242	NS
注射（点）	4,730	4,219	NS
処置（点）	34,159	34,012	NS
夜間（点）	5,621	5,810	NS
手術（点）	1,310	666	NS
検査（点）	579	641	NS
画像（点）	284	352	NS
その他（点）	1,028	938	0.0009

表9-3 診療所におけるDM・非DM別比較

	DM (N=138)	非DM (N=2,027)	P
請求合計（点）	47,091	44,057	5.2×10^{-14}
除夜障手（点）	44,559	41,777	8.4×10^{-18}
年齢（歳）	60.7	57.4	0.0020
透析歴（年）	5.5	9.2	1.2×10^{-9}
指導（点）	2,917	2,967	NS
在宅（点）	2,056	—	—
投薬（点）	2,133	1,579	4.8×10^{-8}
処方（点）	267	237	NS
注射（点）	4,413	4,099	NS
処置（点）	34,582	34,292	NS
夜間（点）	6,020	5,967	NS
手術（点）	218	486	NS
検査（点）	543	480	NS
画像（点）	30	75	NS
その他（点）	925	960	NS

表9-4 DM・非DM別集計結果表 -病院・診療所計-DM-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標 本 数	348	348	348	348	73	4	2
平 均	61.28448276	5.163793103	886.7126437	2898.054598	130	80	450
標準偏差	9.883592815	4.517996417	95.87003788	185.8388565	0	0	0
標準誤差	0.529816187	0.24219003	5.139173466	9.962008375	0	0	0
中央値(メジアン)	62	4.02	910	2810	130	80	450
最 頻 値 (モード)	59	3.07	967	2800	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標 本 数	7	0	152	348	265	267	313
平 均	294	#DIV/0!	140.4934211	1956.008621	264.2679245	2432.640449	4610.680511
標準偏差	0	#DIV/0!	219.6352786	2678.159739	123.111276	1477.253588	3298.479061
標準誤差	0	65535	17.81477351	143.5644313	7.562665567	90.4064514	186.4410597
中央値(メジアン)	294	#NUM!	30	1616	252	2120	4277
最 頻 値 (モード)	294	#N/A	10	1120	168	1924	4277
	うちEPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標 本 数	288	348	211	131	9	3	1
平 均	4155.53125	34326.8046	4482.587678	4432.816794	3712.333333	3168	13260
標準偏差	2210.472578	2348.440111	662.8938546	151.1256635	602	1200.31121	#DIV/0!
標準誤差	130.2533458	125.889604	45.63549496	13.20391053	200.6666667	693	0
中央値(メジアン)	4277	33579	4589	4459	3913	3861	13260
最 頻 値 (モード)	7852	33579	4589	4459	3913	3861	#N/A
	ダイア計	4～5時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標 本 数	348	348	54	306	89	8	0
平 均	4547.988506	27417.29885	5805.555556	1560	1003.067416	9025.75	#DIV/0!
標準偏差	488.6657832	236.9368702	1666.588048	0	5260.96542	15600.96211	#DIV/0!
標準誤差	26.19523558	12.70114943	226.7939072	0	557.6612192	5515.773051	65535
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	1185	#NUM!
最 頻 値 (モード)	4589	27430	6500	1560	156	#N/A	#N/A
	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標 本 数	80	0	2	4	128	85	56
平 均	142.175	#DIV/0!	14380	428.5	568.0546875	666.3764706	258.8392857
標準偏差	45.72836003	#DIV/0!	15765.65279	462.2073849	639.0147104	624.6423734	231.3822321
標準誤差	5.112586077	65535	11148	231.1036925	56.48145438	67.75197802	30.91975136
中央値(メジアン)	156	#NUM!	14380	286	358.5	458	173
最 頻 値 (モード)	156	#N/A	#N/A	286	96	550	96
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標 本 数	297	274	62	338	86	333	348
平 均	182.5420875	23.27372263	657.7741935	987.2337278	475.872093	818.2432432	47665.79885
標準偏差	533.7038407	28.62377344	772.8646822	597.7783859	228.488527	14.64965328	6355.988565
標準誤差	30.96863786	1.729225393	98.1539128	32.51485772	24.63855151	0.802796055	340.7167506
中央値(メジアン)	17	17	246	819	456	819	46482.5
最 頻 値 (モード)	17	17	103	819	567	819	44327
	除 夜 間	除 障 害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標 本 数	348	348	348	348	348	348	348
平 均	46764.93678	46294.07471	45393.21264	46508.40517	46037.5431	45136.68103	43180.67241
標準偏差	5788.645741	6336.718056	5766.572684	4877.232732	5435.473139	4859.44075	4077.203081
標準誤差	310.3039829	339.6837429	309.1207429	261.4471174	291.3719442	260.493367	218.5610265
中央値(メジアン)	45767.5	45102.5	44371.5	45704.5	45101	44340.5	42377.5
最 頻 値 (モード)	44327	42767	42767	44327	42767	42767	39730

表9-5 DM・非DM別集計結果表 -病院・診療所計-非DM-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	4,390	4,350	4,400	4,400	956	33	390
平均	57.51070615	9.272563218	895.2125	2922.402727	130	80	448.2692308
標準偏差	12.30154837	6.916009678	104.4829227	187.2126993	0	0	19.68301048
標準誤差	0.185663921	0.104860268	1.575139325	2.822337634	0	0	0.996687979
中央値(メジアン)	58	7.565	910	2810	130	80	450
最頻値(モード)	52	3.07	967	2800	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	202	78	1,663	0	3,244	3,262	3,886
平均	291.0891089	174	98.89055923	#DIV/0!	239.8850185	1700.096567	4164.912249
標準偏差	20.53081606	0	159.5416043	#DIV/0!	116.1502028	1083.670759	2924.71813
標準誤差	1.444543177	0	3.91226109	65535	2.039292629	18.97384623	46.91725762
中央値(メジアン)	294	174	20	#NUM!	210	1492.5	4277
最頻値(モード)	294	174	10	#N/A	168	474	4277
	うちEPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標本数	3,492	4,400	3,250	1,071	29	45	35
平均	4152.549255	34141.22705	4569.164923	4398.470588	3591.241379	3709.2	11686.28571
標準偏差	2137.547848	2994.660983	260.6577373	444.0897262	851.094407	579.0365273	3404.083262
標準誤差	36.17251684	45.14621297	4.572239176	13.56987948	158.0442637	86.31766911	575.3950905
中央値(メジアン)	4277	32078.5	4589	4459	3913	3861	13260
最頻値(モード)	4277	32019	4589	4459	3913	3861	13260
	ダイア計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標本数	4,400	4,400	1,387	680	858	55	5
平均	4600.142727	27425.33409	5886.445566	1556.117647	604.9020979	5700.909091	2726.6
標準偏差	745.3838492	166.9087716	1552.209517	55.50876735	3032.722264	7335.822727	1335.428882
標準誤差	11.23708433	2.516244408	41.67850297	2.128664056	103.535431	989.1621347	597.221952
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	1320	2345
最頻値(モード)	4589	27430	6500	1560	156	13400	2345
	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標本数	782	6	7	33	1,426	843	605
平均	138.4398977	19758.16667	15443.71429	1155.575758	575.759467	712.1613286	299.9305785
標準偏差	42.26679901	11266.27396	4338.896508	2805.909712	646.2802176	647.8114023	297.7449659
標準誤差	1.511457647	4599.437085	1639.948732	488.4461856	17.11437721	22.31180988	12.10505425
中央値(メジアン)	156	22368.5	13471	286	380	550	260
最頻値(モード)	156	#N/A	13400	286	25	550	380
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標本数	3,471	3,138	756	4,215	1,228	4,179	4,400
平均	220.6634976	24.96908859	789.5039683	948.5224199	439.2890879	818.7135678	44293.44909
標準偏差	704.1602068	57.03486175	960.9540782	281.0027808	214.8986197	10.98020479	4708.920975
標準誤差	11.95209873	1.018155059	34.94956193	4.328244922	6.132456026	0.169853404	70.98965474
中央値(メジアン)	17	17	362	819	405	819	43759.5
最頻値(モード)	17	17	96	819	324	819	41289
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標本数	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
平均	42437.88091	44052.95818	42197.39	42319.91818	43934.99545	42079.42727	42079.42727
標準偏差	4086.200908	4663.788377	4004.602142	3796.081152	4432.989822	3717.83881	3717.83881
標準誤差	61.6017965	70.30925522	60.37164881	57.22807662	66.82983608	56.04852892	56.04852892
中央値(メジアン)	41819	43522	41648	41777	43477	41607	41607
最頻値(モード)	41206	45906	41206	41206	45906	41206	41206

表9-6 DM・非DM別集計結果表 -病院1・病院2計-DM-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	210	210	210	210	19	1	0
平均	61.6952381	4.916	831.1428571	2885.419048	130	80	#DIV/0!
標準偏差	10.55550271	4.497723635	84.50298583	169.40319	0	#DIV/0!	#DIV/0!
標準誤差	0.728398888	0.310372418	5.831260018	11.68993071	0	0	65535
中央値(メジアン)	63	3.565	772	2800	130	80	#NUM!
最頻値(モード)	59	1.08	772	2800	130	#N/A	#N/A
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	7	0	88	210	157	159	195
平均	294	#DIV/0!	151.4772727	1890.014286	262.2993631	2636.484277	4730.066667
標準偏差	0	#DIV/0!	181.6371258	2595.595011	119.9402343	1603.86318	3488.042775
標準誤差	0	65535	19.36258266	179.1130723	9.572272793	127.1946238	249.7839313
中央値(メジアン)	294	#NUM!	45	1525	252	2276	4277
最頻値(モード)	294	#N/A	10	1120	294	1924	4277
	うちEPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標本数	182	210	112	93	7	2	1
平均	4282.620879	34159.20476	4453.473214	4433.182796	3655	2821.5	13260
標準偏差	2311.916455	2251.338199	728.2995122	161.8050992	682.6038383	1470.074998	#DIV/0!
標準誤差	171.3706493	155.3570953	68.81783533	16.77840719	258	1039.5	0
中央値(メジアン)	4277	33579	4589	4459	3913	2821.5	13260
最頻値(モード)	7852	33579	4589	4459	3913	#N/A	#N/A
	ダイア計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標本数	210	210	29	182	64	6	0
平均	4550.3	27408.95238	5620.689655	1560	1309.921875	11870	#DIV/0!
標準偏差	619.9997843	305.0089772	1786.132956	0	6185.307749	17374.39956	#DIV/0!
標準誤差	42.78404979	21.04761905	331.6765633	0	773.1634686	7093.068917	65535
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	2200	#NUM!
最頻値(モード)	4589	27430	6500	1560	156	#N/A	#N/A
	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標本数	57	0	2	4	88	60	36
平均	144.6842105	#DIV/0!	14380	428.5	579.3409091	680.5166667	241.6944444
標準偏差	50.22988506	#DIV/0!	15765.65279	462.2073849	674.5051125	647.3027346	225.9373895
標準誤差	6.653110806	65535	11148	231.1036925	71.90248659	83.5664237	37.65623158
中央値(メジアン)	156	#NUM!	14380	286	357	465.5	170
最頻値(モード)	156	#N/A	#N/A	286	96	550	96
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標本数	178	156	57	204	55	201	210
平均	284.4213483	27.05769231	697.8947368	1028.147059	461.4545455	817.7462687	48043.81905
標準偏差	669.1133158	35.57622265	793.8373503	741.1148957	227.5220639	17.77470952	7030.508132
標準誤差	50.15216337	2.848377426	105.1463257	51.88842142	30.67906884	1.253731343	485.1511527
中央値(メジアン)	17	17	295	819	435	819	46605.5
最頻値(モード)	17	17	103	819	486	819	43093
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標本数	210	210	210	210	210	210	210
平均	47267.62857	46691.81905	45915.62857	46868.41429	46292.60476	45516.41429	43626.4
標準偏差	6407.842191	6982.122547	6357.340003	5041.32833	5615.659058	4991.553189	4277.906177
標準誤差	442.1831206	481.8122301	438.6981385	347.8847054	387.5172909	344.4498943	295.2035719
中央値(メジアン)	46168.5	45499.5	44922.5	45994	45493.5	44864	43082.5
最頻値(モード)	43093	41533	41533	53606	52046	52046	39730

表9-7 DM・非DM別集計結果表 -病院1・病院2計-非DM

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標 本 数	2,363	2,361	2,373	2,373	323	8	0
平 均	57.58569615	9.373358746	828.8171091	2884.040034	130	80	#DIV/0!
標準偏差	12.48574796	6.9750619	95.66506934	145.5772559	0	0	#DIV/0!
標準誤差	0.256851853	0.143548967	1.963832855	2.988440818	0	0	65535
中央値(メジアン)	58	8.01	772	2800	130	80	#NUM!
最 頻 値 (モード)	52	2.06	772	2800	130	80	#N/A
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標 本 数	202	78	859	0	1,845	1,861	2,136
平 均	291.0891089	174	98.28288708	#DIV/0!	241.9279133	1791.48576	4219.211142
標準偏差	20.53081606	0	166.1984808	#DIV/0!	112.0494579	1138.537729	3007.431714
標準誤差	1.444543177	0	5.670618988	65535	2.608624535	26.39211776	65.07214921
中央値(メジアン)	294	174	20	#NUM!	210	1582	4277
最 頻 値 (モード)	294	174	10	#N/A	168	1073	4277
	うちEPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標 本 数	1,916	2,373	1,658	676	20	26	11
平 均	4247.541754	34012.38727	4562.896261	4392.531065	3732.4	3598.269231	13260
標準偏差	2218.106476	2917.738602	284.1499389	471.5218865	555.8750712	748.1897384	0
標準誤差	50.67393587	59.89595752	6.978391073	18.13545717	124.2974446	146.7320798	0
中央値(メジアン)	4277	32021	4589	4459	3913	3861	13260
最 頻 値 (モード)	4277	32019	4589	4459	3913	3861	13260
	ダイア計	4～5時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標 本 数	2,373	2,373	715	379	566	40	4
平 均	4571.721871	27425.79435	5810.48951	1555.567282	666.4222615	6040.875	2625.25
標準偏差	632.8438299	196.3396363	1636.022765	55.71452734	3187.433569	7706.826099	1519.65399
標準誤差	12.9911525	4.030501742	61.1837824	2.861863037	133.9778261	1218.5562	759.8269951
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	1600	2345
最 頻 値 (モード)	4589	27430	6500	1560	156	13400	2345
	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標 本 数	502	3	5	32	847	479	412
平 均	139.0239044	23299	16237.6	883.25	640.9929162	813.7891441	304.0873786
標準偏差	43.22488456	7287.212293	5047.764882	2366.607658	723.8701671	715.2621659	336.220198
標準誤差	1.929221013	4207.273979	2257.429082	418.3610808	24.8724733	32.68116252	16.56438025
中央値(メジアン)	156	26245	13471	286	380	575	240
最 頻 値 (モード)	156	#N/A	13471	286	25	1000	380
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標 本 数	1,822	1,511	650	2,267	577	2,236	2,373
平 均	352.1717892	31.6783587	783.9630769	938.3890604	455.4800693	818.7464222	44495.50527
標準偏差	894.6748154	69.20628384	982.9215917	317.3160786	233.6857236	13.652793	4865.947885
標準誤差	20.95998783	1.780382421	38.55335674	6.664480761	9.728463963	0.288725808	99.88921133
中央値(メジアン)	17	17	362.5	819	405	819	43963
最 頻 値 (モード)	17	17	103	819	324	819	46282
	除 夜 間	除 障 害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標 本 数	2,373	2,373	2,373	2,373	2,373	2,373	2,373
合 計	101,433,334	104,998,274	100,843,774	101,056,109	104,621,049	100,466,549	100,466,549
平 均	42744.7678	44247.06026	42496.3228	42585.80236	44088.09482	42337.35735	42337.35735
標準偏差	4249.716342	4824.924249	4176.473975	3891.878724	4536.891202	3819.334445	3819.334445
標準誤差	87.23907938	99.04706941	85.73554451	79.89331278	93.13426586	78.40410841	78.40410841
中央値(メジアン)	41999	43663	41839	41968	43581	41780	41780
最 頻 値 (モード)	41780	42284	41780	42565	45177	41780	41780

表 9-8 DM・非DM別集計結果表 -病院1-DM

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標 本 数	162	162	162	162	16	0	0
平 均	61.7962963	4.378765432	804.3209877	2899.37037	130	#DIV/0!	#DIV/0!
標準偏差	11.09649314	4.211970927	75.20850143	178.4708647	0	#DIV/0!	#DIV/0!
標準誤差	0.871822839	0.330923689	5.908937929	14.02199541	0	65535	65535
中央値(メジアン)	63	3.07	772	2810	130	#NUM!	#NUM!
最 頻 値 (モード)	52	1.08	772	2800	130	#N/A	#N/A
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標 本 数	7	0	77	162	115	117	151
平 均	294	#DIV/0!	155.3246753	1892.450617	267.4173913	2631.82906	4565.463576
標準偏差	0	#DIV/0!	174.1489412	2818.934901	114.3404414	1571.515765	3154.716494
標準誤差	0	65535	19.84611373	221.4764427	10.66230114	145.2866838	256.7271873
中央値(メジアン)	294	#NUM!	60	1524.5	252	2264	4277
最 頻 値 (モード)	294	#N/A	10	1120	168	1924	4277
	うち EPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標 本 数	139	162	78	81	3	1	0
平 均	4325.827338	34172.30247	4548.269231	4450.530864	3913	3861	#DIV/0!
標準偏差	2258.33447	2119.799144	402.2034658	120.9690132	0	#DIV/0!	#DIV/0!
標準誤差	191.5494297	166.5471499	45.54057473	13.44100147	0	0	65535
中央値(メジアン)	4277	33579	4589	4459	3913	3861	#NUM!
最 頻 値 (モード)	7852	33449	4589	4459	3913	#N/A	#N/A
	ダイア計	4～5時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標 本 数	162	162	23	145	49	6	0
平 均	4511.469136	27430	5391.304348	1560	1664.387755	11870	#DIV/0!
標準偏差	123.1623265	0	1947.939014	0	7047.309312	17374.39956	#DIV/0!
標準誤差	9.676546251	0	406.1733622	0	1006.758473	7093.068917	65535
中央値(メジアン)	4459	27430	6500	1560	156	2200	#NUM!
最 頻 値 (モード)	4459	27430	6500	1560	156	#N/A	#N/A
	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標 本 数	42	0	2	4	59	41	27
平 均	142.0714286	#DIV/0!	14380	428.5	628.9322034	715.5365854	253.8518519
標準偏差	35.57225067	#DIV/0!	15765.65279	462.2073849	670.8549066	601.2313239	248.359495
標準誤差	5.488917443	65535	11148	231.1036925	87.33786971	93.89655762	47.79680709
中央値(メジアン)	156	#NUM!	14380	286	439	550	170
最 頻 値 (モード)	156	#N/A	#N/A	286	364	550	44
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標 本 数	137	119	45	159	47	159	162
平 均	295.5693431	25.87394958	779.6444444	1083.106918	502.3404255	817.4150943	47980.2716
標準偏差	637.7373468	37.15281193	814.8405632	816.6206267	213.9634545	19.98489996	7290.737271
標準誤差	54.48557858	3.405792686	121.4692593	64.7622283	31.20977747	1.58490566	572.8144182
中央値(メジアン)	17	17	456	819	486	819	46630.5
最 頻 値 (モード)	17	17	103	819	486	819	#N/A
	除 夜 間	除 障 害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標 本 数	162	162	162	162	162	162	162
平 均	47214.83951	46583.97531	45818.54321	46711.41358	46080.54938	45315.11728	43422.66667
標準偏差	6599.548554	7245.609257	6559.287053	4814.026638	5481.45446	4773.604891	3915.598862
標準誤差	518.5095039	569.2688266	515.3462617	378.2256534	430.6637355	375.049821	307.6385008
中央値(メジアン)	46402.5	45474	44922.5	46289.5	45422.5	44851	43088.5
最 頻 値 (モード)	#N/A	#N/A	#N/A	53606	52046	52046	#N/A

表9-9 DM・非DM別集計結果表 -病院1-非DM

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	1,700	1,698	1,710	1,710	198	3	0
平均	57.54647059	9.348939929	792.3526316	2897.805263	130	80	#DIV/0!
標準偏差	12.45628799	7.000936796	76.97137372	157.2295958	0	0	#DIV/0!
標準誤差	0.302109359	0.169897627	1.861363452	3.802211252	0	0	65535
中央値(メジアン)	58	8.01	772	2810	130	80	#NUM!
最頻値(モード)	58	4.08	772	2800	130	80	#N/A
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	202	78	600	0	1,222	1,238	1,544
平均	291.0891089	174	114.825	#DIV/0!	256.4116203	1812.882068	4212.398316
標準偏差	20.53081606	0	179.4893267	#DIV/0!	116.2133017	1193.715946	2908.462048
標準誤差	1.444543177	0	7.327621079	65535	3.324453303	33.92662614	74.01841023
中央値(メジアン)	294	174	20	#NUM!	242	1594	4277
最頻値(モード)	294	174	10	#N/A	168	1073	4277
	うちEPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標本数	1,391	1,710	1,189	514	3	3	6
平均	4247.272466	34104.5386	4574.569386	4427.636187	3913	2970	13260
標準偏差	2237.165049	2943.716702	224.0875617	346.8901241	0	1543.25727	0
標準誤差	59.98386709	71.18655182	6.498705007	15.30066745	0	891	0
中央値(メジアン)	4277	32027	4589	4459	3913	3861	13260
最頻値(モード)	4277	32019	4589	4459	3913	3861	13260
	ダイア計	4~5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標本数	1,710	1,710	539	263	412	28	4
平均	4570.278947	27431.91813	5877.55102	1554.068441	642.5849515	5517.357143	2625.25
標準偏差	558.6010246	138.6748886	1570.770634	66.45743538	3134.724198	6580.722465	1519.65399
標準誤差	13.50839255	3.353511271	67.65788085	4.09794102	154.4367766	1243.639649	759.8269951
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	1972.5	2345
最頻値(モード)	4589	27430	6500	1560	156	13400	2345
	うちベンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標本数	356	3	3	27	537	351	279
平均	133.755618	23299	18082	858.2962963	705.3780261	803.3304843	298.046595
標準偏差	44.55039048	7287.212293	6180.863047	2567.930217	642.7668072	624.3352205	235.2298921
標準誤差	2.361165973	4207.273979	3568.522944	494.1984007	27.73743507	33.32454874	14.08284527
中央値(メジアン)	156	26245	15758	286	513	694	274
最頻値(モード)	156	#N/A	#N/A	286	1000	1000	380
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標本数	1,323	1,072	466	1,647	526	1,634	1,710
平均	317.0929705	32.58768657	728.223176	982.3685489	468.7737643	818.6915545	44495.77018
標準偏差	780.1919086	78.48521397	917.3910703	346.457163	213.0951322	15.89579785	4763.809382
標準誤差	21.44971469	2.397123745	42.49732069	8.536950145	9.291389303	0.393238748	115.2010189
中央値(メジアン)	17	17	345.5	819	405	819	44072
最頻値(モード)	17	17	103	819	324	819	46282
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標本数	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
平均	42643.1386	44256.75263	42404.12105	42488.31696	44101.93099	42249.29942	42249.29942
標準偏差	4132.312382	4710.967704	4052.915441	3729.889159	4379.355167	3649.934837	3649.934837
標準誤差	99.92981638	113.9231728	98.00979653	90.1982	105.9039388	88.26470129	88.26470129
中央値(メジアン)	41984.5	43766.5	41780	41968.5	43692.5	41735	41735
最頻値(モード)	41780	40750	41780	42565	45177	41780	41780

表9-11 DM・非DM別集計結果表 - 病院2 - 非DM

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標 本 数	663	663	663	663	125	5	0
平 均	57.68627451	9.435897436	922.8657617	2848.536953	130	80	#DIV/0!
標準偏差	12.56984986	6.913213566	72.13725853	101.804199	0	0	#DIV/0!
標準誤差	0.488172517	0.268486967	2.801578974	3.953747469	0	0	65535
中央値(メジアン)	57	8.07	910	2800	130	80	#NUM!
最 頻 値 (モード)	52	4.03	910	2800	130	80	#N/A
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標 本 数	0	0	259	0	623	623	592
平 均	#DIV/0!	#DIV/0!	59.96138996	#DIV/0!	213.5184591	1748.967897	4236.97973
標準偏差	#DIV/0!	#DIV/0!	122.2757339	#DIV/0!	97.41139545	1019.656514	3253.941736
標準誤差	65535	65535	7.597844414	65535	3.90270515	40.85167563	133.7361815
中央値(メジアン)	#NUM!	#NUM!	10	#NUM!	210	1555	4277
最 頻 値 (モード)	#N/A	#N/A	10	#N/A	210	1768	7852
	うちEPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標 本 数	525	663	469	162	17	23	5
平 均	4248.255238	33774.71192	4533.302772	4281.148148	3700.529412	3680.217391	13260
標準偏差	2168.903783	2838.036966	396.4578609	729.5908853	599.7826812	598.9683522	0
標準誤差	94.65872151	110.2202226	18.30672308	57.32207361	145.4686675	124.893535	0
中央値(メジアン)	4277	32019	4589	4459	3913	3861	13260
最 頻 値 (モード)	7852	32019	4589	4459	3913	3861	13260
	ダイア計	4～5時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標 本 数	663	663	176	116	154	12	0
平 均	4575.443439	27410	5605.113636	1558.965517	730.1948052	7262.416667	#DIV/0!
標準偏差	793.3681476	296.8719093	1810.769998	11.14172029	3334.018381	10097.5789	#DIV/0!
標準誤差	30.81186569	11.52954958	136.4919242	1.034482759	268.6628574	2914.919949	65535
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	1145	#NUM!
最 頻 値 (モード)	4589	27430	6500	1560	156	1100	#N/A
	うちベンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標 本 数	146	0	2	5	310	128	133
平 均	151.869863	#DIV/0!	13471	1018	529.4612903	842.46875	316.7593985
標準偏差	36.90701526	#DIV/0!	0	718.9019405	835.6220152	922.0528444	484.9785398
標準誤差	3.054446316	65535	0	321.5027216	47.46014125	81.49872736	42.05297269
中央値(メジアン)	156	#NUM!	13471	1100	176	550	176
最 頻 値 (モード)	156	#N/A	13471	1100	25	550	96
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標 本 数	499	439	184	620	51	602	663
平 均	445.1763527	29.45785877	925.1304348	821.5596774	318.372549	818.8953488	44494.82202
標準偏差	1139.789548	37.9805577	1122.448365	174.925439	362.3012537	2.56768831	5123.706462
標準誤差	51.02398771	1.812713117	82.74799133	7.025174684	50.732323	0.104651163	198.9882702
中央値(メジアン)	21	17	411	819	187	819	43742
最 頻 値 (モード)	17	17	48	819	162	819	48905
	除 夜 間	除 障 害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標 本 数	663	663	663	663	663	663	663
平 均	43006.88839	44222.06184	42734.12821	42837.23529	44052.40875	42564.47511	42564.47511
標準偏差	4531.264816	5110.726572	4473.886256	4274.23288	4923.29736	4219.49049	4219.49049
標準誤差	175.9797433	198.4841731	173.7513446	165.99745	191.2050257	163.8714317	163.8714317
中央値(メジアン)	42053	43509	41908	41961	43368	41888	41888
最 頻 値 (モード)	41050	48905	41050	40946	48905	40946	40946

表9-14 DM・非DM別集計結果表 -TTEST=P値-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
病 院 DM 非DM P 値	3.93462E-06	1.8764E-19	0.733338173	0.896792069	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
病院 1 DM 非DM P 値	2.96037E-05	1.50709E-18	0.058219374	0.904800983	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
病院 2 DM 非DM P 値	0.04722121	0.00793989	0.909344429	0.509684528	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
診療所 DM 非DM P 値	0.002024425	1.21325E-09	0.645690535	0.008961961	# DIV/0!	# DIV/0!	0.901223666
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
病 院 DM 非DM P 値	0.708603559	# DIV/0!	0.004690129	# DIV/0!	0.029779529	9.86843E-18	0.025270161
病院 1 DM 非DM P 値	0.708603559	# DIV/0!	0.061894912	# DIV/0!	0.331103249	9.11176E-12	0.157928367
病院 2 DM 非DM P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	0.103272899	# DIV/0!	0.029723494	2.02041E-07	0.043568349
診療所 DM 非DM P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	0.222220385	# DIV/0!	0.013979463	4.81256E-08	0.242245383
	うち EPO	40：処置	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
病 院 DM 非DM P 値	0.839049725	0.477359254	0.000700992	0.409991032	0.767153478	0.190917761	# DIV/0!
病院 1 DM 非DM P 値	0.69334691	0.774893911	0.346151139	0.556737955	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
病院 2 DM 非DM P 値	0.762447985	0.42097217	0.000599135	0.869590041	0.520537762	# DIV/0!	# DIV/0!
診療所 DM 非DM P 値	0.624293078	0.278946152	0.029467047	0.716699194	0.51781581	# DIV/0!	# DIV/0!
	ダイヤ計	4~5 時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
病 院 DM 非DM P 値	0.637723965	0.25915801	0.541885587	0.283805235	0.176079166	0.16038061	# DIV/0!
病院 1 DM 非DM P 値	0.181508981	0.860306743	0.150772641	0.283388442	0.071315351	0.132556575	# DIV/0!
病院 2 DM 非DM P 値	0.396006394	0.145036652	0.228897601	0.57392963	0.503885895	# DIV/0!	# DIV/0!
診療所 DM 非DM P 値	0.223695184	0.62184687	0.859011921	0.521613106	0.621851501	0.369793194	# DIV/0!
	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
病 院 DM 非DM P 値	0.357546434	# DIV/0!	0.801448039	0.70722453	0.444374391	0.169917481	0.275640714
病院 1 DM 非DM P 値	0.244242458	# DIV/0!	0.722812346	0.744283695	0.388273779	0.392959879	0.354328888
病院 2 DM 非DM P 値	0.990982139	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	0.750060214	0.286126483	0.493958484
診療所 DM 非DM P 値	0.868592985	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	0.443434783	0.616879251	0.976637175
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
病 院 DM 非DM P 値	0.32538172	0.410849059	0.520548116	0.000944125	0.855976846	0.33333895	6.44428E-22
病院 1 DM 非DM P 値	0.754893524	0.356980444	0.717211328	0.003114425	0.301422913	0.345919403	7.1206E-17
病院 2 DM 非DM P 値	0.27555583	0.826332054	0.105331569	0.665838295	0.459779955	0.79190768	1.55678E-06
診療所 DM 非DM P 値	0.15414966	0.903826674	0.092261933	0.088251968	0.035485226	0.594536885	5.15409E-14
	除 夜 間	除 障 害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
病 院 DM 非DM P 値	2.10105E-43	1.87657E-11	1.14133E-26	4.06765E-48	4.7056E-11	1.1435E-28	3.65293E-06
病院 1 DM 非DM P 値	3.3122E-35	1.51875E-08	2.43826E-21	3.88754E-39	9.0149E-08	1.23204E-22	0.000105669
病院 2 DM 非DM P 値	2.4588E-10	0.000270546	3.46944E-07	8.14796E-12	8.58344E-05	2.90135E-08	0.006655364
診療所 DM 非DM P 値	2.66748E-29	2.77628E-06	5.06386E-16	1.69449E-32	8.57467E-07	8.42669E-18	0.021393959

表 10-1 第1回調査から今回までの比較（I）

	1997年	1998年	1999年	2000年
施設数	34	99	125	128
総数（人）	3,779	3,882	4,519	4,748
病院（人）	1,861	1,636	2,039	2,583
診療所（人）	1,918	1,967	2,480	2,165
透析回数（回）	12.5	13	13	13
平均年齢（歳）	57.1	56.4	56.9	57.8
透析歴（年）	8.5	8.9	8.7	9.0

表 10-2 第1回調査から今回までの比較（II）

	1997年	1998年	1999年	2000年
管理指導料（点）	2,593.2	3,019.4	3,025.8	2,920.6
在宅注射（%）	7.8	6.1	6.3	7.3
投薬（点）	1,628.1	1,815.0	1,684.3	1,755.5
EPO（%）	72.7	78.1	78.7	79.6
夜間加算（%）	29.5	30.6	31.1	30.3
障害者加算（%）	25.9	19.0	17.6	20.8
検査（点）	533.9	600.9	665.3	575.1
画像診断（点）	365.8	158.9	161.2	217.7
透析食（点）	—	817.9	818.0	818.7
院外処方（%）	19.5	13.3	26.5	27.7
除夜障害手術（点）	4,3124.7	43,525.7	43,095.5	42,303.5
透析医療費/1回（点）	3,450.0	3,348.1	3,315.0	3,254.1
II型（%）	—	—	96.9	98.2