

[実態調査]

第7回透析医療費実態調査報告書

鈴木 満 杉崎弘章 吉田豊彦 山崎親雄

はじめに

平成16年度の診療報酬改定は、薬価および特定医療材料が1.0%の引き下げとし、技術料等の診療報酬本体の改定率は0%とすると平成15年12月18日の中医協が決定した。前回改定の混乱した政治決着と異なり、中医協の場で結論が下されたのは何年振りだろうか。しかし、診療報酬本体の改定がゼロであることはそのパイが保証されたことであって、透析医療費のパイを保証されたことにならないのは、毎度のことである。

昨年12月17日、中医協総会で青柳日医副会長が年々増加する透析患者数と透析医療費について質問した際の事務局（厚労省保険局医療課）が回答した資料が表1-1、1-2である。平成13年度の透析年間医療費が9,500億円で平成14年度改定により月間1人当たり

38.3万円が35万円に削減した結果、平成14年度は9,200億円に削減されたものの、15年度では患者増により13年度を上回る9,600億円になるという。この質疑が意味するものが、丁度、本文が会員諸兄のお手元に届く頃に明白になると思う。

1 実態調査の目的

7回を重ねた本調査は、前述した日本医師会および厚労省保険局に提出する要望書の貴重な説明資料になる。経年的かつ定点調査が実態を証明する上で不可欠となるが、今回は182施設から9,285人のレセプトが寄せられ、調査基準を満たして入力した有効回答レセプトは8,633人であった。

2 集計方法

今回調査の分析基準は、慢性維持透析患者外来医学

表1-1 人工透析に係る患者数

	平成10年末	平成11年末	平成12年末	平成13年末	平成14年末
患者数	185,322	197,213	206,134	219,183	229,538

厚生労働省 第46回中央社会保険協議会総会 資料（中医協 総-1 15.12.17）より引用
日本透析医学会調べ

表1-2 人工透析に係る医療費

	平成11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度
年間医療費 （患者1人当たりの 月間医療費）	8,700億 （39.4万）	9,300億 （39.4万）	9,500億 （38.3万）	9,200億 （35万）	9,600億 （35万）

厚生労働省 第46回中央社会保険協議会総会 資料（中医協 総-1 15.12.17）より引用
医療課推計

管理料を算定し、火・木・土に週3回の治療を行っており、6月に計13回の請求をしている患者で、HDF施行患者とリクセル使用患者は調査対象から外している。

今回調査の集計方法は開始当初からの原則と同様であるが、今回は6月に13回の治療を行えた患者群は月・水・金であったので、対象患者群は第2回から第5回の対象に戻ったことになる。

3 集計結果

1) 第1回透析医療費実態調査（以下調査）から第7回調査までのまとめ

表2-1に示したのが、病院と診療所の8,633人の平均点数である。内訳は、病院に通院する患者は4,328人で診療所に通院する患者は4,305人である。前回調査より3,359人多いご協力を得た。透析回数は第1回調査を除いて13回である。平均年齢は59.4歳で透析歴は8.96年であり、前回調査と比較すると異なるが、この結果は月・水・金の患者群と火・木・土の患者群の相違と推定できる。同じ患者群である2001年と比較するとインシュリンの自己注射を行っている在宅注射の比率が10.5%から8.4%に下がり、EPOの投与比率も83.2%から82.3%に下がっている。夜間加算が前回の17.9%から30.2%に上昇していることは、全国的に月・水・金には夜間透析が行われて社会復帰している患者群が多く、火・木・土では比較的高齢者の昼間透析が行われていることになる。障害者加算が24.3%から20.8%に下がったのも同様である。

包括以外の検査は524.1点であった。画像診断は228.6点が請求され、院外処方33.8%を示した。夜間加算、障害者加算および手術の算定を除いた請求点数の平均は39,604.5点であり、13回で除した1回当たりの点数は3,046.5点であった。98.99%にII型のダイアライザが使用されている。

表2-2が上記内容の一覧であり、表2-3は最頻値の一覧である。30：注射では、EPOが投与されている7,106人の内775人に4.225点が請求されているのが最頻で、その投与量は1回当たり1,500単位である。表2-4は診療行為別の構成比率を表す。投薬は3.01%、注射は10.16%そしてダイアライザは10.01%であり、その総和は23.18%となる。包括部分にも薬価対象が含まれるが、最低でもこの23.18%に対して医

療費削減が行われる。

2) 病院と診療所の比較

表3-1は病院（表3-2：病院1・2計）、200床以下の病院（表3-3：病院1）、200床以上の病院（表3-4）と診療所（表3-5）の間のP値の一覧である。有意差が認められるのは以下についてである。

- * 病院1の年齢59.96歳と診療所の年齢59.02歳とに有意差がある。
- * 13：指導で病院の2,772.1点と診療所の2,892.7点に有意差がある。
- * 230施設の診療所で集団栄養指導料の算定をしているが、病院1では84施設が算定しているだけである。
- * 病院の投薬点数は1,868.8点であるが、診療所の投薬は1,731.8点と低い。
- * 病院の注射は4,888.9点で診療所は4,379.1点と低い。
- * EPOの投与は病院で4,434.9点であるが、診療所は4,074.1点と低い。
- * 病院の40：処置の算定は31,653.8点で診療所は31,936.7点と高い。
- * 病院のダイアライザ計の算定は4,143.6点で診療所は4,219.9点と高い。
- * 病院の60：検査の算定は575.9点であるが診療所は451.9点と低い。
- * 生体検査も同様である。
- * 病院の70：画像の算定は366.1点であるが診療所は90.7点と低い。
- * 病院の請求合計は42,140.1点であり診療所は41,508.0点と低い。
- * 病院の除く夜間・障害・手術（除夜障手）の算定は39,991.9点で診療所は39,215.6点と低い。

3) 病院および診療所における男性と女性の相違について

男性の総数は5,563人で平均年齢は58.8歳で透析歴は8.8年であった。女性は3,062人で平均年齢は60.4歳で透析歴は9.3年であった。P値をみると以下の4項目に有意差が認められた。

- * 男性が58.8歳で女性60.4歳の年齢に有意差があった。

- * 20：投薬で男性は1,836.0点が算定されており、女性は1,739.3点と低い。
- * 40：処置で男性は32,393.3点であり女性は30,710.2点と低い。
- * 請求合計は男性が42,329.0点で女性は40,912.4点と女性が低い、除く夜間・障害・手術では男女間に有意差はない。

4) 年齢別の分析について

40歳未満の587人、40～65歳未満5,018人、65～70歳未満の1,177人、70歳以上の1,844人および75歳以上の997人の5群で比較検討した。

透析歴がこの5群間のすべてで有意差があった。透析歴は40歳未満で7.4年、40～65歳未満で10.1年、65～70歳未満で8.9年および70歳以上で6.4年、75歳以上で5.9年であった。

20：投薬で、40～65歳未満の1,768.3点と65～70歳未満の1,965.9点の間でのみ有意差があった。他の年齢間に有意差はない。

30：注射で年齢別群間に40歳未満と40～65歳未満、65～70歳未満と70歳以上および65～70歳未満と75歳以上を除く年齢群間に有意差があった。またこの有意差のある群間とEPO投与の有意差が連動していた。以下に有意差を認めた年齢群と30：注射と内EPO投与の算定点数を列記す。

- * 40歳未満で注射は4,216.3点、EPOの算定点数は3,892.5点であった。
- * 40～65歳未満の注射は4,489.6点、EPOの算定点数は4,160.3点であった。
- * 65～70歳未満は注射4,835.3点とEPO4,423.5点であった。
- * 70歳以上の注射は5,035.3点、EPOの算定点数は4,512.6点であった。
- * 75歳以上の注射は5,046.1点、EPOの算定点数は4,557.7点であった。
- * 40歳未満と65～70歳未満に有意差があった。
- * 40歳未満と70歳以上に有意差があった。
- * 40歳未満と75歳以上で有意差があった。
- * 40～65歳未満と65～70歳未満に有意差があった。
- * 40～65歳未満と70歳以上に有意差があった。
- * 40～65歳未満と75歳以上に有意差があった。

40：処置の算定ではすべての年齢群間に有意差が認められた。処置の算定点数は40歳未満で33,499.7点、40～65歳未満は32,361.5点、65～70歳未満で30,944.6点、70歳以上で30,256.2点そして75歳以上で30,142.8点であり、加齢と共に40：処置の診療行為別の算定点数は低くなる。

請求合計と除く夜間・障害・手術の算定点数を下記に列記し、有意差の存否を列記する。

- * 40歳未満での請求合計は42,861.5点、除夜間障害手術の算定点数は38,983.6点であった。
- * 40～65歳未満の請求合計は42,172.6点、除夜間障害手術の算定点数は39,404.4点であった。
- * 65～70歳未満は請求合計は41,298.8点、除夜間障害手術の算定点数は39,901.2点であった。
- * 70歳以上の請求合計は40,895.4点、除夜間障害手術の算定点数は40,166.9点であった。
- * 75歳以上の請求合計は40,705.5点、除夜間障害手術の算定点数は40,098.0点であった。
- * 40歳未満と40～65歳未満には、請求合計で有意差は認められなかったが、除夜間障害手術では有意差があった。
- * 40歳未満と65～70歳未満で請求合計と除夜間障害手術に有意差があった。
- * 40歳未満と70歳以上で請求合計と除夜間障害手術に有意差があった。
- * 40歳未満と75歳以上で請求合計と除夜間障害手術に有意差があった。
- * 40～65歳未満と65～70歳未満で請求合計と除夜間障害手術に有意差があった。
- * 40～65歳未満と70歳以上で請求合計と除夜間障害手術に有意差があった。
- * 40～65歳未満と75歳以上で請求合計と除夜間障害手術に有意差があった。
- * 65～70歳未満は、70歳以上と75歳以上に対してともに請求合計と除夜間障害手術に有意差を認めなかった。

5) 透析歴別比較

透析歴10年未満の5,327人、10～15年未満の1,322人および15年以上の1,848人の3群で比較した。年齢と40：処置でのみ有意差を認めたが、注射、検査および除夜間障害手術等ほとんどほかの診療行為に

は有意差はなかった。

透析歴 10 年未満の平均年齢は 60.3 歳で 40：処置の算定点数は 31,466.6 点、10～15 年未満の平均年齢は 58.3 歳で 40：処置の算定点数は 31,973.7 点、15 年以上の平均年齢は 57.3 歳で 40：処置の算定点数は 32,597.5 点と、透析歴の長いほど年齢が低くなり、処置の点数は高くなった。

6) 年齢別・透析歴別集計について

透析歴 10 年未満で年齢別の n 数は 40 歳未満は 404 人、40～65 歳未満は 2,793 人、65～70 歳未満は 739 人、70 歳以上は 1,391 人で 75 歳以上は 775 人である (表 4-1, 2, 3, 4, 5)。透析歴 10 年以上 15 年未満での年齢別の n 数は 40 歳未満は 108 人、40～65 歳未満は 796 人、65～70 歳未満は 179 人、70 歳以上は 239 人で 75 歳以上は 124 人である (表 4-7, 8, 9, 10, 11)。透析歴 15 年以上の年齢別の n 数は 40 歳未満は 73 人、40～65 歳未満は 1,351 人、65～70 歳未満は 243 人、70 歳以上は 170 人で 75 歳以上は 73 人である (表 4-13, 14, 15, 16, 17)。

透析歴 10 年未満の P 値の一覧が表 4-6-1 および表 4-6-2 に示されている。20：投薬では、40 歳未満と 65～70 歳未満および 40～65 歳未満と 65～70 歳未満に有意差があるが、そのほかは投薬において有意差がない。内 EPO では、40 歳未満と 65～70 歳未満、40 歳未満と 70 歳以上、40 歳未満と 75 歳以上、40～65 歳未満と 70 歳以上、40～65 歳未満と 75 歳以上の 9 分類のうちの 5 分類で有意差を認める。内 EPO の算定点数は、40 歳未満で 3,904.4 点、40～65 歳未満で 4,213.5 点、65～70 歳未満で 4,413.5 点、70 歳以上で 4,546.0 点、75 歳以上で 4,602.2 点と加齢に従って点数は増加するがすべての年齢層では有意差を認めない。

すべての分類階層で有意差が認められるのは 40：処置である (表 4-6-1)。40：処置の算定点数は、40 歳未満で 33,389.5 点、40～65 歳未満で 32,060.5 点、65～70 歳未満で 30,660.2 点、70 歳以上で 30,146.5 点、75 歳以上で 30,099.3 点と加齢に伴って点数が減少する。

加齢に伴って増加する EPO 投与の差を上回る処置での算定が減少している。そして夜間加算と障害加算とは無関係の結果である。請求合計も各々 42,809.5 点、42,028.8 点、41,144.2 点、40,869.2 点、40,743.2 点と

加齢に伴って減少するが、65～70 歳未満と 70 歳以上および 75 歳以上との有意差はない。除く夜間・障害・手術ではさらに年齢が近接すると有意差が消失し、年齢が広がるほど有意差が認められる。

透析歴 10 年以上 15 年未満の P 値の一覧は、表 4-12-1 および表 4-12-2 である。40 歳未満と 70 歳以上および 75 歳以上は請求合計と除く夜間・障害・手術で共に有意差を認めるが、40～65 歳未満と 70 歳以上および 75 歳以上では、請求合計に有意差を認めるものの、除く夜間・障害・手術では有意差を失い、すべてに有意差を示すのは加齢に伴って減少する 40：処置のみである。投薬も EPO も有意差がない。

透析歴 15 年以上では、請求合計の算定点数は 40 歳未満で 42,999.0 点、40～65 歳未満で 42,429.7 点、65～70 歳未満で 41,513.8 点、70 歳以上で 41,147.3 点、75 歳以上で 40,201.4 点となるが、40 歳未満と 75 歳以上、40～65 歳未満と 70 歳以上および 75 歳以上が有意差を示すのみである。除く夜間・障害・手術では、唯一、40～65 歳未満と 75 歳以上が有意差を示した (表 4-18-1, 2)。ここでも、40：処置の算定点数が 65～70 歳未満と 70 歳以上を除く年齢階層で有意差を示した。その算定点数は各々、33,899.4 点、32,962.7 点、31,476.6 点、30,849.0 点、30,472.4 点と加齢に従って減少する。そして検定はしていないが、処置の算定点数に、透析歴による差が歴然としてはいないと考える。

7) 院内処方と院外処方について

当然、投薬に有意差が認められ、院外処方に伴う請求合計や除く夜間・障害・手術に連動した有意差が認められた。請求合計は院内が 42,112.9 点で院外処方のそれは 41,204.9 点であった。80：その他の院外処方箋では、最頻値が 276 点で平均値は 361.2 点であった。

8) DM と非 DM について

例年のごとく、インシュリンの自己注射を行っている 729 人の透析患者を DM とし、そのほかの患者 7,897 人を非 DM として検討した。

DM の平均年齢は 61.5 歳で非 DM は 59.2 歳であり有意差が認められた。透析歴でも有意差があり、DM は 4.8 年で非 DM は 9.4 年であった。13：指導のうち栄養指導、集団栄養指導にも有意差を示した。投薬に

も有意差があり DM は 2,251.7 点で非 DM は 1,760.1 点であった。注射には有意差を認めていない。障害加算は DM の 561 人に 1,499.9 点が算定され、非 DM の 1,232 人に対する 1,913.5 点より低かった。手術では DM が平均 954.0 点を算定しているのに対し、非

DM は 424.1 点と DM が有意に高かった。

請求合計は DM が 44,199.6 点で非 DM は 41,605.9 点と DM が有意に高く、除く夜間・障害・手術でも DM は 41,770.9 点で非 DM の 39,405.0 点と比較して有意に高かった。

表 2-1 第1回～第7回調査までの集計結果

	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年
施設数	34	99	125	128	132	149	182
総数(人)	3,779	3,882	4,519	4,748	5,059	5,274	8,633
病院(人)	1,861	1,636	2,039	2,583	2,719	2,670	4,328
診療所(人)	1,918	1,967	2,480	2,165	2,339	2,604	4,305
透析回数(回)	12.5	13	13	13	13	13	13
平均年齢(歳)	57.1	56.4	56.9	57.8	58.4	62.6	59.4
透析歴(年)	8.5	8.9	8.7	9.0	9.0	7.8	8.96
管理指導料(点)	2,593.2	3,019.4	3,025.8	2,920.6	2,921.3	2,813.6	2,832.3
在宅注射(%)	7.8	6.1	6.3	7.3	7.6	10.5	8.4
投薬(点)	1,628.1	1,815.0	1,684.3	1,755.5	1,803.1	1,743.4	1,802.6
EPO(%)	72.7	78.1	78.7	79.6	81.9	83.2	82.3
夜間加算(%)	29.5	30.6	31.1	30.3	29.0	17.9	30.2
障害者加算(%)	25.9	19.0	17.6	20.8	21.3	24.3	20.8
検査(点)	533.9	600.9	665.3	575.1	608.0	528.5	524.1
画像診断(点)	365.8	158.9	161.2	217.7	208.0	212	228.6
透析食(点)	—	817.9	818	818.7	817.4	—	—
院外処方(%)	19.5	13.3	26.5	27.7	25.6	32.8	33.8
除夜障害手術(点)	43,124.7	43,525.7	43,095.5	42,303.5	42,971.6	39,286.1	39,604.8
透析医療費/1回(点)	3,317.3	3,348.1	3,315.0	3,254.1	3,305.5	3,022.0	3,046.5
II型(%)	—	—	96.9	98.2	98.7	99.0	98.99

表 2-2 病院・診療所別集計結果表 一病院・診療所計一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	8,626	8,503	8,633	8,633	1,725	315	1,289
合計	512,285	76,223.68	7,615,826	24,450,857	224,380	40,715	565,269
平均	59.3884767	8.964327884	882.1760686	2832.254952	130.0753623	129.2539683	438.5329713
標準偏差	12.49509685	7.372460365	100.4363074	225.154074	3.13003218	68.78147068	49.41793851
標準誤差	0.134534881	0.079951452	1.080960606	2.423254005	0.075362319	3.875396839	1.376442792
中央値 (メジアン)	60	7.04	954	2700	130	80	450
最頻値 (モード)	55	0.08	954	2670	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	422	261	4,069	729	5,978	6,021	7,912
合計	122,892	41,344	1,008,732	1,270,254	1,359,375	10,853,191	36,693,208
平均	291.2132701	158.4061303	247.906611	1742.460905	227.3962864	1802.55622	4637.665319
標準偏差	20.07082505	86.67656391	631.3562142	943.6711376	118.3511661	1231.881802	2928.984367
標準誤差	0.977032477	5.365144616	9.897616322	34.95078287	1.530715875	15.87576735	32.92864912
中央値 (メジアン)	294	174	20	1642	210	1575	4238
最頻値 (モード)	294	174	10	1120	210	30	4225
	うちEPO	うちDV ₃	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)	I型(292)
標本数	7,106	1,437	8,633	6,588	1,958	24	35
合計	30,264,774	3,040,474	274,484,929	27,263,713	7,808,430	91,179	123,224
平均	4259.045032	2115.848295	31794.84872	4138.389951	3987.962206	3799.125	3520.685714
標準偏差	2066.817506	908.6796104	2974.419519	182.2719693	264.0188528	303.1243557	915.0447039
標準誤差	24.51825344	23.97079286	32.01262977	2.24565528	5.966622973	61.875	154.6707849
中央値 (メジアン)	4225	2031	29896	4147	4017	3861	3796
最頻値 (モード)	4225	2418	29627	4147	4017	3861	3796
	特定積層型	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	63	8,633	8,633	2,610	1,793	2,602	111
合計	777,124	36,099,823	219,618,113	15,155,500	2,754,960	1,258,237	526,865
平均	12335.30159	4181.608132	25439.37368	5806.704981	1536.508645	483.5653344	4746.531532
標準偏差	1674.592609	818.0766757	480.1621022	1590.954291	158.3976407	2857.538451	6009.074577
標準誤差	210.9788377	8.804671155	5.167815605	31.14135093	3.740748958	56.01939792	570.3561182
中央値 (メジアン)	12636	4147	25480	6500	1560	143	1752
最頻値 (モード)	12636	4147	25480	6500	1560	143	3130
	うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	23	1,976	16	12	645	3,241	1,869
合計	52,918	260,585	439,886	162,947	335,666	1,698,610	1,074,835
平均	2300.782609	131.875	27492.875	13578.91667	520.4124031	524.1005862	575.0856073
標準偏差	1438.711891	43.39389285	7015.37823	8626.003609	2855.227406	563.3339385	583.6659813
標準誤差	299.9921669	0.976191771	1753.844558	2490.112753	112.4244693	9.895241569	13.50080706
中央値 (メジアン)	2100	143	28546.5	10803	117	330	401
最頻値 (モード)	1500	143	#N/A	#N/A	117	330	550
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	1,950	6,864	6,520	1,453	2,972	2,915	0
合計	601,879	1,568,812	323,001	1,189,510	1,180,267	1,036,250	0
平均	308.6558974	228.5565268	49.54003067	818.6579491	397.1288694	355.4888508	#DIV/0!
標準偏差	278.0079546	717.6741821	78.26818323	1172.897955	350.4418866	172.1082348	#DIV/0!
標準誤差	6.295640447	8.662409006	0.969307237	30.76999473	6.428232958	3.187736173	65535
中央値 (メジアン)	260	35	16	369	345	345	#NUM!
最頻値 (モード)	330	16	16	111	276	276	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	8,633	8,633	8,633	8,633	8,633	8,633	8,633
合計	361,074,191	345,921,603	358,322,143	343,166,643	344,663,366	357,063,906	341,908,406
平均	41824.88023	40069.68644	41506.09788	39750.56678	39923.93907	41360.35052	39604.81941
標準偏差	4849.022416	4335.783808	4773.365935	4204.318209	3966.605502	4479.866217	3837.721364
標準誤差	52.18832056	46.66451418	51.37405649	45.24959623	42.69117808	48.2152224	41.30404349
中央値 (メジアン)	41332	39403	40985	39131	39353	40931	39078
最頻値 (モード)	41608	37322	39143	37322	34397	39143	34397
	除夜障手在						
標本数	8,633						
合計	340,638,092						
平均	39457.67311						
標準偏差	3775.136892						
標準誤差	40.63046886						
中央値 (メジアン)	38926						
最頻値 (モード)	34397						

表 2-3 病院・診療所別集計結果表 一病院・診療所計一最頻値（モード）データ数一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	8,626	8,503	8,633	8,633	1,725	315	1,289
合 計	512,285	76,223.68	7,615,826	24,450,857	224,380	40,715	565,269
平 均	59.3884767	8.964327884	882.1760686	2832.254952	130.0753623	129.2539683	438.5329713
最頻値（モード）	55	0.08	954	2670	130	80	450
最頻値 データ数	343	88	4,092	2,979	1,724	208	1,223
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	422	261	4,069	729	5,978	6,021	7,912
合 計	122,892	41,344	1,008,732	1,270,254	1,359,375	10,853,191	36,693,208
平 均	291.2132701	158.4061303	247.906611	1742.460905	227.3962864	1802.55622	4637.665319
最頻値（モード）	294	174	10	1120	210	30	4225
最頻値 データ数	414	190	1,481	43	752	17	335
	うち EPO	うち DV ₃	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)	I型(292)
標本数	7,106	1,437	8,633	6,588	1,958	24	35
合 計	30,264,774	3,040,474	274,484,929	27,263,713	7,808,430	91,179	123,224
平 均	4259.045032	2115.848295	31794.84872	4138.389951	3987.962206	3799.125	3520.685714
最頻値（モード）	4225	2418	29627	4147	4017	3861	3796
最頻値 データ数	775	272	2,345	6,537	1,925	23	32
	特定積層型	ダイア計	4～5時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔
標本数	63	8,633	8,633	2,610	1,793	2,602	111
合 計	777,124	36,135,976	219,618,113	15,155,500	2,754,960	1,258,237	526,865
平 均	12335.30159	4185.795899	25439.37368	5806.704981	1536.508645	483.5653344	4746.531532
最頻値（モード）	12636	4147	25480	6500	1560	143	15800
最頻値 データ数	61	6,537	8,534	1,954	1,748	1,417	9
	うち輸血	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	23	1,976	16	12	645	3,241	1,869
合 計	52,918	260,585	439,886	162,947	335,666	1,698,610	1,074,835
平 均	2300.782609	131.875	27492.875	13578.91667	520.4124031	524.1005862	575.0856073
最頻値（モード）	1500	143	#N/A	#N/A	117	330	550
最頻値 データ数	3	1,444	#N/A	#N/A	423	342	280
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	1,950	6,864	6,520	1,453	2,972	2,915	0
合 計	601,879	1,568,812	323,001	1,189,510	1,180,267	1,036,250	0
平 均	308.6558974	228.5565268	49.54003067	818.6579491	397.1288694	355.4888508	#DIV/0!
最頻値（モード）	330	16	16	111	276	276	#N/A
最頻値 データ数	419	3,126	3,126	140	125	125	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	8,633	8,633	8,633	8,633	8,633	8,633	8,633
合 計	361,074,191	345,921,603	358,322,143	343,166,643	344,663,366	357,063,906	341,908,406
平 均	41824.88023	40069.68644	41506.09788	39750.56678	39923.93907	41360.35052	39604.81941
最頻値（モード）	41608	37322	39143	37322	34397	39143	34397
最頻値 データ数	6	7	2	7	7	6	7
	除夜障手在						
標本数	8,633						
合 計	340,638,092						
平 均	39457.67311						
最頻値（モード）	34397						
最頻値 データ数	7						

表 2-4 病院・診療所別集計結果表 一病院・診療所計-請求合計に対する合計の割合一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	8,626	8,503	8,633	8,633	1,725	315	1,289
比率(%)			2.11%	6.77%	0.06%	0.01%	0.16%
合計	512,285	76,223.68	7,615,826	24,450,857	224,380	40,715	565,269
請求合計			361,111,066	361,111,066	361,111,066	361,111,066	361,111,066
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	422	261	4,069	729	5,978	6,021	7,912
比率(%)	0.03%	0.01%	0.28%	0.35%	0.38%	3.01%	10.16%
合計	122,892	41,344	1,008,732	1,270,254	1,359,375	10,853,191	36,693,208
請求合計	361,111,066	361,111,066	361,111,066	361,111,066	361,111,066	361,111,066	361,111,066
	うち EPO	うち V・D ₃	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)	I型(292)
標本数	8,626	8,503	8,633	8,633	1,725	315	1,289
比率(%)	8.38%	0.84%	76.01%	7.55%	2.16%	0.03%	0.03%
合計	30,264,774	3,040,474	274,484,929	27,263,713	7,808,430	91,179	123,224
請求合計	361,111,066	361,111,066	361,111,066	361,111,066	361,111,066	361,111,066	361,111,066
	特定積層型	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	422	261	4,069	729	5,978	6,021	7,912
比率(%)	0.22%	10.01%	60.82%	4.20%	0.76%	0.35%	0.15%
合計	777,124	36,135,976	219,618,113	15,155,500	2,754,960	1,258,237	526,865
請求合計	361,111,066	361,111,066	361,111,066	361,111,066	361,111,066	361,111,066	361,111,066
	うち輸血	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	23	1,977	16	12	645	3,241	1,869
比率(%)	0.01%	0.07%	0.12%	0.05%	0.09%	0.47%	0.30%
合計	52,918	260,585	439,886	162,947	335,666	1,698,610	1,074,835
請求合計	361,111,066	361,111,066	361,111,066	361,111,066	361,111,066	361,111,066	361,111,066
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	1,950	6,864	6,520	1,453	2,972	2,915	0
比率(%)	0.17%	0.43%	0.09%	0.33%	0.33%	0.29%	0.00%
合計	601,879	1,568,812	323,001	1,189,510	1,180,267	1,036,250	0
請求合計	361,111,066	361,111,066	361,111,066	361,111,066	361,111,066	361,111,066	361,111,066
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	8,633	8,633	8,633	8,633	8,633	8,633	8,633
比率(%)	100.00%	95.80%	99.24%	95.04%	95.45%	98.89%	94.69%
合計	361,074,191	345,921,603	358,322,143	343,166,643	344,663,366	357,063,906	341,908,406
請求合計	361,074,191	361,074,191	361,074,191	361,074,191	361,074,191	361,074,191	361,074,191
	除夜障手在						
標本数	8,633						
比率(%)	94.34%						
合計	340,638,092						
請求合計	361,074,191						

表3-1 病院・診療所別集計結果表 一病院・診療所計-TTEST=P値一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
病院1							
病院2	P値	0.078650019	0.927099137	0	8.24691E-20	#DIV/0!	#DIV/0!
病院1							
診療所	P値	0.001084787	0.652751252	0	1.20125E-98	0.454309017	6.85622E-16
病院2							
診療所	P値	0.66448809	0.823114454	0	3.80126E-89	0.652122582	#DIV/0!
病院							
診療所	P値	0.005655595	0.652570754	0	1.2053E-141	0.38229519	4.75401E-16
		特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬
病院1							
病院2	P値	#DIV/0!	#DIV/0!	1.23147E-12	0.109530396	2.29642E-29	0.197519498
病院1							
診療所	P値	#DIV/0!	1.29343E-24	0.404380403	0.904872253	0.407675316	0.000773556
病院2							
診療所	P値	#DIV/0!	#DIV/0!	1.35838E-14	0.036607602	1.56826E-23	7.51556E-05
病院							
診療所	P値	#DIV/0!	1.29343E-24	0.00010055	0.457157415	7.02207E-05	1.58479E-05
		うちEPO	うちDV ₃	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)
病院1							
病院2	P値	0.152291493	0.908005306	0.739286691	0.598988073	0.262128196	#DIV/0!
病院1							
診療所	P値	3.75982E-10	0.337979164	7.81569E-05	0.48667584	0.719046082	#DIV/0!
病院2							
診療所	P値	1.23311E-09	0.412361082	0.002206686	0.997032923	0.416679357	0.657007329
病院							
診療所	P値	1.72241E-13	0.278984775	9.84689E-06	0.57214663	0.970810796	0.618850934
		特定積層型	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術
病院1							
病院2	P値	0.478058592	0.288716794	0.003511166	4.06888E-06	0.089274768	0.049238949
病院1							
診療所	P値	0.292110871	3.6922E-05	0.924045443	0.40567736	0.047066594	0.041618368
病院2							
診療所	P値	0.721807571	0.051491226	0.000450309	1.33257E-05	0.009942682	0.496926706
病院							
診療所	P値	0.490275025	1.4533E-05	0.190206348	0.226123849	0.005161486	0.128970515
		うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査
病院1							
病院2	P値	0.967915974	0.098444662	#DIV/0!	0.996049873	0.162737202	0.253608984
病院1							
診療所	P値	0.921374026	0.464582705	0.657992014	0.234795714	0.443305907	4.32844E-11
病院2							
診療所	P値	0.973654788	0.014774983	#DIV/0!	0.446358444	0.539909447	0.000786003
病院							
診療所	P値	0.925731659	0.921944107	0.657992014	0.158054439	0.711131229	5.73643E-10
		うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方
病院1							
病院2	P値	0.249128324	0.104918287	2.49089E-11	2.35921E-07	2.72833E-14	2.46857E-69
病院1							
診療所	P値	0.033751496	9.19107E-55	9.83604E-79	0.029167618	6.88022E-17	0.006272177
病院2							
診療所	P値	0.742614262	2.67446E-43	3.3058E-208	1.43775E-07	1.26121E-21	3.13442E-55
病院							
診療所	P値	0.084086617	6.2898E-58	2.3784E-120	0.00075427	6.59485E-08	0.013067242
		請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術
病院1							
病院2	P値	0.045839661	0.002339321	0.031674486	0.001062555	2.03717E-05	0.001754763
病院1							
診療所	P値	1.49098E-06	3.73227E-14	5.52946E-06	1.31692E-13	6.9216E-13	0.000133302
病院2							
診療所	P値	2.08134E-08	5.9681E-19	2.50111E-08	1.46221E-19	5.86813E-22	2.6666E-09
病院							
診療所	P値	1.34771E-09	1.86876E-21	5.32175E-09	3.84155E-21	1.91598E-21	5.52314E-08
		除夜障手在					
病院1							
病院2	P値	1.17734E-06					
病院1							
診療所	P値	4.08784E-11					
病院2							
診療所	P値	6.34265E-23					
病院							
診療所	P値	5.82457E-20					

表 3-2 病院・診療所別集計結果表 一病院 1・2 計一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	4,321	4,256	4,328	4,328	747	85	1
合計	258,223	37,999.14	3,484,091	11,997,792	97,110	6,800	294
平均	59.76000926	8.928369361	805.0117837	2772.133087	130	80	294
標準偏差	12.64402334	7.440065203	81.90919287	192.3180692	0	0	#DIV/0!
標準誤差	0.192350427	0.114044917	1.245056387	2.923320716	0	0	0
中央値 (メジアン)	60	7.03	759	2680	130	80	294
最頻値 (モード)	55	0.08	759	2670	130	80	#N/A
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	422	208	2,084	403	3,081	3,110	4,013
合計	122,892	38,194	438,402	711,639	682,437	5,812,009	19,619,285
平均	291.2132701	183.625	210.365643	1765.853598	221.4985394	1868.813183	4888.93222
標準偏差	20.07082505	50.56228521	589.2548674	1067.687053	111.0917023	1240.207832	3048.490815
標準誤差	0.977032477	3.505863691	12.90786223	53.1852804	2.00140865	22.23894984	48.122736
中央値 (メジアン)	294	174	20	1608	210	1641.5	4316
最頻値 (モード)	294	174	10	1200	210	52	4225
	うち EPO	うち DV ₃	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)	I型(292)
標本数	3,642	744	4,328	3,161	1,142	5	22
合計	16,152,000	1,592,831	136,997,563	13,077,275	4,554,042	19,305	77,088
平均	4434.925865	2140.901882	31653.78073	4137.068966	3987.777583	3861	3504
標準偏差	2139.501182	933.2045874	2919.272363	164.1861256	265.0940989	0	949.4010142
標準誤差	35.45214852	34.21294012	44.37424632	2.920278068	7.844531445	0	202.4129763
中央値 (メジアン)	4225	2089	29771	4147	4017	3861	3796
最頻値 (モード)	7618	2418	29627	4147	4017	3861	3796
	特定積層型	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	17	4,328	4,328	1,223	940	1,414	77
合計	205,588	17,933,298	110,072,387	7,052,500	1,453,680	793,997	375,877
平均	12093.41176	4143.553142	25432.62177	5766.557645	1546.468085	561.5254597	4881.519481
標準偏差	2237.148605	522.3625673	547.2709865	1649.555365	119.6830837	2980.361824	5948.338217
標準誤差	542.5882353	7.940144784	8.318763903	47.16867406	3.903631767	79.25821498	677.8760522
中央値 (メジアン)	12636	4147	25480	6500	1560	143	1890
最頻値 (モード)	12636	4147	25480	6500	1560	143	3130
	うち輸血	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	15	1,105	12	9	322	1,886	1,185
合計	34,829	145,628	324,267	103,562	181,015	1,086,222	733,161
平均	2321.933333	131.7900452	27022.25	11506.88889	562.1583851	575.9395546	618.7012658
標準偏差	1665.746785	52.64527253	6810.95404	4727.474179	2399.385681	629.3270226	633.146485
標準誤差	430.0939705	1.583719409	1966.153074	1575.824726	133.7125364	14.49123956	18.39268043
中央値 (メジアン)	2015	143	28546.5	10768	117	331	460
最頻値 (モード)	1500	143	#N/A	#N/A	117	330	550
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	1,049	3,436	3,167	1,114	1,436	1,384	0
合計	334,353	1,257,913	229,071	975,599	621,735	480,483	0
平均	318.7349857	366.0980792	72.33059678	875.7621185	432.9630919	347.1697977	#DIV/0!
標準偏差	301.8189392	902.8223474	103.6060235	1165.997322	468.2527393	171.4541716	#DIV/0!
標準誤差	9.318773249	15.40195049	1.841030459	34.93453426	12.35671718	4.608716685	65535
中央値 (メジアン)	295	111	75	436	345	345	#NUM!
最頻値 (モード)	330	111	16	111	142	142	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	4,328	4,328	4,328	4,328	4,328	4,328	4,328
合計	182,382,246	175,332,746	180,931,566	173,879,066	174,538,749	180,137,569	173,085,069
平均	42140.07532	40511.26294	41804.89048	40175.38494	40327.80707	41621.43461	39991.92907
標準偏差	5010.941515	4538.173588	4930.256862	4407.074506	4127.620794	4590.25585	3999.778801
標準誤差	76.16855346	68.98226941	74.94211063	66.98950469	62.74168321	69.7739431	60.7984277
中央値 (メジアン)	41584	39864	41277.5	39524	39778.5	41203	39457.5
最頻値 (モード)	43288	43288	37424	39737	39104	41310	39104
	除夜障手在						
標本数	4,328						
合計	172,373,370						
平均	39827.48845						
標準偏差	3928.703002						
標準誤差	59.71804375						
中央値 (メジアン)	39279						
最頻値 (モード)	39104						

表3-3 病院・診療所別集計結果表 一病 院 1-

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	3,178	3,124	3,185	3,185	548	84	1
合計	190,562	27,872.60	2,462,515	8,879,822	71,240	6,720	294
平均	59.96286973	8.922087068	773.1601256	2788.013187	130	80	294
標準偏差	12.46887997	7.48214085	65.67197191	160.388876	0	0	#DIV/0!
標準誤差	0.221182365	0.133866025	1.163657944	2.841970237	0	0	0
中央値(メジアン)	60	7.03	759	2690	130	80	294
最頻値(モード)	55	0.08	759	2670	130	80	#N/A
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	422	208	1,484	319	2,122	2,144	2,960
合計	122,892	38,194	398,192	549,371	501,822	3,965,488	14,276,454
平均	291.2132701	183.625	268.3234501	1722.166144	236.4853911	1849.574627	4823.126351
標準偏差	20.07082505	50.56228521	654.576159	1048.793041	109.8999332	1245.60188	3008.501775
標準誤差	0.977032477	3.505863691	16.99195045	58.72113693	2.385748934	26.90090338	55.29736239
中央値(メジアン)	294	174	20	1600	210	1623	4316
最頻値(モード)	294	174	10	1200	210	52	4225
	うちEPO	うちDV ₃	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)	I型(292)
標本数	2,686	527	3,185	2,301	884	1	1
合計	11,830,883	1,126,917	100,845,473	9,517,235	3,529,398	3,861	876
平均	4404.647431	2138.362429	31662.62889	4136.129944	3992.531674	3861	876
標準偏差	2145.646567	905.4004448	2889.595796	166.0898187	231.2290519	#DIV/0!	#DIV/0!
標準誤差	41.40046147	39.43986284	51.20146394	3.462459497	7.777074618	0	0
中央値(メジアン)	4225	2104	29732	4147	4017	3861	876
最頻値(モード)	7618	2418	29627	4147	4017	#N/A	#N/A
	特定積層型	ダイア計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	11	3,185	3,185	899	705	1,066	67
合計	129,772	13,181,142	81,049,217	5,301,000	1,087,560	693,503	331,974
平均	11797.45455	4138.506122	25447.16389	5896.551724	1542.638298	650.565666	4954.835821
標準偏差	2781.140642	482.1227729	507.7545932	1516.200308	136.8242318	3340.166296	6131.600472
標準誤差	838.5454545	8.542852882	8.997029457	50.56811148	5.15309869	102.3032633	749.0942227
中央値(メジアン)	12636	4147	25480	6500	1560	143	1652
最頻値(モード)	12636	4147	25480	6500	1560	143	15800
	うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	12	856	12	6	230	1,421	975
合計	27,973	111,604	324,267	69,078	156,470	831,861	583,110
平均	2331.083333	130.3785047	27022.25	11513	680.3043478	585.4053483	598.0615385
標準偏差	1797.261222	58.4685587	6810.95404	4078.05179	2729.358375	600.8971559	580.8221482
標準誤差	518.8246253	1.998414195	1966.153074	1664.857672	179.9685617	15.94054294	18.60119566
中央値(メジアン)	1983	143	28546.5	10755	117	360	507
最頻値(モード)	1500	143	#N/A	#N/A	117	330	550
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	729	2,431	2,233	878	1,204	1,160	0
合計	237,547	850,948	143,828	687,164	570,518	441,872	0
平均	325.8532236	350.0403126	64.41021048	782.6469248	473.8521595	380.9241379	#DIV/0!
標準偏差	302.6663544	825.0939605	104.6879607	1048.45728	474.8812825	162.60509	#DIV/0!
標準誤差	11.20986498	16.73443018	2.215401157	35.38371936	13.68585104	4.774249832	65535
中央値(メジアン)	295	111	36	434	375	355	#NUM!
最頻値(モード)	330	16	16	111	284	284	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	3,185	3,185	3,185	3,185	3,185	3,185	3,185
合計	133,925,953	128,627,953	132,841,393	127,540,393	127,934,450	132,147,890	126,846,890
平均	42048.96484	40385.54254	41708.44364	40044.07943	40167.8022	41490.7033	39826.33909
標準偏差	4996.141207	4555.889375	4912.825431	4425.894249	4010.05124	4459.331245	3885.822907
標準誤差	88.52786409	80.72693277	87.0515712	78.42351693	71.05509161	79.01599534	68.85385899
中央値(メジアン)	41498	39720	41204	39422	39660	41120	39335
最頻値(モード)	40379	37789	37424	37424	38101	39968	37631
	除夜障手在						
標本数	3,185						
合計	126,297,519						
平均	39653.85212						
標準偏差	3806.705995						
標準誤差	67.45196683						
中央値(メジアン)	39207						
最頻値(モード)	37313						

表 3-4 病院・診療所別集計結果表 一病院 2-

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	1,143	1,132	1,143	1,143	199	1	0
合計	67,661	10,126.54	1,021,576	3,117,970	25,870	80	0
平均	59.1959755	8.945706714	893.7672791	2727.882765	130	80	#DIV/0!
標準偏差	13.1078011	7.325940643	51.78990713	256.4254419	0	#DIV/0!	#DIV/0!
標準誤差	0.387709754	0.217740984	1.531870374	7.584692835	0	0	65535
中央値 (メジアン)	59	7.035	884	2680	130	80	#NUM!
最頻値 (モード)	55	3.06	884	2670	130	#N/A	#N/A
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	0	0	600	84	959	966	1,053
合計	0	0	40,210	162,268	180,615	1,846,521	5,342,831
平均	#DIV/0!	#DIV/0!	67.01666667	1931.761905	188.3368092	1911.512422	5073.91358
標準偏差	#DIV/0!	#DIV/0!	343.1338433	1127.700097	106.4847025	1227.715426	3152.297201
標準誤差	65535	65535	14.00838049	123.042168	3.438570384	39.50109633	97.14332645
中央値 (メジアン)	#NUM!	#NUM!	20	1810	168	1707.5	4329
最頻値 (モード)	#N/A	#N/A	10	1980	84	198	4225
	うち EPO	うち DV ₃	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)	I型(292)
標本数	956	217	1,143	860	258	4	21
合計	4,321,117	465,914	36,152,090	3,560,040	1,024,644	15,444	76,212
平均	4519.996862	2147.069124	31629.12511	4139.581395	3971.488372	3861	3629.142857
標準偏差	2120.942504	999.6686302	3001.569296	159.0481118	357.705357	0	764.6354874
標準誤差	68.59618285	67.86192848	88.78206844	5.423495597	22.2697628	0	166.8571429
中央値 (メジアン)	4225	2046	29796	4147	4017	3861	3796
最頻値 (モード)	4225	2418	29627	4147	4017	3861	3796
	特定積層型	ダイア計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	6	1,143	1,143	324	235	348	10
合計	75,816	4,752,156	29,023,170	1,751,500	366,120	100,494	43,903
平均	12636	4157.616798	25392.09974	5405.864198	1557.957447	288.7758621	4390.3
標準偏差	0	620.9090239	643.2513465	1930.189405	31.31174751	1352.567669	4771.950173
標準誤差	0	18.3655888	19.02644232	107.2327447	2.042553191	72.50523759	1509.023143
中央値 (メジアン)	12636	4147	25480	6500	1560	143	3028
最頻値 (モード)	12636	4147	25480	6500	1560	143	3028
	うち輸血	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	3	249	0	3	92	465	210
合計	6,856	34,024	0	34,484	24,545	254,361	150,051
平均	2285.333333	136.6425703	#DIV/0!	11494.66667	266.7934783	547.0129032	714.5285714
標準偏差	1286.3364	22.83489025	#DIV/0!	6915.160615	1199.198758	709.1043646	829.2166948
標準誤差	742.6666667	1.447102371	65535	3992.469843	125.0251131	32.8839275	57.22138823
中央値 (メジアン)	3028	143	#NUM!	15052	108	295	360
最頻値 (モード)	3028	143	#N/A	#N/A	117	260	140
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	320	1,005	934	236	232	224	0
合計	96,806	406,965	85,243	288,435	51,217	38,611	0
平均	302.51875	404.9402985	91.26659529	1222.182203	220.762931	172.3705357	#DIV/0!
標準偏差	299.7192515	1067.161653	98.47582615	1477.766067	365.6701845	90.9600081	#DIV/0!
標準誤差	16.75481552	33.66256309	3.222227463	96.19437749	24.00742376	6.077521183	65535
中央値 (メジアン)	260	95	95	562	142	142	#NUM!
最頻値 (モード)	260	111	111	48	142	142	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143
合計	48,456,293	46,704,793	48,090,173	46,338,673	46,604,299	47,989,679	46,238,179
平均	42393.95713	40861.58618	42073.64217	40541.27122	40773.66492	41985.72091	40453.34996
標準偏差	5045.472878	4471.795322	4970.800935	4335.177267	4410.135163	4920.546869	4269.435429
標準誤差	149.2377734	132.2692229	147.0290856	128.2282589	130.4454048	145.5426431	126.2837106
中央値 (メジアン)	41814	40183	41491	39927	40147	41407	39818
最頻値 (モード)	35644	36506	37826	37826	35644	35644	35644
	除夜障手在						
標本数	1,143						
合計	46,075,851						
平均	40311.33071						
標準偏差	4214.373114						
標準誤差	124.6550472						
中央値 (メジアン)	39695						
最頻値 (モード)	35644						

表3-5 病院・診療所別集計結果表 —診療所—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	4,305	4,247	4,305	4,305	978	230	1,288
合計	254,062	38,224.54	4,131,735	12,453,065	127,270	33,915	564,975
平均	59.0155633	9.000362609	959.7526132	2892.698026	130.1329243	147.4565217	438.6451863
標準偏差	12.33402784	7.304783159	38.45954983	239.1620757	4.156941616	72.48210335	49.27257055
標準誤差	0.187982901	0.112089827	0.586161944	3.645068852	0.132924335	4.779328362	1.372926502
中央値(メジアン)	59	7.05	954	2800	130	80	450
最頻値(モード)	54	2.08	954	2670	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	0	53	1,985	326	2,897	2,911	3,899
合計	0	3,150	570,330	558,615	676,938	5,041,182	17,073,923
平均	#DIV/0!	59.43396226	287.3198992	1713.542945	233.6686227	1731.769839	4379.051808
標準偏差	#DIV/0!	121.8986826	670.6196325	763.674846	125.3273061	1219.163601	2777.4111752
標準誤差	65535	16.74407179	15.05206232	42.29603784	2.328474344	22.59648489	44.47988454
中央値(メジアン)	#NUM!	10	30	1668	210	1506	4225
最頻値(モード)	#N/A	10	10	1120	210	30	4225
	うちEPO	うちDV ₃	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)	I型(292)
標本数	3,464	693	4,305	3,427	816	19	13
合計	14,112,774	1,447,643	137,487,366	14,186,438	3,254,388	71,874	46,136
平均	4074.126443	2088.950938	31936.67038	4139.608404	3988.220588	3782.842105	3548.923077
標準偏差	1970.985777	881.4710136	3022.5577	197.5073642	262.6687487	340.6823648	890.8485151
標準誤差	33.48841159	33.48431495	46.06679757	3.373853659	9.195245436	78.15789474	247.0769231
中央値(メジアン)	4101	1960	29985	4147	4017	3861	3796
最頻値(モード)	4225	2418	29627	4147	4017	3861	3796
	特定積層型	ダイア計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	46	4,305	4,305	1,387	853	1,188	34
合計	571,536	18,166,525	109,545,726	8,103,000	1,301,280	464,240	150,988
平均	12424.69565	4219.866434	25446.16167	5842.105263	1525.533411	390.7744108	4440.823529
標準偏差	1433.135814	1031.983372	401.4958715	1537.159036	191.7141673	2702.405835	6223.902072
標準誤差	211.3043478	15.72845709	6.119198	41.27438129	6.564168066	78.40474554	1067.390399
中央値(メジアン)	12636	4147	25480	6500	1560	143	1136
最頻値(モード)	12636	4147	25480	6500	1560	143	470
	うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	8	871	4	3	323	1,355	684
合計	18,089	114,957	115,619	59,385	154,651	612,388	341,674
平均	2261.125	131.9827784	28904.75	19795	478.7956656	451.9468635	499.5233918
標準偏差	976.3164647	27.52642913	8511.198755	15574.60202	3249.922217	446.1526739	477.2557851
標準誤差	345.1799964	0.93269747	4255.599378	8992.000667	180.8305094	12.12031348	18.24833103
中央値(メジアン)	2155.5	143	26682.5	10809	117	330	350
最頻値(モード)	#N/A	143	#N/A	#N/A	117	330	550
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	901	3,428	3,353	339	1,536	1,531	0
合計	267,526	310,899	93,930	213,911	558,532	555,767	0
平均	296.9211987	90.69399067	28.01371906	631.0058997	363.6276042	363.0091444	#DIV/0!
標準偏差	247.065631	420.1133005	28.65107432	1177.642447	174.3488752	172.4080391	#DIV/0!
標準誤差	8.230949552	7.175398486	0.49479367	63.96075801	4.448601891	4.406257941	65535
中央値(メジアン)	260	16	16	190	345	345	#NUM!
最頻値(モード)	330	16	16	95	276	276	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305
合計	178,691,945	170,588,857	177,390,577	169,287,577	170,124,617	176,926,337	168,823,337
平均	41508.00116	39625.75075	41205.70894	39323.47898	39517.91336	41097.87154	39215.64158
標準偏差	4659.731301	4074.873174	4591.267908	3944.759918	3754.789201	4350.840152	3626.62799
標準誤差	71.01895806	62.10513619	69.97550758	60.12208023	57.22673681	66.3111485	55.27343199
中央値(メジアン)	41065	39033	40666	38817	38994	40605	38749
最頻値(モード)	41608	37322	41608	37322	34397	39143	34397
	除夜障手在						
標本数	4,305						
合計	168,264,722						
平均	39085.882						
標準偏差	3576.284705						
標準誤差	54.50615004						
中央値(メジアン)	38613						
最頻値(モード)	34397						

表 4-1 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計-40歳未満-透析歴10年未満-

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	404	404	404	404	94	16	68
合計	13,216	1,796.60	358,673	1,141,323	12,220	2,150	29,925
平均	32.71287129	4.447029703	887.8044554	2825.056931	130	134.375	440.0735294
標準偏差	5.079685877	2.77348203	93.92206198	200.5295452	0	72.5	46.54874389
標準誤差	0.252723818	0.137985888	4.672797233	9.976717759	0	18.125	5.644864347
中央値(メジアン)	34	4.06	954	2690	130	80	450
最頻値(モード)	39	2.06	954	2670	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	16	11	178	14	276	279	365
合計	4,704	1,914	41,900	34,862	56,870	478,631	1,539,026
平均	294	174	235.3932584	2490.142857	206.0507246	1715.523297	4216.509589
標準偏差	0	0	666.8952538	1777.905287	108.9154349	1245.098028	2270.456257
標準誤差	0	0	49.98591259	475.1651747	6.555938773	74.54206912	118.841112
中央値(メジアン)	294	174	10	2131	198	1480	4186
最頻値(モード)	294	174	10	#N/A	210	2090	4225
	うちEPO	うちV・D ₃	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)	I型(292)
標本数	340	75	404	352	48	0	2
合計	1,327,496	164,682	13,489,366	1,459,106	189,726	0	7,592
平均	3904.4	2195.76	33389.5198	4145.1875	3952.625	#DIV/0!	3796
標準偏差	1915.497917	1064.204472	3222.860002	53.81337449	446.0030829	#DIV/0!	0
標準誤差	103.88246	122.8837477	160.343278	2.868262497	64.375	65535	0
中央値(メジアン)	3985	2176	35127	4147	4017	#NUM!	3796
最頻値(モード)	4225	2418	36127	4147	4017	#N/A	3796
	特定積層型	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	3	404	404	241	43	126	3
合計	37,908	1,694,332	10,288,000	1,404,500	66,000	55,593	17,732
平均	12636	4193.891089	25465.34653	5827.80083	1534.883721	441.2142857	5910.666667
標準偏差	0	732.8594211	241.2747962	1502.225758	164.698456	3159.121067	8613.259623
標準誤差	0	36.46111896	12.00386976	96.76686761	25.11627907	281.4368732	4972.867762
中央値(メジアン)	12636	4147	25480	6500	1560	143	1882
最頻値(モード)	12636	4147	25480	6500	1560	143	#N/A
	うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	1	106	1	0	21	140	74
合計	1,500	13,784	35,248	0	5,033	71,880	44,382
平均	1500	130.0377358	35248	#DIV/0!	239.6666667	513.4285714	599.7567568
標準偏差	#DIV/0!	29.12008782	#DIV/0!	#DIV/0!	606.2479966	482.3257973	506.8379226
標準誤差	0	2.828392961	0	65535	132.2941588	40.76396997	58.91871172
中央値(メジアン)	1500	143	35248	#NUM!	117	330	550
最頻値(モード)	#N/A	143	#N/A	#N/A	117	330	550
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	92	323	303	55	140	138	0
合計	26,908	77,321	15,676	58,061	48,373	44,753	0
平均	292.4782609	239.3839009	51.7359736	1055.654545	345.5214286	324.2971014	#DIV/0!
標準偏差	196.5993571	818.8659792	70.93796557	1457.080811	233.6155751	151.9300843	#DIV/0!
標準誤差	20.49689988	45.56292189	4.075279642	196.4727365	19.74411973	12.93314764	65535
中央値(メジアン)	290.5	19	16	369	306	306	#NUM!
最頻値(モード)	330	16	16	297	138	138	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	404	404	404	404	404	404	404
合計	17,295,048	15,890,458	17,228,958	15,824,458	15,834,865	17,173,365	15,768,865
平均	42809.52475	39332.81683	42645.93564	39169.4505	39195.2104	42508.32921	39031.84406
標準偏差	4583.48052	4011.524545	4534.053688	3894.089145	3489.53423	4165.976441	3355.508532
標準誤差	228.0366789	199.5808056	225.5776021	193.7381761	173.6108167	207.2650746	166.9427891
中央値(メジアン)	43063.5	38669	42927	38591.5	38625.5	42849.5	38535.5
最頻値(モード)	44910	38410	44910	38410	38410	46306	38410
	除夜障手在						
標本数	404						
合計	15,734,003						
平均	38945.55198						
標準偏差	3295.621502						
標準誤差	163.9632979						
中央値(メジアン)	38491						
最頻値(モード)	38410						

表4-2 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計-40~64歳-透析歴10年未満一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	2,793	2,793	2,793	2,793	554	97	445
合計	152,299	12,132.65	2,475,013	7,888,083	72,020	12,400	195,144
平均	54.52882206	4.343949159	886.1485858	2824.233083	130	127.8350515	438.5258427
標準偏差	6.205642877	2.676970202	101.6116852	247.2930506	0	68.52959829	49.30825436
標準誤差	0.117422497	0.050653338	1.922685214	4.679252103	0	6.958126482	2.337435427
中央値(メジアン)	55	4.08	954	2700	130	80	450
最頻値(モード)	54	2.08	954	2670	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	111	73	1,289	360	1,944	1,954	2,581
合計	32,193	9,866	241,780	616,795	438,881	3,552,779	11,534,679
平均	290.027027	135.1506849	187.5717611	1713.319444	225.7618313	1818.208291	4469.073615
標準偏差	23.9459465	73.35296541	572.3767461	539.2110513	118.8874501	1203.583507	2706.758408
標準誤差	2.272848659	8.585315222	15.94246685	28.41891769	2.696422126	27.22788754	53.27892975
中央値(メジアン)	294	174	20	1684	210	1595.5	4225
最頻値(モード)	294	174	10	1120	210	30	4225
	うちEPO	うちV・D ₃	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)	I型(292)
標本数	2,377	342	2,793	2,271	517	7	5
合計	10,015,469	706,339	89,544,904	9,386,256	2,054,541	27,027	15,768
平均	4213.491376	2065.318713	32060.47404	4133.093791	3973.967118	3861	3153.6
標準偏差	2072.75779	865.3094649	3025.074564	200.2685059	316.0964504	0	1436.450069
標準誤差	42.51419548	46.79057704	57.2401306	4.20246486	13.90190599	0	642.4
中央値(メジアン)	4225	1960	30179	4147	4017	3861	3796
最頻値(モード)	4225	2418	29627	4147	4017	3861	3796
	特定積層型	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	8	2,793	2,793	1,018	492	975	24
合計	91,864	11,575,456	71,043,276	5,893,500	746,520	410,862	161,837
平均	11483	4144.45256	25436.18904	5789.292731	1517.317073	421.3969231	6743.208333
標準偏差	3261.176475	431.1752838	458.6291381	1607.673735	217.7521645	2587.733483	6332.526579
標準誤差	1153	8.158651642	8.678130476	50.38764114	9.817025733	82.87379704	1292.621575
中央値(メジアン)	12636	4147	25480	6500	1560	143	3130
最頻値(モード)	12636	4147	25480	6500	1560	143	15800
	うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	7	753	6	4	218	939	586
合計	15,348	99,433	153,598	74,376	63,886	492,716	325,044
平均	2192.571429	132.0491368	25599.66667	18594	293.0550459	524.7241747	554.6825939
標準偏差	763.8928496	28.92316449	5577.706327	12948.15789	1528.585553	591.0322035	585.6282666
標準誤差	288.7243583	1.054018708	2277.089073	6474.078943	103.5288772	19.28760702	24.19208071
中央値(メジアン)	2081	143	28542.5	12930.5	117	330	363
最頻値(モード)	3028	143	#N/A	#N/A	117	330	550
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	515	2,271	2,170	460	947	934	0
合計	154,974	514,390	105,349	381,496	356,279	321,450	0
平均	300.9203883	226.5037428	48.54792627	829.3391304	376.218585	344.1648822	#DIV/0!
標準偏差	252.1170662	735.6635956	55.06720617	1185.739554	314.7622643	176.6199152	#DIV/0!
標準誤差	11.10960531	15.43727705	1.182124385	55.28539177	10.22839924	5.779180165	65535
中央値(メジアン)	260	36	16	345.5	314	314	#NUM!
最頻値(モード)	330	16	16	111	276	276	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	2,793	2,793	2,793	2,793	2,793	2,793	2,793
合計	117,386,500	111,493,000	116,639,980	110,746,480	111,082,138	116,229,118	110,335,618
平均	42028.82206	39918.72538	41761.53956	39651.44289	39771.6212	41614.43537	39504.3387
標準偏差	4779.808541	4104.735822	4715.838893	3972.988765	3720.621341	4422.106301	3588.658233
標準誤差	90.44301534	77.66936305	89.23258864	75.17645962	70.40119078	83.6746126	67.90419926
中央値(メジアン)	41568	39334	41304	39109	39288	41216	39025
最頻値(モード)	38276	37235	37424	37235	38737	35644	37235
	除夜障手在						
標本数	2,793						
合計	109,718,823						
平均	39283.50269						
標準偏差	3524.948449						
標準誤差	66.69868968						
中央値(メジアン)	38765						
最頻値(モード)	37235						

表 4-3 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計-65~69歳-透析歴10年未満-

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	739	739	739	739	143	21	121
合計	49,542	3,120.09	652,227	2,099,297	18,590	3,130	53,100
平均	67.03924222	4.222043302	882.5805142	2840.726658	130	149.047619	438.8429752
標準偏差	1.420838895	2.659063606	100.9193778	206.3151311	0	74.20611578	49.04827694
標準誤差	0.052266404	0.097815236	3.712379322	7.58942478	0	16.19310203	4.458934268
中央値(メジアン)	67	4.06	954	2745	130	80	450
最頻値(モード)	67	2.08	954	2670	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	33	25	353	122	501	505	682
合計	9,702	4,298	93,187	201,439	124,597	1,030,634	3,243,655
平均	294	171.92	263.9858357	1651.139344	248.6966068	2040.859406	4756.092375
標準偏差	0	30.90431469	637.4523399	844.0568145	121.4641501	1267.838046	2774.727572
標準誤差	0	6.180862939	33.92816464	76.4173134	5.426618023	56.41805258	106.2498101
中央値(メジアン)	294	174	20	1548	214	1821	4316
最頻値(モード)	294	174	10	820	210	2116	4225
	うちEPO	うちV・D ₃	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)	I型(292)
標本数	642	54	739	540	192	2	4
合計	2,833,464	108,184	22,657,870	2,237,147	768,792	7,722	8,760
平均	4413.495327	2003.407407	30660.17591	4142.864815	4004.125	3861	2190
標準偏差	2028.018811	841.6244293	2089.348294	125.1116691	113.2730334	0	1869.712277
標準誤差	80.03951805	114.5305782	76.85791941	5.383949009	8.174777044	0	934.8561387
中央値(メジアン)	4225	1945	29627	4147	4017	3861	2336
最頻値(モード)	4225	2418	29627	4147	4017	3861	3796
	特定積層型	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	4	739	739	85	174	264	15
合計	50,544	3,109,118	18,783,100	480,000	265,200	166,563	97,451
平均	12636	4207.196211	25416.91475	5647.058824	1524.137931	630.9204545	6496.733333
標準偏差	0	1466.46542	536.30494	1627.193628	191.039455	3350.260655	8082.808674
標準誤差	0	53.94480248	19.72829613	176.4939294	14.4826637	206.1942896	2086.972226
中央値(メジアン)	12636	4147	25480	6500	1560	143	1510
最頻値(モード)	12636	4147	25480	6500	1560	143	15800
	うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	3	206	2	1	61	240	152
合計	13,866	27,480	56,790	10,768	57,566	117,128	82,541
平均	4622	133.3980583	28395	10768	943.704918	488.0333333	543.0328947
標準偏差	2427.919068	24.62690965	216.374675	#DIV/0!	4434.771987	547.5765388	547.392185
標準誤差	1401.759727	1.7158381	153	0	567.8143685	35.34591359	44.39936908
中央値(メジアン)	4403	143	28395	10768	117	330	361.5
最頻値(モード)	#N/A	143	#N/A	#N/A	117	550	140
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	113	609	577	141	265	260	0
合計	32,132	129,265	27,142	103,065	107,498	92,032	0
平均	284.3539823	212.2577997	47.03986135	730.9574468	405.6528302	353.9692308	#DIV/0!
標準偏差	286.151587	691.5650021	57.85491437	1271.416336	418.0112188	182.3129364	#DIV/0!
標準誤差	26.91887694	28.02362808	2.408531599	107.0725709	25.67822505	11.30656834	65535
中央値(メジアン)	255	36	16	298	345	344.5	#NUM!
最頻値(モード)	330	16	16	111	280	142	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	739	739	739	739	739	739	739
合計	30,405,576	29,925,576	30,140,376	29,660,376	29,759,013	29,973,813	29,493,813
平均	41144.21651	40494.69012	40785.35318	40135.82679	40269.30041	40559.96346	39910.43708
標準偏差	4777.772802	4508.50424	4659.489934	4357.848892	3980.616453	4189.715143	3817.827501
標準誤差	175.7532136	165.8480094	171.4021079	160.3060628	146.4293432	154.1211629	140.4410549
中央値(メジアン)	40258	39767	39888	39478	39660	39778	39387
最頻値(モード)	40130	36395	36395	36395	45707	45707	45707
	除夜障手在						
標本数	739						
合計	29,292,374						
平均	39637.85386						
標準偏差	3671.808874						
標準誤差	135.0696728						
中央値(メジアン)	39089						
最頻値(モード)	39850						

表4-4 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計-70歳以上-透析歴10年未満一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	1,391	1,391	1,391	1,391	254	49	213
合計	106,135	5,302.27	1,219,498	3,953,905	33,020	6,530	94,050
平均	76.30122214	3.811840403	876.7059669	2842.491014	130	133.2653061	441.5492958
標準偏差	4.896246391	2.58628573	99.2861816	211.5213574	0	70.62629807	42.87920354
標準誤差	0.131280342	0.069344646	2.662105384	5.671404975	0	10.08947115	2.938034615
中央値(メジアン)	75	3.11	884	2720	130	80	450
最頻値(モード)	71	0.08	954	2670	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	90	40	679	138	959	962	1,326
合計	26,166	7,864	152,765	249,567	215,794	1,802,337	6,666,099
平均	290.7333333	196.6	224.9852725	1808.456522	225.0198123	1873.531185	5027.223982
標準偏差	21.79000905	111.8141315	564.2613359	1368.395742	118.9376015	1167.777215	2932.24452
標準誤差	2.296868628	17.6793665	21.65436264	116.4855812	3.840695466	37.65064854	80.52457129
中央値(メジアン)	294	174	20	1642	210	1682	4330.5
最頻値(モード)	294	174	10	300	168	2778	4225
	うちEPO	うちV・D ₃	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)	I型(292)
標本数	1,260	117	1,391	756	619	5	14
合計	5,728,011	220,271	41,933,782	3,112,542	2,466,438	17,820	53,144
平均	4546.040476	1882.65812	30146.50036	4117.119048	3984.552504	3564	3796
標準偏差	2060.362314	803.7233201	1433.696118	263.1306912	266.6401252	664.1121893	0
標準誤差	58.04413254	74.30424722	38.44089975	9.569970714	10.71717149	297	0
中央値(メジアン)	4225	1859	29627	4147	4017	3861	3796
最頻値(モード)	7618	2418	29627	4147	4017	3861	3796
	特定積層型	ダイア計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	9	1,391	1,391	44	272	534	25
合計	104,004	5,753,948	35,388,640	238,500	416,400	315,601	116,460
平均	11556	4136.554996	25441.15025	5420.454545	1530.882353	591.0131086	4658.4
標準偏差	3240	653.3649677	429.6354148	2201.857519	171.8811509	3506.562394	5778.075372
標準誤差	1080	17.51831292	11.51957636	331.9425105	10.42182559	151.7437954	1155.615074
中央値(メジアン)	12636	4147	25480	6500	1560	143	1510
最頻値(モード)	12636	4147	25480	6500	1560	143	470
	うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	3	397	4	4	141	478	298
合計	3,979	54,635	130,170	47,586	78,898	264,241	183,447
平均	1326.333333	137.6196474	32542.5	11896.5	559.5602837	552.8054393	615.5939597
標準偏差	1121.495579	74.97628525	7962.912219	6250.122212	3306.526186	573.5240558	583.488285
標準誤差	647.4957743	3.76295189	3981.456109	3125.061106	278.459738	26.23237972	33.80056881
中央値(メジアン)	876	143	33958	13352	117	337	550
最頻値(モード)	#N/A	143	#N/A	#N/A	117	550	550
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	234	1,156	1,092	280	480	468	0
合計	77,380	266,058	57,057	194,569	178,020	153,454	0
平均	330.6837607	230.1539792	52.25	694.8892857	370.875	327.8931624	#DIV/0!
標準偏差	343.8765411	751.5392266	88.6110811	1114.735212	357.4438318	151.2933864	#DIV/0!
標準誤差	22.47991274	22.1040949	2.681493299	66.61817088	16.31500414	6.993539261	65535
中央値(メジアン)	260	36	16	297	317.5	314	#NUM!
最頻値(モード)	330	16	16	95	385	385	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	1,391	1,391	1,391	1,391	1,391	1,391	1,391
合計	56,849,108	56,610,608	56,432,708	56,194,208	56,295,007	56,117,107	55,878,607
平均	40869.23652	40697.77714	40569.88354	40398.42416	40470.88929	40342.99569	40171.5363
標準偏差	4735.788138	4622.138148	4614.015404	4492.228814	3942.568718	3976.982294	3826.903574
標準誤差	126.9780638	123.9308295	123.7130389	120.4476425	105.7099109	106.632623	102.6086454
中央値(メジアン)	40124	39995	39763	39685	39887	39709	39620
最頻値(モード)	38785	38785	38785	38785	39104	39104	39104
	除夜障手在						
標本数	1,391						
合計	55,628,980						
平均	39992.07764						
標準偏差	3731.67901						
標準誤差	100.055442						
中央値(メジアン)	39420						
最頻値(モード)	39104						

表 4-5 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計-75歳以上-透析歴10年未満一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	775	775	775	775	140	26	111
合計	61,811	2,854.45	674,804	2,206,191	18,200	3,385	49,275
平均	79.75612903	3.68316129	870.7148387	2846.698065	130	130.1923077	443.9189189
標準偏差	3.809567106	2.538321679	99.59767893	217.0652129	0	70.34885599	36.65195893
標準誤差	0.13684369	0.091179206	3.577654241	7.797212624	0	13.79654575	3.478849988
中央値 (メジアン)	79	3.09	884	2720	130	80	450
最頻値 (モード)	75	0.08	954	2670	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	64	18	377	72	527	528	742
合計	18,669	4,032	91,425	124,905	116,568	938,654	3,770,555
平均	291.703125	224	242.5066313	1734.791667	221.1916509	1777.753788	5081.610512
標準偏差	18.375	143.3055149	581.2732636	1501.036749	121.197931	1100.461197	2965.698043
標準誤差	2.296875	33.77743378	29.93709617	176.8988774	5.279464798	47.89142641	108.8742003
中央値 (メジアン)	294	174	30	1488.5	210	1573.5	4360
最頻値 (モード)	294	174	10	300	84	52	7618
	うち EPO	うち V・D ₃	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)	I型(292)
標本数	706	65	775	377	387	4	10
合計	3,249,140	119,757	23,326,949	1,547,658	1,539,129	13,959	37,960
平均	4602.181303	1842.415385	30099.28903	4105.193634	3977.077519	3489.75	3796
標準偏差	2054.029852	926.864167	1302.844506	289.0405297	305.5950692	742.5	0
標準誤差	77.30443326	114.963351	46.79955621	14.88634464	15.53427038	371.25	0
中央値 (メジアン)	4225	1764	29627	4147	4017	3861	3796
最頻値 (モード)	7618	2418	29627	4147	4017	3861	3796
	特定積層型	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	6	775	775	13	160	302	14
合計	66,096	3,204,802	19,712,200	83,000	245,040	140,621	52,634
平均	11016	4135.228387	25435.09677	6384.615385	1531.5	465.6324503	3759.571429
標準偏差	3968.173383	693.4874517	461.1072055	299.5723448	165.1003126	2721.878178	4749.293271
標準誤差	1620	24.91080464	16.56345978	83.08641921	13.05232575	156.6264889	1269.302018
中央値 (メジアン)	12636	4017	25480	6500	1560	143	1415
最頻値 (モード)	12636	4017	25480	6500	1560	143	470
	うち輸血	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	2	217	2	3	85	264	163
合計	3,103	28,763	59,171	30,229	19,255	145,226	99,547
平均	1551.5	132.5483871	29585.5	10076.33333	226.5294118	550.0984848	610.7177914
標準偏差	1487.045561	31.49527757	10581.85298	6222.379073	458.5940104	551.2290914	544.9523539
標準誤差	1051.5	2.138038755	7482.5	3592.492233	49.74150432	33.92580536	42.68396259
中央値 (メジアン)	1551.5	143	29585.5	10797	117	331.5	550
最頻値 (モード)	#N/A	143	#N/A	#N/A	117	550	550
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	136	652	612	155	277	269	0
合計	43,634	147,466	30,719	115,946	100,594	88,254	0
平均	320.8382353	226.1748466	50.19444444	748.0387097	363.1552347	328.0817844	#DIV/0!
標準偏差	358.2547039	785.3527802	83.5216081	1357.274699	281.4560764	148.2651442	#DIV/0!
標準誤差	30.72008742	30.7567886	3.376160904	109.0189273	16.91105666	9.039885388	65535
中央値 (メジアン)	260	36	16	313	345	340	#NUM!
最頻値 (モード)	330	16	16	95	385	385	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	775	775	775	775	775	775	775
合計	31,575,965	31,492,965	31,330,925	31,247,925	31,352,344	31,190,304	31,107,304
平均	40743.18065	40636.08387	40427	40319.90323	40454.63742	40245.55355	40138.45677
標準偏差	4297.213276	4212.2044	4196.017295	4106.794536	3849.368492	3849.842487	3748.624059
標準誤差	154.3604576	151.3068487	150.7253907	147.5204146	138.2733981	138.2904245	134.6545513
中央値 (メジアン)	40136	40054	39737	39721	40027	39709	39654
最頻値 (モード)	39140	39140	39365	39365	43189	41468	41468
	除夜障手在						
標本数	775						
合計	30,982,339						
平均	39977.21161						
標準偏差	3664.007417						
標準誤差	131.6150318						
中央値 (メジアン)	39539						
最頻値 (モード)	39697						

表4-6-1 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計-透析歴10年未満-TTEST=P値-

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)	
40歳未満								
40～64歳	P値	0	0.471522339	0.757339178	0.948986187	#DIV/0!	0.726359567	0.808253247
40歳未満								
65～69歳	P値	0	0.178337701	0.391570137	0.215355339	#DIV/0!	0.551225711	0.866322746
40歳未満								
70歳以上	P値	0	2.01957E-05	0.045471918	0.140321752	#DIV/0!	0.95692982	0.808986662
40歳未満								
75歳以上	P値	0	2.29592E-06	0.004437655	0.0957667	#DIV/0!	0.854180142	0.540138766
40～64歳								
65～69歳	P値	0	0.270368117	0.395343891	0.095777676	#DIV/0!	0.207560267	0.949946585
40～64歳								
70歳以上	P値	0	9.88994E-10	0.004348466	0.018449509	#DIV/0!	0.655182471	0.443500964
40～64歳								
75歳以上	P値	0	8.73773E-10	0.000174603	0.021766013	#DIV/0!	0.877159147	0.280610064
65～69歳								
70歳以上	P値	0	0.000570791	0.196357964	0.853397263	#DIV/0!	0.401648906	0.599319813
65～69歳								
75歳以上	P値	0	5.74917E-05	0.021460117	0.58368325	#DIV/0!	0.377411166	0.376229381
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射	
40歳未満								
40～64歳	P値	0.509575376	0.084289081	0.306472551	6.94615E-06	0.009286928	0.184554235	0.089233307
40歳未満								
65～69歳	P値	#DIV/0!	0.826099228	0.631147662	0.002753826	1.45226E-06	0.000565407	0.001477436
40歳未満								
70歳以上	P値	0.551600895	0.508879932	0.833273369	0.086524231	0.01755641	0.050219071	1.08539E-06
40歳未満								
75歳以上	P値	0.620156567	0.260656759	0.898013797	0.098346872	0.082277872	0.465874375	1.0501E-06
40～64歳								
65～69歳	P値	0.343344152	0.017088802	0.030363674	0.346681234	0.000129746	0.000252787	0.014342658
40～64歳								
70歳以上	P値	0.828872097	0.000630738	0.166146918	0.265839815	0.874354426	0.238700309	3.27397E-09
40～64歳								
75歳以上	P値	0.629253187	0.000358693	0.102572921	0.832107883	0.435770252	0.485526967	1.13638E-07
65～69歳								
70歳以上	P値	0.392063408	0.286314278	0.314222394	0.27307884	0.000348278	0.011481687	0.045844458
65～69歳								
75歳以上	P値	0.475596049	0.084393824	0.634115282	0.619680807	0.000293894	0.000378461	0.033030561
	うちEPO	うちV・D ₃	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)	I型(292)	
40歳未満								
40～64歳	P値	0.009492732	0.258416939	3.90646E-16	0.260050382	0.667335926	#DIV/0!	0.576131726
40歳未満								
65～69歳	P値	0.000144997	0.272289601	8.42267E-60	0.742243611	0.153097839	#DIV/0!	0.315961542
40歳未満								
70歳以上	P値	2.62544E-07	0.021639245	1.5306E-151	0.047763311	0.451848831	#DIV/0!	#DIV/0!
40歳未満								
75歳以上	P値	1.75928E-07	0.039455006	1.3272E-109	0.010824933	0.621911123	#DIV/0!	#DIV/0!
40～64歳								
65～69歳	P値	0.029385497	0.624129186	7.89416E-32	0.278245583	0.197096087	#DIV/0!	0.409119148
40～64歳								
70歳以上	P値	4.09524E-06	0.045423468	7.3864E-105	0.080588244	0.540499411	0.254981145	0.094722567
40～64歳								
75歳以上	P値	1.20361E-05	0.06055264	1.49771E-66	0.019774778	0.881996157	0.200394198	0.164823445
65～69歳								
70歳以上	P値	0.18245836	0.369565121	3.10802E-11	0.03508743	0.322731611	0.576131726	0.002970625
65～69歳								
75歳以上	P値	0.090376124	0.327524752	3.92611E-10	0.007283612	0.236030178	0.541469739	0.013232583
	特定積層型	ダイア計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	
40歳未満								
40～64歳	P値	0.568321759	0.052979918	0.210334915	0.73504871	0.606014392	0.937262517	0.83711244
40歳未満								
65～69歳	P値	#DIV/0!	0.864225041	0.085321592	0.351505792	0.735017786	0.594655081	0.910901221
40歳未満								
70歳以上	P値	0.588449338	0.13133477	0.27881474	0.128072034	0.886666309	0.660616514	0.737242439
40歳未満								
75歳以上	P値	0.516489552	0.176716196	0.217694203	0.183864565	0.905097454	0.935810303	0.542547725
40～64歳								
65～69歳	P値	0.505851829	0.049651353	0.327634577	0.433864614	0.714260158	0.275386534	0.915936158
40～64歳								
70歳以上	P値	0.963739239	0.640805996	0.736472297	0.143440588	0.375888494	0.284978316	0.234353675
40～64歳								
75歳以上	P値	0.812845618	0.649537652	0.953281035	0.182425402	0.449876546	0.797702193	0.13554344
65～69歳								
70歳以上	P値	0.528757116	0.125403479	0.256804118	0.50890474	0.699043626	0.878048658	0.407474145
65～69歳								
75歳以上	P値	0.446813334	0.219029917	0.478831453	0.107826657	0.707663817	0.517773465	0.28051214

表 4-6-2 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計-透析歴 10 年未満-TTEST=P 値-

		うち輸血	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	#DIV/0!	0.50316736	#DIV/0!	#DIV/0!	0.874115762	0.829299912	0.527118412
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	#DIV/0!	0.284761511	#DIV/0!	#DIV/0!	0.4722204	0.649181293	0.454841761
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.308138449	#DIV/0!	#DIV/0!	0.65972588	0.460014328	0.830486277
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.49115613	#DIV/0!	#DIV/0!	0.912685403	0.507230658	0.88357434
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.034361235	0.541059517	0.526433544	#DIV/0!	0.069812245	0.383989709	0.824818892
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.18578727	0.07197859	0.140473082	0.387469791	0.302677882	0.393222654	0.14364225
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.405485555	0.826283299	0.492291367	0.348064386	0.693835988	0.531915991	0.273169084
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.099714534	0.43208399	0.525662181	#DIV/0!	0.496735164	0.147745461	0.203445076
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.217343599	0.75823642	0.888224447	#DIV/0!	0.140540965	0.205949975	0.272549022
		うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.760499545	0.771729225	0.363908738	0.193076472	0.267481343	0.209926322	#DIV/0!
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.817226068	0.593541373	0.291120304	0.125041301	0.11572145	0.103035689	#DIV/0!
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.316807957	0.848336981	0.925889649	0.038462654	0.429146029	0.806429529	#DIV/0!
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.489788485	0.807515035	0.782792704	0.158189967	0.523594636	0.809097579	#DIV/0!
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.537566023	0.667468296	0.563034543	0.397199317	0.213073578	0.431975394	#DIV/0!
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.184048241	0.891566094	0.143294293	0.126467261	0.772437543	0.088572771	#DIV/0!
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.456941312	0.992094342	0.564582523	0.477311119	0.534184765	0.173579555	#DIV/0!
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.215966577	0.625137833	0.202176869	0.765335859	0.232216186	0.03901784	#DIV/0!
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.382367778	0.739165759	0.451712137	0.911344777	0.163961213	0.073304726	#DIV/0!
		請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.002058324	0.00719827	0.000405583	0.022386966	0.003382277	0.000133351	0.012703129
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	1.40541E-08	1.64216E-05	1.08814E-10	0.000209942	5.91135E-06	1.02154E-13	0.000111151
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	4.26131E-13	8.59604E-08	2.3517E-15	6.90551E-07	5.18683E-09	4.90195E-21	7.07582E-08
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	3.9324E-14	3.4873E-07	1.48499E-16	3.76424E-06	4.59801E-08	6.08729E-20	7.18856E-07
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	7.90798E-06	0.000905701	5.52116E-07	0.003917755	0.001456357	6.14687E-09	0.006995599
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	1.46216E-13	3.17689E-08	1.09937E-14	4.47393E-08	2.11021E-08	2.07432E-19	3.20281E-08
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	1.52794E-11	1.91849E-05	1.18083E-12	3.98239E-05	7.43689E-06	6.23422E-15	1.67806E-05
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.203636307	0.330429162	0.306712783	0.194598625	0.263049327	0.239605403	0.13374497
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.085862204	0.528240472	0.115713745	0.397605144	0.357203906	0.128359917	0.241198604
		除夜障手在						
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.069518481						
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.00163265						
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	3.96485E-07						
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	2.32669E-06						
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.016055982						
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	2.06196E-09						
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	1.60725E-06						
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.036119293						
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.072133438						

表4-7 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計-40歳未満-透析歴10~14年一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	108	108	108	108	28	6	14
合計	3,669	1,225.83	95,022	307,526	3,640	625	6,300
平均	33.97222222	11.35027778	879.8333333	2847.462963	130	104.1666667	450
標準偏差	4.203821878	1.287853723	96.48122184	207.4894176	0	59.19600212	0
標準誤差	0.404512949	0.123923782	9.2839099	19.96567852	0	24.16666667	0
中央値(メジアン)	35	11.055	884	2800	130	80	450
最頻値(モード)	39	10.04	954	2670	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	9	7	57	2	76	76	93
合計	2,646	1,130	12,480	4,371	16,424	121,615	395,225
平均	294	161.4285714	218.9473684	2185.5	216.1052632	1600.197368	4249.731183
標準偏差	0	72.53242296	601.0368547	579.1204538	108.407697	1087.851154	2478.898362
標準誤差	0	27.41467902	79.60927619	409.5	12.43521568	124.7850855	257.0497858
中央値(メジアン)	294	174	20	2185.5	210	1280.5	4316
最頻値(モード)	294	174	10	#N/A	210	#N/A	4225
	うちEPO	うちV・D ₃	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)	I型(292)
標本数	81	35	108	98	8	1	0
合計	309,808	70,333	3,632,271	406,406	32,136	3,861	0
平均	3824.790123	2009.514286	33632.13889	4147	4017	3861	#DIV/0!
標準偏差	1883.080101	947.1495742	3100.031813	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
標準誤差	209.2311224	160.0974985	298.3007003	0	0	0	65535
中央値(メジアン)	4056	1988	35734	4147	4017	3861	#NUM!
最頻値(モード)	4225	1742	36127	4147	4017	#N/A	#N/A
	特定積層型	ダイア計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	1	108	108	69	13	26	1
合計	12,636	455,039	2,751,840	403,000	20,280	17,573	13,830
平均	12636	4213.324074	25480	5840.57971	1560	675.8846154	13830
標準偏差	#DIV/0!	819.191747	0	1515.830081	0	2793.160781	#DIV/0!
標準誤差	0	78.8267626	0	182.4844975	0	547.7838971	0
中央値(メジアン)	12636	4147	25480	6500	1560	143	13830
最頻値(モード)	#N/A	4147	25480	6500	1560	143	#N/A
	うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	0	19	0	1	7	55	27
合計	0	2,553	0	14,262	758	28,948	16,992
平均	#DIV/0!	134.3684211	#DIV/0!	14262	108.2857143	526.3272727	629.3333333
標準偏差	#DIV/0!	21.58500129	#DIV/0!	#DIV/0!	19.37966534	740.6982205	1012.012884
標準誤差	65535	4.951938912	65535	0	7.324824996	99.87572768	194.7619703
中央値(メジアン)	#NUM!	143	#NUM!	14262	117	330	550
最頻値(モード)	#N/A	143	#N/A	#N/A	117	550	550
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	39	83	79	19	33	33	0
合計	11,727	20,068	3,930	17,121	11,294	11,294	0
平均	300.6923077	241.7831325	49.74683544	901.1052632	342.2424242	342.2424242	#DIV/0!
標準偏差	183.8815628	576.1146153	41.95830298	954.5337369	158.072181	158.072181	#DIV/0!
標準誤差	29.44461518	63.23679442	4.720677902	218.9850578	27.51683473	27.51683473	65535
中央値(メジアン)	260	36	20	436	306	306	#NUM!
最頻値(モード)	260	16	16	95	207	207	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	108	108	108	108	108	108	108
合計	4,633,913	4,230,913	4,613,633	4,210,633	4,213,340	4,596,060	4,193,060
平均	42906.60185	39175.12037	42718.82407	38987.34259	39012.40741	42556.11111	38824.62963
標準偏差	4709.664926	4192.849981	4575.101302	4003.01898	3630.485882	4229.669571	3461.492735
標準誤差	453.1877188	403.4571776	440.239328	385.190681	349.3436669	407.0001442	333.0822937
中央値(メジアン)	42603.5	38764.5	42314.5	38713	38740	42226	38667
最頻値(モード)	41682	#N/A	41682	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	除夜障手在						
標本数	108						
合計	4,188,689						
平均	38784.15741						
標準偏差	3410.588184						
標準誤差	328.184001						
中央値(メジアン)	38667						
最頻値(モード)	#N/A						

表 4-8 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計-40~64歳-透析歴10~14年-

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	796	796	796	796	179	34	110
合計	43,332	9,447.36	701,895	2,254,527	23,270	4,895	48,600
平均	54.43718593	11.86854271	881.7776382	2832.320352	130	143.9705882	441.8181818
標準偏差	6.268405282	1.384393203	91.89381103	208.0442724	0	73.0792369	42.3112499
標準誤差	0.222177734	0.049068516	3.257089775	7.373933724	0	12.53298573	4.034219389
中央値 (メジアン)	55	12.03	954	2710	130	80	450
最頻値 (モード)	55	11.06	954	2670	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	39	28	385	37	550	553	726
合計	11,319	3,068	98,170	69,097	126,747	1,021,608	3,340,960
平均	290.2307692	109.5714286	254.987013	1867.486486	230.4490909	1847.392405	4601.873278
標準偏差	23.53883861	81.56498367	637.0141632	1159.249077	122.9603137	1266.046434	2810.404108
標準誤差	3.769230769	15.41433303	32.46524792	190.5793744	5.243045394	53.83777071	104.3038793
中央値 (メジアン)	294	174	30	1688	210	1586	4283.5
最頻値 (モード)	294	174	10	1700	210	53	4225
	うち EPO	うち V・D ₃	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)	I型(292)
標本数	635	216	796	698	92	3	1
合計	2,659,264	461,065	25,756,040	2,894,287	366,165	11,583	3,796
平均	4187.817323	2134.560185	32356.83417	4146.54298	3980.054348	3861	3796
標準偏差	2037.424383	883.1917625	3100.606796	27.01450831	354.3702467	0	#DIV/0!
標準誤差	80.85272037	60.09358787	109.8980941	1.022514219	36.94565217	0	0
中央値 (メジアン)	4225	1975.5	31057	4147	4017	3861	3796
最頻値 (モード)	4225	2418	29627	4147	4017	3861	#N/A
	特定積層型	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	3	796	796	333	116	187	8
合計	37,908	3,313,739	20,258,897	1,942,500	179,760	49,472	20,674
平均	12636	4162.988693	25450.87563	5833.333333	1549.655172	264.5561497	2584.25
標準偏差	0	523.6477342	757.2937573	1606.181583	111.4172029	1040.752484	3572.00167
標準誤差	0	18.56020184	26.84156556	88.01820855	10.34482759	76.10735916	1262.893302
中央値 (メジアン)	12636	4147	25480	6500	1560	143	1040
最頻値 (モード)	12636	4147	25480	6500	1560	143	#N/A
	うち輸血	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	1	144	0	1	47	344	177
合計	2,100	18,247	0	10,742	18,203	172,031	98,265
平均	2100	126.7152778	#DIV/0!	10742	387.2978723	500.0901163	555.1694915
標準偏差	#DIV/0!	35.8254633	#DIV/0!	#DIV/0!	1091.240935	499.2204133	537.5945631
標準誤差	0	2.985455275	65535	0	159.1738498	26.9161608	40.4080818
中央値 (メジアン)	2100	143	#NUM!	10742	117	330	360
最頻値 (モード)	#N/A	143	#N/A	#N/A	117	330	550
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	245	624	594	136	281	276	0
合計	72,246	141,611	32,576	104,843	119,160	105,270	0
平均	294.8816327	226.9407051	54.84175084	770.9044118	424.0569395	381.4130435	#DIV/0!
標準偏差	208.1687679	585.9460732	94.84186825	891.8053008	349.8599061	177.7458954	#DIV/0!
標準誤差	13.29941474	23.45661573	3.89140899	76.47167365	20.87089222	10.69904562	65535
中央値 (メジアン)	295	36	16	367.5	363	355	#NUM!
最頻値 (モード)	330	16	16	95	414	414	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	796	796	796	796	796	796	796
合計	33,626,401	31,686,901	33,449,641	31,507,141	31,637,429	33,400,169	31,457,669
平均	42244.22236	39807.66457	42022.16206	39581.83543	39745.51382	41960.01131	39519.68467
標準偏差	4508.661337	3754.044899	4476.121797	3653.839517	3715.602923	4440.907168	3620.132792
標準誤差	159.8052641	133.0585936	158.6519306	129.506908	131.6960539	157.4037812	128.3122048
中央値 (メジアン)	42000	39278	41767.5	39104	39249	41713	39094
最頻値 (モード)	37173	37453	37173	37453	37453	37173	37453
	除夜障手在						
標本数	796						
合計	31,388,572						
平均	39432.8794						
標準偏差	3581.671422						
標準誤差	126.9489777						
中央値 (メジアン)	38954						
最頻値 (モード)	37453						

表4-9 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計-65~69歳-透析歴10~14年一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	179	179	179	179	36	6	26
合計	11,972	2,132.47	157,508	510,648	4,680	1,060	11,475
平均	66.88268156	11.91324022	879.9329609	2852.782123	130	176.6666667	441.3461538
標準偏差	1.379090062	1.388671908	104.9321128	234.7455771	0	74.87767803	44.12613041
標準誤差	0.103078031	0.103794212	7.842994344	17.54570822	0	30.56868405	8.653846154
中央値(メジアン)	67	12.04	954	2800	130	225	450
最頻値(モード)	65	11.07	954	2670	130	225	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	13	8	83	9	125	126	166
合計	3,822	1,016	25,735	12,647	29,969	263,452	796,109
平均	294	127	310.060241	1405.222222	239.752	2090.888889	4795.837349
標準偏差	0	104.5206746	690.8718837	305.6872494	125.4414563	2599.774714	2921.045444
標準誤差	0	36.95363891	75.83304107	101.8957498	11.21982494	231.6063396	226.7170957
中央値(メジアン)	294	174	30	1342	210	1655.5	4273
最頻値(モード)	294	174	10	#N/A	210	962	4225
	うちEPO	うちV・D ₃	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)	I型(292)
標本数	146	42	179	144	36	0	0
合計	632,340	84,372	5,599,250	596,530	140,904	0	0
平均	4331.09589	2008.857143	31280.72626	4142.569444	3914	#DIV/0!	#DIV/0!
標準偏差	2067.433676	640.1812842	2536.26734	37.46283058	618	#DIV/0!	#DIV/0!
標準誤差	171.1020285	98.78211674	189.5695215	3.121902548	103	65535	65535
中央値(メジアン)	4225	1960	29676	4147	4017	#NUM!	#NUM!
最頻値(モード)	7618	2418	29627	4147	4017	#N/A	#N/A
	特定積層型	ダイア計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	0	179	179	42	37	41	1
合計	0	737,434	4,560,550	230,500	57,720	5,228	100
平均	#DIV/0!	4119.743017	25477.93296	5488.095238	1560	127.5121951	100
標準偏差	#DIV/0!	56.10855143	27.65509843	1967.690534	0	30.10325726	#DIV/0!
標準誤差	65535	4.193750034	2.067039106	303.6212412	0	4.701338931	0
中央値(メジアン)	#NUM!	4147	25480	6500	1560	143	100
最頻値(モード)	#N/A	4147	25480	6500	1560	143	#N/A
	うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	0	32	0	0	9	75	41
合計	0	4,372	0	0	818	39,701	23,934
平均	#DIV/0!	136.625	#DIV/0!	#DIV/0!	90.88888889	529.3466667	583.7560976
標準偏差	#DIV/0!	19.37032982	#DIV/0!	#DIV/0!	36.288581	567.973912	537.8535479
標準誤差	65535	3.424222893	65535	65535	12.09619367	65.58397819	83.99861193
中央値(メジアン)	#NUM!	143	#NUM!	#NUM!	100	330	360
最頻値(モード)	#N/A	143	#N/A	#N/A	117	260	550
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	52	151	145	33	62	59	0
合計	17,990	33,842	6,583	25,787	29,339	23,476	0
平均	345.9615385	224.1192053	45.4	781.4242424	473.2096774	397.8983051	#DIV/0!
標準偏差	573.2172008	543.9636621	42.1077322	741.478676	378.5100703	206.6344177	#DIV/0!
標準誤差	79.49092344	44.26713502	3.496856826	129.0748699	48.070827	26.90150981	65535
中央値(メジアン)	260	36	16	436	417	355	#NUM!
最頻値(モード)	330	16	16	111	483	483	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	179	179	179	179	179	179	179
合計	7,447,724	7,217,224	7,390,004	7,159,504	7,211,996	7,384,776	7,154,276
平均	41607.39665	40319.68715	41284.93855	39997.22905	40290.48045	41255.73184	39968.02235
標準偏差	4614.724693	4498.122933	4465.153254	4313.879019	4487.388717	4457.950501	4302.973088
標準誤差	344.9207179	336.2054932	333.7412237	322.4344565	335.4031802	333.2028646	321.6193089
中央値(メジアン)	41508	39638	40996	39309	39638	40884	39298
最頻値(モード)	42258	41230	42258	37384	41230	42258	37384
	除夜障手在						
標本数	179						
合計	7,141,629						
平均	39897.36872						
標準偏差	4244.549701						
標準誤差	317.25254						
中央値(メジアン)	39253						
最頻値(モード)	37384						

表 4-10 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計-70歳以上-透析歴10~14年-

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	239	239	239	239	46	10	33
合計	18,103	2,760.39	211,916	680,175	5,980	1,525	13,950
平均	75.74476987	11.54974895	886.6778243	2845.920502	130	152.5	422.7272727
標準偏差	4.629749872	1.428846548	92.76151297	230.9125802	0	76.42171012	74.57264609
標準誤差	0.299473624	0.0924244	6.000243471	14.93649314	0	24.16666667	12.98143143
中央値 (メジアン)	75	11.08	954	2720	130	152.5	450
最頻値 (モード)	72	10.07	954	2670	130	225	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	17	5	109	13	163	165	225
合計	4,998	862	31,775	13,694	38,548	286,076	1,193,613
平均	294	172.4	291.5137615	1053.384615	236.4907975	1733.793939	5304.946667
標準偏差	0	113.1582962	655.017495	619.7539214	128.1292446	1124.027756	3489.970721
標準誤差	0	50.60592851	62.7392974	171.8888109	10.03585697	87.50544213	232.6647147
中央値 (メジアン)	294	174	30	1120	210	1589	4563
最頻値 (モード)	294	174	10	300	210	1492	4225
	うち EPO	うち V・D ₃	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)	I型(292)
標本数	207	45	239	147	86	1	3
合計	942,263	83,836	7,281,692	609,609	345,462	3,861	11,388
平均	4551.995169	1863.022222	30467.33054	4147	4017	3861	3796
標準偏差	2166.204756	567.6938391	1941.524551	0	0	#DIV/0!	0
標準誤差	150.5616385	84.62680098	125.5867831	0	0	0	0
中央値 (メジアン)	4225	1859	29627	4147	4017	3861	3796
最頻値 (モード)	7618	2418	29627	4147	4017	#N/A	3796
	特定積層型	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	2	239	239	20	46	81	3
合計	25,272	995,592	6,089,720	97,000	71,640	14,301	1,972
平均	12636	4165.656904	25480	4850	1557.391304	176.5555556	657.3333333
標準偏差	0	783.0876451	0	2529.301963	17.69303474	460.5587368	949.9059603
標準誤差	0	50.65372889	0	565.5691125	2.608695652	51.17319297	548.4284619
中央値 (メジアン)	12636	4147	25480	6500	1560	143	170
最頻値 (モード)	12636	4147	25480	6500	1560	143	#N/A
	うち輸血	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	1	62	0	0	19	94	54
合計	4,254	7,968	0	0	2,079	40,618	26,350
平均	4254	128.516129	#DIV/0!	#DIV/0!	109.4210526	432.106383	487.962963
標準偏差	#DIV/0!	33.78269124	#DIV/0!	#DIV/0!	34.1147016	373.7609629	401.0026096
標準誤差	0	4.290406078	65535	65535	7.826449304	38.55049981	54.56954329
中央値 (メジアン)	4254	143	#NUM!	#NUM!	117	329.5	363
最頻値 (モード)	#N/A	143	#N/A	#N/A	117	330	550
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	58	187	178	40	91	87	0
合計	14,191	31,304	7,935	23,080	43,643	32,435	0
平均	244.6724138	167.4010695	44.57865169	577	479.5934066	372.816092	#DIV/0!
標準偏差	176.6056553	364.3074659	42.99437612	565.3438709	436.8541068	171.4143985	#DIV/0!
標準誤差	23.18945862	26.64080037	3.222564735	89.38871466	45.7947536	18.37755253	65535
中央値 (メジアン)	260	20	16	332	384	375	#NUM!
最頻値 (モード)	330	16	16	111	385	284	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	239	239	239	239	239	239	239
合計	9,797,032	9,700,032	9,725,392	9,628,392	9,685,731	9,711,091	9,614,091
平均	40991.76569	40585.90795	40692.01674	40286.159	40526.07113	40632.17992	40226.32218
標準偏差	4841.376842	4344.686999	4701.536781	4202.861517	4289.998112	4657.914047	4152.676347
標準誤差	313.1626345	281.0344394	304.1171329	271.8605116	277.4969094	301.2954128	268.6143028
中央値 (メジアン)	40331	40082	39908	39762	40082	39892	39762
最頻値 (モード)	40703	40703	39143	39143	#N/A	36965	36965
	除夜障手在						
標本数	239						
合計	9,600,397						
平均	40169.0251						
標準偏差	4125.549881						
標準誤差	266.8596376						
中央値 (メジアン)	39556						
最頻値 (モード)	36965						

表 4-11 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計-75歳以上-透析歴10~14年一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	124	124	124	124	30	5	16
合計	9,826	1,427.80	110,108	354,542	3,900	690	6,750
平均	79.24193548	11.51451613	887.9677419	2859.209677	130	138	421.875
標準偏差	3.759802295	1.439427593	96.4937283	241.074501	0	79.41977084	76.85213074
標準誤差	0.337640213	0.129264414	8.665392608	21.64912928	0	35.51760127	19.21303269
中央値 (メジアン)	78	11.07	954	2800	130	80	450
最頻値 (モード)	75	10.07	954	2670	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	12	2	57	8	85	86	118
合計	3,528	184	18,380	5,959	20,421	151,568	623,778
平均	294	92	322.4561404	744.875	240.2470588	1762.418605	5286.254237
標準偏差	0	115.9655121	690.0861248	479.5609413	123.1812356	1111.26127	3081.759366
標準誤差	0	82	91.40414015	169.5503968	13.36088092	119.8303845	283.6989451
中央値 (メジアン)	294	92	30	710	210	1583.5	4654
最頻値 (モード)	294	#N/A	10	300	210	2490	7618
	うち EPO	うち V・D ₃	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)	I型(292)
標本数	110	25	124	68	53	0	2
合計	509,778	45,954	3,751,672	281,996	212,901	0	7,592
平均	4634.345455	1838.16	30255.41935	4147	4017	#DIV/0!	3796
標準偏差	2225.697625	483.7700625	1585.847264	0	0	#DIV/0!	0
標準誤差	212.211942	96.75401249	142.4132885	0	0	65535	0
中央値 (メジアン)	4316	1742	29627	4147	4017	#NUM!	3796
最頻値 (モード)	7618	2548	29627	4147	4017	#N/A	3796
	特定積層型	ダイア計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	1	124	124	7	23	44	1
合計	12,636	515,125	3,159,520	25,500	35,760	5,542	170
平均	12636	4154.233871	25480	3642.857143	1554.782609	125.9545455	170
標準偏差	#DIV/0!	771.4348063	0	2779.602575	25.02172969	46.64958663	#DIV/0!
標準誤差	0	69.27689069	0	1050.591023	5.217391304	7.032689794	0
中央値 (メジアン)	12636	4147	25480	4000	1560	143	170
最頻値 (モード)	#N/A	4147	25480	6500	1560	143	#N/A
	うち輸血	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	0	34	0	0	11	43	25
合計	0	4,252	0	0	1,290	19,657	12,258
平均	#DIV/0!	125.0588235	#DIV/0!	#DIV/0!	117.2727273	457.1395349	490.32
標準偏差	#DIV/0!	36.60513391	#DIV/0!	#DIV/0!	29.80298948	358.6044101	364.0844362
標準誤差	65535	6.277728675	65535	65535	8.98593943	54.68665985	72.81688724
中央値 (メジアン)	#NUM!	143	#NUM!	#NUM!	117	330	550
最頻値 (モード)	#N/A	143	#N/A	#N/A	117	260	550
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	28	97	93	19	44	42	0
合計	7,389	19,260	4,190	14,750	23,769	16,757	0
平均	263.8928571	198.556701	45.05376344	776.3157895	540.2045455	398.9761905	#DIV/0!
標準偏差	181.9548864	421.1379171	45.09539782	610.4834198	466.4872978	166.9395229	#DIV/0!
標準誤差	34.38624138	42.76007691	4.676174919	140.0545018	70.3256062	25.75932762	65535
中央値 (メジアン)	260	16	16	442	407.5	400	#NUM!
最頻値 (モード)	260	16	16	1474	306	306	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	124	124	124	124	124	124	124
合計	5,065,855	5,040,355	5,030,095	5,004,595	5,034,813	5,024,553	4,999,053
平均	40853.66935	40648.02419	40565.28226	40359.6371	40603.33065	40520.58871	40314.94355
標準偏差	3938.254697	3868.578595	3841.225909	3782.343953	3872.7626	3845.669618	3787.870645
標準誤差	353.6657122	347.4086135	344.9522697	339.664514	347.7843483	345.3513266	340.1608256
中央値 (メジアン)	40386	40301	40120	40021.5	40229.5	40120	40021.5
最頻値 (モード)	43288	43288	37960	37960	#N/A	34926	34926
	除夜障手在						
標本数	124						
合計	4,993,094						
平均	40266.8871						
標準偏差	3761.289379						
標準誤差	337.7737575						
中央値 (メジアン)	40021.5						
最頻値 (モード)	34926						

表 4-12-1 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計一透析歴 10~14 年-TTEST=P 値一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)	
40 歳未満								
40~64 歳	P 値	8.4107E-157	0.00024687	0.837548947	0.47787942	#DIV/0!	0.215766531	0.472314433
40 歳未満								
65~69 歳	P 値	8.9038E-220	0.00072235	0.993599613	0.846227059	#DIV/0!	0.092435906	0.470239422
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	7.4293E-225	0.215568363	0.530117505	0.952657044	#DIV/0!	0.20707849	0.18069003
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	1.6234E-177	0.363692685	0.522473055	0.693375187	#DIV/0!	0.438451395	0.182730491
40~64 歳								
65~69 歳	P 値	2.5149E-116	0.696559356	0.813332984	0.246201438	#DIV/0!	0.32026212	0.959603269
40~64 歳								
70 歳以上	P 値	7.9445E-270	0.001995507	0.47083866	0.388055237	#DIV/0!	0.749622916	0.06357376
40~64 歳								
75 歳以上	P 値	2.4716E-221	0.008567253	0.488498312	0.190853499	#DIV/0!	0.866772076	0.121734118
65~69 歳								
70 歳以上	P 値	5.57151E-84	0.009524639	0.487325458	0.765479031	#DIV/0!	0.547270712	0.264874068
65~69 歳								
75 歳以上	P 値	3.1989E-123	0.016072216	0.498884522	0.816869458	#DIV/0!	0.427974374	0.301817275
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射	
40 歳未満								
40~64 歳	P 値	0.636032208	0.13456669	0.688275858	0.704815798	0.334290052	0.105394693	0.249590588
40 歳未満								
65~69 歳	P 値	#DIV/0!	0.478509491	0.42075684	0.018253549	0.17455015	0.119465776	0.129335696
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.840973451	0.486897683	0.031090871	0.231065004	0.387358867	0.008421305
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.316010372	0.394956528	0.006082075	0.19099118	0.350462961	0.008933624
40~64 歳								
65~69 歳	P 値	0.56885048	0.619653594	0.482053368	0.245496026	0.447102684	0.123249597	0.426062163
40~64 歳								
70 歳以上	P 値	0.514096734	0.143826795	0.599679061	0.020163111	0.585473608	0.300104642	0.002079622
40~64 歳								
75 歳以上	P 値	0.584258084	0.774630314	0.460792712	0.010652511	0.494508407	0.556672192	0.015748484
65~69 歳								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.47529594	0.849661151	0.132614414	0.829113681	0.114753981	0.127831612
65~69 歳								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.687232624	0.917042927	0.0037367	0.977468767	0.270765752	0.174056389
	うち EPO	うち V・D ₃	40：処置	II 型(319)	II 型(309)	I 型(297)	I 型(292)	
40 歳未満								
40~64 歳	P 値	0.12828347	0.442509593	6.54474E-05	0.867109829	0.769745594	#DIV/0!	#DIV/0!
40 歳未満								
65~69 歳	P 値	0.069521123	0.997124952	1.96896E-11	0.243165908	0.642843059	#DIV/0!	#DIV/0!
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.008405553	0.393080491	2.5183E-26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.00876365	0.410373141	9.38716E-22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40~64 歳								
65~69 歳	P 値	0.445048273	0.38076254	1.65568E-05	0.135562488	0.450203716	#DIV/0!	#DIV/0!
40~64 歳								
70 歳以上	P 値	0.028190747	0.04905715	2.27023E-18	0.837606955	0.335039215	#DIV/0!	#DIV/0!
40~64 歳								
75 歳以上	P 値	0.03671821	0.100759585	3.17684E-13	0.889152175	0.44976912	#DIV/0!	#DIV/0!
65~69 歳								
70 歳以上	P 値	0.337002129	0.263399868	0.000231828	0.152669568	0.12266865	#DIV/0!	#DIV/0!
65~69 歳								
75 歳以上	P 値	0.262046173	0.254113486	8.22931E-05	0.3311682	0.227024725	#DIV/0!	#DIV/0!
	特定積層型	ダイヤ計	4~5 時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	
40 歳未満								
40~64 歳	P 値	#DIV/0!	0.386726928	0.689633415	0.972551614	0.739229432	0.153174865	#DIV/0!
40 歳未満								
65~69 歳	P 値	#DIV/0!	0.12856731	0.438264334	0.291723921	#DIV/0!	0.211242504	#DIV/0!
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.605153189	#DIV/0!	0.031737919	0.59934525	0.1220126	#DIV/0!
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.572341643	#DIV/0!	0.001280923	0.460169881	0.193808415	#DIV/0!
40~64 歳								
65~69 歳	P 値	#DIV/0!	0.270273356	0.632928664	0.202056426	0.57392963	0.400889954	#DIV/0!
40~64 歳								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.951414673	0.552406513	0.010924601	0.640609804	0.465996252	0.394337477
40~64 歳								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.872121347	0.668708716	0.00051014	0.826969819	0.378861868	#DIV/0!
65~69 歳								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.434246805	0.24835589	0.281528719	0.373028289	0.497988979	#DIV/0!
65~69 歳								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.551394973	0.406133895	0.035605098	0.207374864	0.856462343	#DIV/0!

表 4-12-2 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計ー透析歴 10～14 年ーTTEST=P 値ー

		うち輸血	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	#DIV/0!	0.365159255	#DIV/0!	#DIV/0!	0.505195285	0.737402517	0.56286669
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	#DIV/0!	0.701547683	#DIV/0!	#DIV/0!	0.272534831	0.979052279	0.809748428
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.479640281	#DIV/0!	#DIV/0!	0.934865617	0.304342386	0.371297296
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.316311876	#DIV/0!	#DIV/0!	0.491203905	0.57496235	0.519531192
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	#DIV/0!	0.131833875	#DIV/0!	#DIV/0!	0.422198599	0.654164821	0.759310528
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.736804764	#DIV/0!	#DIV/0!	0.273459302	0.219692052	0.396822367
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.809450001	#DIV/0!	#DIV/0!	0.418485461	0.585018331	0.559964358
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.213170798	#DIV/0!	#DIV/0!	0.199625172	0.183117206	0.322377569
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.116832352	#DIV/0!	#DIV/0!	0.090748335	0.453905013	0.4459419
		うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.86956619	0.828095387	0.637693461	0.555348866	0.185780942	0.227323622	#DIV/0!
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.636205765	0.816201548	0.460603405	0.616464942	0.060828625	0.182978209	#DIV/0!
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.135217132	0.2011243	0.371250454	0.107641013	0.080757053	0.374914851	#DIV/0!
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.420064818	0.562738803	0.483550211	0.6340839	0.022166219	0.139165826	#DIV/0!
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.272617998	0.9570915	0.242189582	0.950103885	0.324659686	0.530630486	#DIV/0!
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.090654035	0.188843568	0.161688636	0.195653794	0.217689127	0.691827274	#DIV/0!
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.450811662	0.646446688	0.328594533	0.979619294	0.052136117	0.548140804	#DIV/0!
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.203200518	0.253688274	0.863267773	0.185816871	0.925571388	0.426268704	#DIV/0!
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.463945221	0.69452318	0.952052121	0.979801974	0.417073728	0.977778842	#DIV/0!
		請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.154509532	0.105679202	0.130438223	0.117200668	0.054011464	0.188425922	0.060170289
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.022587802	0.033060927	0.009498764	0.049405916	0.012779647	0.015288795	0.019897969
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.00065312	0.004913864	0.000208069	0.007179134	0.001571018	0.000287903	0.002389969
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.000368632	0.005853138	0.000127787	0.007834836	0.00150171	0.000159962	0.002100648
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.089434312	0.112886738	0.046658627	0.184708835	0.088877289	0.055684143	0.149168751
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.000225663	0.006906189	7.31907E-05	0.011843234	0.00616041	6.56923E-05	0.010758819
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.001210465	0.02115886	0.000624907	0.028454933	0.017629386	0.00066575	0.023987573
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.190119682	0.541810776	0.193136719	0.4920564	0.586246949	0.168533683	0.535878801
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.139213106	0.50918955	0.145575961	0.450470587	0.52885905	0.136871609	0.469534286
		除夜障手在						
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.076050021						
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.021503805						
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.002475984						
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.001992715						
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.130663274						
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.0073209						
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.016799487						
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.510922467						
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.435930195						

表 4-13 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計-40歳未満-透析歴15年以上-

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	73	73	73	73	14	4	4
合計	2,654	1,333.97	65,945	202,756	1,820	610	1,800
平均	36.35616438	18.27356164	903.3561644	2777.479452	130	152.5	450
標準偏差	2.621332692	2.720390275	243.6923362	157.4960414	0	83.71578903	0
標準誤差	0.306803785	0.318397599	28.52203059	18.43351736	0	41.85789452	0
中央値 (メジアン)	37	18.06	884	2680	130	152.5	450
最頻値 (モード)	38	21.06	954	2670	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	4	2	33	0	55	55	64
合計	1,176	230	12,410	0	11,795	94,056	261,576
平均	294	115	376.0606061	#DIV/0!	214.4545455	1710.109091	4087.125
標準偏差	0	148.492424	869.791424	#DIV/0!	128.6944153	1049.797911	2860.810461
標準誤差	0	105	151.4112523	65535	17.35315142	141.5547215	357.6013076
中央値 (メジアン)	294	115	20	#NUM!	198	1550	4020.5
最頻値 (モード)	294	#N/A	10	#N/A	210	#N/A	2379
	うち EPO	うち V・D ₃	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)	I型(292)
標本数	52	19	73	60	13	0	0
合計	200,655	38,703	2,474,656	248,820	52,221	0	0
平均	3858.75	2037	33899.39726	4147	4017	#DIV/0!	#DIV/0!
標準偏差	1809.069698	633.7271583	2987.66661	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
標準誤差	250.8728291	145.3869811	349.6799274	0	0	65535	65535
中央値 (メジアン)	4011.5	2232	35997	4147	4017	#NUM!	#NUM!
最頻値 (モード)	4225	2418	36127	4147	4017	#N/A	#N/A
	特定積層型	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	0	73	73	50	2	6	0
合計	0	301,041	1,855,230	297,000	3,120	650	0
平均	#DIV/0!	4123.849315	25414.10959	5940	1560	108.3333333	#DIV/0!
標準偏差	#DIV/0!	50.07984492	562.967918	1315.682488	0	49.81030683	#DIV/0!
標準誤差	65535	5.861402501	65.89041096	186.0656018	0	20.33497261	65535
中央値 (メジアン)	#NUM!	4147	25480	6500	1560	88.5	#NUM!
最頻値 (モード)	#N/A	4147	25480	6500	1560	78	#N/A
	うち輸血	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	0	5	0	0	1	31	17
合計	0	585	0	0	65	17,456	11,253
平均	#DIV/0!	117	#DIV/0!	#DIV/0!	65	563.0967742	661.9411765
標準偏差	#DIV/0!	50.37856687	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	416.964855	395.7938969
標準誤差	65535	22.52998003	65535	65535	0	74.88909872	95.99412017
中央値 (メジアン)	#NUM!	99	#NUM!	#NUM!	65	350	550
最頻値 (モード)	#N/A	78	#N/A	#N/A	#N/A	330	550
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	22	55	52	9	18	18	0
合計	6,203	15,606	2,621	13,063	6,224	6,224	0
平均	281.9545455	283.7454545	50.40384615	1451.444444	345.7777778	345.7777778	#DIV/0!
標準偏差	144.2905393	710.0733196	43.79240673	1171.561683	157.5057629	157.5057629	#DIV/0!
標準誤差	30.76284635	95.74626688	6.072914151	390.5205611	37.12446435	37.12446435	65535
中央値 (メジアン)	260	32	16	1423	329.5	329.5	#NUM!
最頻値 (モード)	330	16	16	#N/A	284	284	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	73	73	73	73	73	73	73
合計	3,138,925	2,841,925	3,135,805	2,838,805	2,841,275	3,135,155	2,838,155
平均	42998.9726	38930.47945	42956.23288	38887.73973	38921.57534	42947.32877	38878.83562
標準偏差	4673.937479	3837.662505	4711.912258	3838.16054	3840.224281	4717.07313	3840.621521
標準誤差	547.0430044	449.1644221	551.4876161	449.2227128	449.4642553	552.0916506	449.5107488
中央値 (メジアン)	42795	38515	42795	38460	38515	42795	38395
最頻値 (モード)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	除夜障手在						
標本数	73						
合計	2,838,155						
平均	38878.83562						
標準偏差	3840.621521						
標準誤差	449.5107488						
中央値 (メジアン)	38395						
最頻値 (モード)	#N/A						

表 4-14 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計-40~64歳-透析歴15年以上-

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	1,351	1,351	1,351	1,351	280	55	166
合計	73,554	28,326.29	1,189,785	3,813,666	36,530	5,705	71,775
平均	54.44411547	20.966906	880.6698742	2822.84678	130.4642857	103.7272727	432.3795181
標準偏差	6.155727879	4.450441299	93.47140883	209.0733015	7.768985961	54.13647177	60.63227915
標準誤差	0.167475676	0.121080834	2.543027836	5.688148196	0.464285714	7.299760364	4.705977534
中央値 (メジアン)	55	20.09	954	2700	130	80	450
最頻値 (モード)	61	15.09	954	2670	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	70	44	584	18	931	944	1,174
合計	20,433	8,148	207,890	34,997	212,956	1,523,590	5,247,215
平均	291.9	185.1818182	355.9760274	1944.277778	228.7389903	1613.972458	4469.518739
標準偏差	17.56986056	92.30517452	759.9876361	1630.466617	114.3632845	1085.369649	3314.491218
標準誤差	2.1	13.91552864	31.44851214	384.3046671	3.748105262	35.32577314	96.73481919
中央値 (メジアン)	294	174	40	1597.5	210	1411	4141.5
最頻値 (モード)	294	174	10	1460	210	2152	4225
	うちEPO	うちV・D ₃	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)	I型(292)
標本数	924	371	1,351	1,131	190	4	5
合計	3,709,829	836,444	44,532,645	4,691,533	761,067	15,444	18,980
平均	4014.96645	2254.566038	32962.72761	4148.128205	4005.615789	3861	3796
標準偏差	2077.996048	998.8315676	3375.448941	239.3179032	136.2415563	0	0
標準誤差	68.36105109	51.85675118	91.83407766	7.116130216	9.884001335	0	0
中央値 (メジアン)	4056	2300	31222	4147	4017	3861	3796
最頻値 (モード)	4225	2418	29627	4147	4017	3861	3796
	特定積層型	ダイア計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	23	1,351	1,351	611	412	229	20
合計	290,628	5,777,652	34,352,520	3,607,000	640,560	181,812	82,211
平均	12636	4276.574389	25427.47594	5903.436989	1554.757282	793.9388646	4110.55
標準偏差	0	1116.87028	481.1506986	1500.984804	74.21733928	3843.228659	5643.858464
標準誤差	0	30.3861068	13.09041594	60.72334545	3.656425867	253.9676983	1262.005118
中央値 (メジアン)	12636	4147	25480	6500	1560	143	1851
最頻値 (モード)	12636	4147	25480	6500	1560	143	470
	うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	4	156	3	1	78	610	323
合計	6,000	19,730	64,080	5,213	85,513	340,613	200,959
平均	1500	126.474359	21360	5213	1096.320513	558.3819672	622.1640867
標準偏差	571.5476066	34.20138626	6866.652678	#DIV/0!	4902.958779	601.9844768	647.9492118
標準誤差	285.7738033	2.73830242	3964.463772	0	555.1507625	24.37363902	36.05285856
中央値 (メジアン)	1500	143	17778	5213	117	330	465
最頻値 (モード)	1500	143	#N/A	#N/A	117	330	550
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	418	1,025	972	195	474	468	0
合計	133,850	259,313	44,889	207,158	198,868	179,024	0
平均	320.215311	252.9882927	46.18209877	1062.348718	419.5527426	382.5299145	#DIV/0!
標準偏差	246.8203486	822.5443459	68.77065849	1478.182212	320.6020472	167.885952	#DIV/0!
標準誤差	12.07237787	25.69196897	2.2058199	105.8548268	14.72573973	7.760530878	65535
中央値 (メジアン)	295	19	16	558	375	375	#NUM!
最頻値 (モード)	330	16	16	111	276	276	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351
合計	57,322,504	53,715,506	56,681,946	53,074,946	53,533,694	56,500,134	52,893,134
平均	42429.68468	39759.81199	41955.54848	39285.67432	39625.23612	41820.97261	39151.09845
標準偏差	5230.284717	4639.006392	5158.840559	4491.587537	4322.610446	4906.467995	4182.704367
標準誤差	142.2976265	126.2110257	140.3538826	122.2002779	117.6030064	133.487714	113.7966547
中央値 (メジアン)	41931	38988	41437	38522	38932	41392	38467
最頻値 (モード)	41936	36992	36638	36992	33543	41679	33543
	除夜障手在						
標本数	1,351						
合計	52,858,137						
平均	39125.19393						
標準偏差	4166.620492						
標準誤差	113.3590691						
中央値 (メジアン)	38445						
最頻値 (モード)	33543						

表 4-15 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計-65~69歳-透析歴15年以上-

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	243	243	243	243	52	7	33
合計	16,244	5,050.08	212,895	692,376	6,760	850	14,175
平均	66.84773663	20.78222222	876.1111111	2849.283951	130	121.4285714	429.5454545
標準偏差	1.395634065	4.218923818	96.24010092	219.8054118	0	70.75275529	65.68584841
標準誤差	0.089529967	0.270644089	6.173805352	14.10052374	0	26.74202787	11.43443852
中央値(メジアン)	67	20.11	949	2800	130	80	450
最頻値(モード)	65	16.02	954	2670	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	11	11	124	3	174	176	214
合計	3,234	1,942	48,065	5,481	39,499	291,104	1,111,426
平均	294	176.5454545	387.6209677	1827	227.0057471	1654	5193.579439
標準偏差	0	67.86510685	771.743213	467.1798369	105.0399592	1041.685118	3731.09634
標準誤差	0	20.46209962	69.30458643	269.7264046	7.963058757	78.51997016	255.052495
中央値(メジアン)	294	174	40	1755	210	1471.5	4422
最頻値(モード)	294	174	10	#N/A	210	974	4225
	うちEPO	うちV・D ₃	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)	I型(292)
標本数	179	56	243	191	48	0	0
合計	818,324	121,885	7,648,818	792,077	192,816	0	0
平均	4571.642458	2176.517857	31476.61728	4147	4017	#DIV/0!	#DIV/0!
標準偏差	2242.601027	951.5485368	2761.816411	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
標準誤差	167.6198707	127.1560218	177.1706054	0	0	65535	65535
中央値(メジアン)	4225	2115	30347	4147	4017	#NUM!	#NUM!
最頻値(モード)	7618	2418	29627	4147	4017	#N/A	#N/A
	特定積層型	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	4	243	243	43	90	47	3
合計	50,544	1,035,437	6,182,020	260,500	139,080	6,272	1,030
平均	12636	4261.057613	25440.41152	6058.139535	1545.333333	133.4468085	343.3333333
標準偏差	0	1086.929224	435.4695331	1381.033526	101.4855943	99.12701744	135.7694124
標準誤差	0	69.72654221	27.93538357	210.6056383	10.69752092	14.45916156	78.38650678
中央値(メジアン)	12636	4147	25480	6500	1560	121	360
最頻値(モード)	12636	4147	25480	6500	1560	143	#N/A
	うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	0	34	0	0	15	110	59
合計	0	3,790	0	0	2,416	55,509	32,504
平均	#DIV/0!	111.4705882	#DIV/0!	#DIV/0!	161.0666667	504.6272727	550.9152542
標準偏差	#DIV/0!	45.64901359	#DIV/0!	#DIV/0!	123.3852658	484.28176	520.9828672
標準誤差	65535	7.828741244	65535	65535	31.85793863	46.17445408	67.82619211
中央値(メジアン)	#NUM!	143	#NUM!	#NUM!	117	330	357
最頻値(モード)	#N/A	143	#N/A	#N/A	117	330	140
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	74	180	171	36	76	74	0
合計	22,717	29,572	7,023	22,989	34,397	30,139	0
平均	306.9864865	164.2888889	41.07017544	638.5833333	452.5921053	407.2837838	#DIV/0!
標準偏差	220.1216658	347.4824458	39.21007958	515.1625194	328.5587183	181.3704693	#DIV/0!
標準誤差	25.58862389	25.89981233	2.998469727	85.86041991	37.68826974	21.08388879	65535
中央値(メジアン)	328.5	16	16	423	380	375	#NUM!
最頻値(モード)	330	16	16	95	345	345	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	243	243	243	243	243	243	243
合計	10,087,850	9,827,350	9,948,770	9,688,270	9,821,078	9,942,498	9,681,998
平均	41513.78601	40441.76955	40941.44033	39869.42387	40415.95885	40915.62963	39843.61317
標準偏差	5011.924946	4612.286863	4931.245422	4510.110325	4602.957685	4923.020085	4500.660844
標準誤差	321.5151352	295.8783402	316.3395413	289.3237123	295.2798732	315.8118857	288.7175277
中央値(メジアン)	41286	39453	40778	39286	39453	40778	39286
最頻値(モード)	42752	42752	42865	42865	38630	42865	38630
	除夜障手在						
標本数	243						
合計	9,676,517						
平均	39821.05761						
標準偏差	4474.54759						
標準誤差	287.0423617						
中央値(メジアン)	39286						
最頻値(モード)	42865						

表 4-16 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計-70歳以上-透析歴15年以上-

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	180	180	180	180	37	8	22
合計	13,384	3,549.34	158,058	513,790	4,810	930	9,675
平均	74.35555556	19.71855556	878.1	2854.388889	130	116.25	439.7727273
標準偏差	3.686942416	3.796220573	97.52587968	264.8147743	0	67.12195723	47.97016118
標準誤差	0.274808462	0.282953575	7.269149884	19.73812789	0	23.73119556	10.22727273
中央値(メジアン)	73	19.065	884	2710	130	80	450
最頻値(モード)	70	17.05	954	2670	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	9	6	95	5	123	125	170
合計	2,499	996	29,820	13,925	28,609	202,667	835,719
平均	277.6666667	166	313.8947368	2785	232.5934959	1621.336	4915.994118
標準偏差	49	89.40693485	649.6980391	2990.353156	115.8184587	1157.877438	3587.719006
標準誤差	16.33333333	36.50022831	66.65761235	1337.326587	10.44299873	103.5637064	275.1654867
中央値(メジアン)	294	174	40	1680	210	1460	4465.5
最頻値(モード)	294	174	10	#N/A	210	30	4225
	うちEPO	うちV・D ₃	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)	I型(292)
標本数	150	44	180	109	64	1	1
合計	641,912	87,511	5,552,815	452,023	257,397	3,861	3,796
平均	4279.413333	1988.886364	30848.97222	4147	4021.828125	3861	3796
標準偏差	1951.673559	873.9253392	2895.213919	0	38.625	#DIV/0!	#DIV/0!
標準誤差	159.3534788	131.749202	215.7965044	0	4.828125	0	0
中央値(メジアン)	4225	1859	29698.5	4147	4017	3861	3796
最頻値(モード)	4225	2418	29627	4147	4017	#N/A	#N/A
	特定積層型	ダイア計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	5	180	180	8	65	47	6
合計	63,180	780,257	4,571,970	45,000	100,320	18,820	10,050
平均	12636	4334.761111	25399.83333	5625	1543.384615	400.4255319	1675
標準偏差	0	1408.814194	617.4894883	2100.170061	133.9575134	909.4218121	1351.158762
標準誤差	0	105.0068102	46.02494904	742.5222459	16.61538462	132.6528049	551.6082547
中央値(メジアン)	12636	4147	25480	6500	1560	143	1425
最頻値(モード)	12636	4147	25480	6500	1560	143	#N/A
	うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	1	38	0	0	13	85	43
合計	1,560	4,979	0	0	12,281	44,364	22,370
平均	#DIV/0!	131.0263158	#DIV/0!	#DIV/0!	944.6923077	521.9294118	520.2325581
標準偏差	0	32.87444324	#DIV/0!	#DIV/0!	1275.404013	589.9821585	589.6849376
標準誤差	0	5.332938902	65535	65535	353.7334283	63.99254987	89.92610992
中央値(メジアン)	1560	143	#NUM!	#NUM!	117	324	350
最頻値(モード)	#N/A	143	#N/A	#N/A	117	330	550
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	60	148	141	38	67	64	0
合計	24,960	34,467	6,872	27,030	31,891	24,856	0
平均	416	232.8851351	48.73758865	711.3157895	475.9850746	388.375	#DIV/0!
標準偏差	524.0229326	611.3289029	43.36730918	820.9529435	678.574073	196.2962209	#DIV/0!
標準誤差	67.6510697	50.25092627	3.652186274	133.1761532	82.90101745	24.53702762	65535
中央値(メジアン)	295	36	19	373	353	354	#NUM!
最頻値(モード)	330	16	16	111	483	483	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	180	180	180	180	180	180	180
合計	7,406,516	7,361,516	7,306,196	7,261,196	7,342,696	7,287,376	7,242,376
平均	41147.31111	40897.31111	40589.97778	40339.97778	40792.75556	40485.42222	40235.42222
標準偏差	5112.314864	4990.819295	5001.352513	4872.486503	4938.312736	4951.238197	4815.5776
標準誤差	381.0494519	371.9937069	372.7788066	363.1737014	368.0800991	369.0435061	358.9319621
中央値(メジアン)	40013	39811.5	39570.5	39428.5	39785.5	39541	39421.5
最頻値(モード)	38295	38295	38295	38295	38295	38295	38295
	除夜障手在						
標本数	180						
合計	7,228,451						
平均	40158.06111						
標準偏差	4793.415801						
標準誤差	357.2801192						
中央値(メジアン)	39414.5						
最頻値(モード)	38295						

表 4-17 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計-75歳以上-透析歴15年以上-

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	73	73	73	73	18	5	7
合計	5,696	1,426.46	64,130	207,734	2,340	690	3,150
平均	78.02739726	19.54054795	878.4931507	2845.671233	130	138	450
標準偏差	2.813521927	3.640509309	104.3762057	252.1427095	0	79.41977084	0
標準誤差	0.329297834	0.426089386	12.21631085	29.51107198	0	35.51760127	0
中央値 (メジアン)	77	18.07	884	2710	130	80	450
最頻値 (モード)	75	17.03	954	2670	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	3	5	41	3	50	51	66
合計	882	822	17,810	10,917	11,371	78,191	292,392
平均	294	164.4	434.3902439	3639	227.42	1533.156863	4430.181818
標準偏差	0	99.86390739	864.4580637	3881.859477	102.3014932	956.9109127	2576.830151
標準誤差	0	44.66049709	135.0056678	2241.192614	14.46761591	133.9943293	317.1858653
中央値 (メジアン)	294	174	40	1680	232.5	1460	4264
最頻値 (モード)	294	174	30	#N/A	210	#N/A	4225
	うち EPO	うち V・D ₃	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)	I型(292)
標本数	58	15	73	38	31	1	1
合計	226,459	29,773	2,224,488	157,586	124,527	3,861	3,796
平均	3904.465517	1984.866667	30472.43836	4147	4017	3861	3796
標準偏差	1889.526073	715.1276476	1673.162275	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
標準誤差	248.1069284	184.6451646	195.8288322	0	0	0	0
中央値 (メジアン)	4138.5	1742	29653	4147	4017	3861	3796
最頻値 (モード)	4225	2418	29627	4147	4017	#N/A	#N/A
	特定積層型	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	2	73	73	1	28	22	3
合計	25,272	315,042	1,855,230	500	43,680	8,723	3,360
平均	12636	4315.643836	25414.10959	500	1560	396.5	1120
標準偏差	0	1408.204948	562.967918	#DIV/0!	0	903.2998632	545.2522352
標準誤差	0	164.8179227	65.89041096	0	0	192.5841779	314.8015248
中央値 (メジアン)	12636	4147	25480	500	1560	143	1290
最頻値 (モード)	12636	4147	25480	#N/A	1560	143	#N/A
	うち輸血	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	1	17	0	0	6	35	16
合計	1,560	2,229	0	0	4,934	20,963	9,802
平均	1560	131.1176471	#DIV/0!	#DIV/0!	822.3333333	598.9428571	612.625
標準偏差	#DIV/0!	28.50851266	#DIV/0!	#DIV/0!	982.7922805	726.8389231	677.548018
標準誤差	0	6.914329937	65535	65535	401.2232684	122.8582017	169.3870045
中央値 (メジアン)	1560	143	#NUM!	#NUM!	349.5	330	450
最頻値 (モード)	#N/A	143	#N/A	#N/A	117	330	550
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	26	61	57	16	27	25	0
合計	14,157	15,820	2,660	13,703	11,346	10,136	0
平均	544.5	259.3442623	46.66666667	856.4375	420.2222222	405.44	#DIV/0!
標準偏差	729.2000137	594.2952377	40.29061098	944.5528726	209.6835222	177.6405734	#DIV/0!
標準誤差	143.0078884	76.09170799	5.336621793	236.1382182	40.35361266	35.52811469	65535
中央値 (メジアン)	327	36	20	530.5	414	414	#NUM!
最頻値 (モード)	330	16	16	436	414	414	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	73	73	73	73	73	73	73
合計	2,934,704	2,934,204	2,891,024	2,890,524	2,925,481	2,882,301	2,881,801
平均	40201.42466	40194.57534	39603.06849	39596.21918	40075.08219	39483.57534	39476.72603
標準偏差	3861.290749	3847.702723	3631.805165	3619.200868	3704.567626	3477.275046	3463.868976
標準誤差	451.9298989	450.3395408	425.0706429	423.5954215	433.5868449	406.9842605	405.4151987
中央値 (メジアン)	39421	39421	39191	39191	39421	38958	38958
最頻値 (モード)	37455	37455	#N/A	#N/A	37455	#N/A	#N/A
	除夜障手在						
標本数	73						
合計	2,870,884						
平均	39327.17808						
標準偏差	3392.641356						
標準誤差	397.0786363						
中央値 (メジアン)	38938						
最頻値 (モード)	#N/A						

表 4-18-1 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計ー透析歴 15 年以上ーTTEST=P 値ー

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)	
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	1.8379E-114	3.50565E-07	0.075954618	0.068068479	0.823501749	0.098568927	0.56299876
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	2.4655E-275	2.60747E-06	0.15750091	0.009854872	#DIV/0!	0.526919454	0.542451486
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	7.2572E-181	0.003399904	0.239365	0.021198972	#DIV/0!	0.433236033	0.678716174
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	3.3349E-130	0.018527753	0.424274895	0.051948747	#DIV/0!	0.797971695	#DIV/0!
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	1.18E-167	0.548470052	0.48605849	0.071995995	0.667174674	0.434148724	0.809146228
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	2.7314E-260	0.000337359	0.730351508	0.06633138	0.716837253	0.555174598	0.583565956
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	4.4585E-174	0.007232041	0.847298329	0.36920564	0.800330753	0.19721386	0.44429141
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	1.0952E-102	0.007781659	0.834583859	0.828845118	#DIV/0!	0.886633142	0.533629396
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	1.479E-141	0.023723182	0.85585105	0.905419741	#DIV/0!	0.711392798	0.419882427
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射	
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.812946724	0.307180359	0.883556985	#DIV/0!	0.371753829	0.522534626	0.365807111
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	#DIV/0!	0.330770524	0.940766981	#DIV/0!	0.4660492	0.728129809	0.029591379
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.528757116	0.561526365	0.66643647	#DIV/0!	0.352345083	0.626744525	0.098359956
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.618481946	0.774378996	#DIV/0!	0.571487359	0.367742095	0.473543777
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.694411247	0.772623223	0.674632395	0.904684464	0.852639551	0.651376256	0.004031657
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.083683437	0.634076376	0.610121343	0.406549545	0.725817358	0.943638733	0.104603267
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.837661999	0.637953715	0.527170788	0.188254812	0.936374628	0.602576421	0.924484193
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.280590325	0.787538043	0.454351212	0.612525796	0.665559737	0.798225162	0.461859992
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.778018895	0.744578439	0.46712849	0.980301471	0.458573427	0.122016506
	うち EPO	うち V・D ₃	40：処置	II 型(319)	II 型(309)	I 型(297)	I 型(292)	
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.595649594	0.348239192	0.020367497	0.97088828	0.764045018	#DIV/0!	#DIV/0!
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.036712427	0.553985095	4.27341E-10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.174076581	0.829514435	9.51722E-13	#DIV/0!	0.65521585	#DIV/0!	#DIV/0!
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.897395811	0.823337868	1.6336E-14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.001241274	0.583745626	1.19348E-10	0.948078947	0.56381564	#DIV/0!	#DIV/0!
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.14522304	0.091979874	2.12966E-15	0.960767614	0.349019216	#DIV/0!	#DIV/0!
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.69305189	0.301565272	5.071E-10	0.976830811	0.642857869	#DIV/0!	#DIV/0!
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.212848915	0.312963682	0.024093596	#DIV/0!	0.388897826	#DIV/0!	#DIV/0!
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.042248073	0.470571052	0.00345562	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	特定積層型	ダイヤ計	4～5 時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	#DIV/0!	0.243047554	0.818856444	0.867382816	0.92056774	0.663196208	#DIV/0!
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	#DIV/0!	0.282302062	0.673845193	0.674063805	0.839374733	0.546507516	#DIV/0!
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.202685224	0.864515083	0.567242663	0.862313697	0.439014815	#DIV/0!
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.24677741	1	#DIV/0!	#DIV/0!	0.447982715	#DIV/0!
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	#DIV/0!	0.841358942	0.695670876	0.51172492	0.310350673	0.240448316	0.269828434
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.525529256	0.485218992	0.604315838	0.315226484	0.486382602	0.311353559
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.774256515	0.818856444	#DIV/0!	0.709035078	0.629560041	0.378687782
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.543972653	0.428537546	0.45834741	0.918060352	0.048365348	0.1437881
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.726553094	0.673845193	#DIV/0!	0.447329782	0.050949388	0.074837102

表 4-18-2 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計一透析歴 15 年以上-TTEST=P 値一

		うち輸血	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	#DIV/0!	0.548724992	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.965659979	0.802392183
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	#DIV/0!	0.803995595	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.542166879	0.419280362
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.404052283	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.721827831	0.366244963
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.424369111	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.809930604	0.798707703
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	#DIV/0!	0.030989355	#DIV/0!	#DIV/0!	0.463936389	0.375863369	0.425077228
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.459498496	#DIV/0!	#DIV/0!	0.91233617	0.600248956	0.328311976
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.590375871	#DIV/0!	#DIV/0!	0.892200959	0.701814779	0.954290659
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.039181831	#DIV/0!	#DIV/0!	0.025279646	0.822343997	0.781757737
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.111842649	#DIV/0!	#DIV/0!	0.015555231	0.379851701	0.695299054
		うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.471830582	0.785751806	0.661596245	0.437591117	0.331962498	0.361526528	#DIV/0!
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.617315235	0.091698442	0.145162909	0.002755091	0.183817841	0.189717149	#DIV/0!
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.241780282	0.615001232	0.813533512	0.030444544	0.423140165	0.400066743	#DIV/0!
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.103942453	0.840774826	0.643557856	0.178589799	0.206558609	0.261674516	#DIV/0!
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.666219439	0.154641023	0.344780321	0.09076833	0.406237642	0.24432554	#DIV/0!
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.0193445	0.774857601	0.668042539	0.156903378	0.259268161	0.798268675	#DIV/0!
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.000200189	0.952625909	0.958017638	0.584682779	0.991455032	0.507736684	#DIV/0!
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.107030738	0.202952337	0.102353365	0.651500137	0.7897158	0.557599183	#DIV/0!
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.013567958	0.130818866	0.355003176	0.286753294	0.633901136	0.964861115	#DIV/0!
		請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.362727761	0.133885561	0.105218267	0.457973091	0.173409912	0.055802107	0.586614507
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.024874928	0.011358719	0.002164969	0.092989199	0.012165478	0.001966502	0.098192026
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.007988255	0.002763714	0.000621239	0.023727498	0.004061513	0.000341141	0.032892676
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.000125375	0.048771636	3.67121E-06	0.253101111	0.06679194	1.3159E-06	0.324949496
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.011539365	0.034881731	0.004571729	0.062508776	0.009438823	0.008207812	0.01899284
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.001982789	0.002235315	0.000834048	0.003460301	0.000843308	0.000626687	0.001370488
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.000345795	0.431894657	0.000126195	0.561626925	0.383383457	6.24153E-05	0.513796823
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.461391117	0.332737359	0.471688678	0.305886291	0.420173524	0.375878541	0.390723148
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.040201007	0.677453846	0.032368948	0.636110855	0.563191739	0.021168264	0.521674472
		除夜障手在						
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.62142268						
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.104613659						
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.043375279						
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.455970844						
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.017939001						
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.002202635						
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.684130917						
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.457949353						
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.384696991						