

第8回透析医療費実態調査報告

鈴木 満 杉崎弘章 吉田豊彦 山崎親男

はじめに

本調査も8回目になり、調査結果が日本医師会や厚生労働省へ提出する要望の裏づけになるということに会員諸兄のご理解も得られ、定点観測のよい実例になっていると思われる。今回は180施設から8,388人の有効回答レセプトが集計された。今回の調査対象は、慢性維持透析患者外来医学管理料を算定し、月水金に週3回の透析治療を行っており、6月に13回の請求をしている患者で、HDF施行患者とリクセル使用患者は対象外とした。レセプトの診療行為別に分析を行った。

なお、本報告にはすべての集計結果を掲載していないため、表の番号で続いているものがあることをあらかじめ承知願いたい。

1 集計結果

1) 病院・診療所別集計結果(表1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-7, 1-8)

- * 病院と診療所の総平均請求点数は41,014.30点である。診療行為別に最頻値を合計すると請求合計は344,027.88点になる。
- * 請求合計を100%とすると、処置は76.23%で一番高く、次いで注射の9.66%、13の指導が6.42%となる。ダイアライザとEPOは請求合計のそれぞれ8.95%と8.02%を占める。
- * 平均請求点数は診療所で40,777.16点、病院は41,285.48点と病院が高い。

* 13の指導で診療所が2,694.90点、病院が2,566.64点と診療所が高く、処方はそれぞれ239.41点と207.36点で診療所が高い。

* EPOの注射は診療所が3,794.86点、病院が4,152.86点と病院が高く、40の処置では31,413.04点と31,099.14点と診療所が高いが、ダイアライザや夜間加算等では有意差がない。

* 検査は診療所が442.46点、病院が561.27点で病院が高い。

* 70の画像は診療所が113.69点、病院が332.07点で病院が高い。

* 除夜間障害では診療所が38,607.91点、病院が39,377.32点と病院が高い。

2) 男女別集計結果(表2-3)

- * 男性は5,377例、女性は3,051例が集まった。
- * 請求合計は男性41,567.57点、女性40,046.47点と男性が高かった。
- * 年齢は男性が59.64歳で女性は61.25歳であった。
- * 請求合計に有意差のある根拠は処置点数であり、男女はそれぞれ31,873.22点と30,205.48点で男性が高く、処置でも夜間加算の5,883.83点と5,432.98点とその有意差があった。

3) 年齢別集計結果表(表3-6-1, 3-6-2)

- * 40歳未満と40~64歳の群、65~69歳と70歳以上の群および65~69歳と75歳以上では、請求合計に有意差がない。年齢の若い層同士また年長同士では

有意差が無いが、それ以外の群同士では請求合計に有意差がある。

- * 40歳未満と65～69歳の群では、請求合計に有意差があり、13の指導の内その他情報、処方、処置と、80のその他に有意差がある。
- * 40歳未満の症例は499例で全体の5.95%を占め、平均年齢は33.52歳であり透析歴は7.87年である。13の指導の内その他情報は61.45点、注射は4,094.33点で内EPOは3,639.48点、処置点数は32,845.97点で、請求合計は41,695.48点が平均点数であった。
- * 75歳以上の症例は1,098例で全体の13.09%を占め、平均年齢は79.61歳であり透析年齢は6.11年である。13の指導の内その他情報は120.47点、注射は4,909.15点で、内EPOは4,306.32点、処置点数は29,720.55点で請求合計は40,089.05点が平均点数であった。
- * 典型的な例では、上述したように40歳未満と75歳以上の群に請求合計で有意差がある。請求合計では、平均年齢33.52歳の群のほうが平均年齢79.61歳の群よりも16,000円高い。透析歴は高齢者が1年半短く、悪性腫瘍特異物質治療管理料が該当するその他情報では倍高い。EPOに代表される注射は、高齢者が6,700円ほど高いが、処置では31,000円ほど低い。

4) 透析歴別集計結果(表4-5-1, 4-5-2)

- * 請求合計で有意差を示した群は10年未満と15年以上の群のみであり、ほかの群同士では有意差は認められない。除夜間障害でも同様の結果を示した。また分析項目では、処置点数と内ダイアライザで有意差が認められた。
- * 透析歴10年未満の群は5,270例で全体の62.83%を占め、平均年齢は61.31歳で透析歴は4.29年であった。処置点数は30,939.41点で内ダイアライザは3,656.89点、請求合計は40,808.29点で除夜間障害は39,060.74点であった。
- * 透析歴15年以上の群は1,766例で全体の21.05%を占め、平均年齢は58.15歳で透析歴は21.02年であった。処置点数は32,069.78点で内ダイアライザは3,724.43点、請求合計は41,352.61点で除夜間障害は38,577.11点であった。

5) 年齢別透析歴別集計結果

① 透析歴10年未満(表5-6-1, 5-6-2)

- * 請求合計と除夜間障害ともに、40歳未満と40～64歳、65～69歳と70歳以上、65～69歳と75歳以上の3群のみで有意差が無かった。注射でも同様な傾向を示している。
- * 処置では、すべての群に有意差があるが、処置項目のダイアライザ、夜間と障害に有意差は認められない。

② 透析歴10～14年(表5-12-1, 5-12-2)

- * 請求合計で40～64歳(41,683.12点)と70歳以上(40,445.71点)の群のみが有意差を認めた。
- * 処置では全群に有意差があるが、注射では内EPOを含めて有意差がない。

③ 透析歴15年以上(表5-18-1, 5-18-2)

- * 40歳未満(3,274.51点)と70歳以上(4,260.53点)と75歳以上(4,661.85点)の2群および40～64歳(3,790.18点)と70歳以上と75歳以上の2群の併せて4群にEPO投与に関して有意差を認めたが、請求合計では40～64歳(41,646.00点)と70歳以上(40,148.41点)の群のみが有意差を認めた。

6) 院内・院外別処方主計結果(表6-5-1, 6-5-2)

- * 院内処方の症例は5,218例で院外処方では2,936例である。
- * 投薬と請求合計に、当然、有意差が認められるが、指導・在宅・処置・検査・画像にも有意差が認められた。院内処方と院外処方はそれぞれ指導で2,614.7点と2,668.53点、在宅で1,816.94点と1,371.87点、投薬は2,076.57点と47.68点、処置は31,050.80点と31,637.33点、検査は459.39点と572.77点、画像は179.21点と294.19点、請求合計は41,383.54点と40,312.92点、除夜間障害は39,520.24点と38,065.50点である。
- * 投薬で2,000点の違いが請求合計では1,000点の違いに縮小している。

7) DM・非DM別集計結果(表8-11-1, 8-11-2)

- * DMは781症例で非DM症例は7,607例であった。
- * 平均年齢と透析歴に有意差があり、DMで62.41歳と5.03年で、非DMでは60.00歳と9.42年である。
- * 在宅は当然ながら、指導(DM 2,557.54点と非DM

2,643.03 点：以下同様），処方（244.80 点と 221.33 点），投薬（2,285.86 点と 1,970.93 点），障害加算（1,512.04 点と 1,553.54 点），請求合計（43,138.65 点と 40,796.19 点），除夜間障害（41,156.17 点と 38,742.07 点）に有意差が認められた。

おわりに

処置で有意差があっても分析項目で理由が不明な場合がある。湿布処置や例えばグリセオールなどを処置

の項目から注射に外す努力を集計前にしているが、点滴薬剤が入ってしまうのか定かではない。ダイアライザ、夜間加算や障害加算のほかに処置で有意差のある項目の分析が求められよう。

平成 16 年診療報酬改定の影響を受けた 2004 年の第 8 回までの集計結果の一覧を下表に示す。表の如く 1 回当たり 37.1 点、月に 1 人当たり 482.4 点の削減結果を示している。

表 第 1 回～第 8 回調査までの集計結果

	1997 年	1998 年	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年
施設数	34	99	125	128	132	149	182	180
総数（人）	3,779	3,882	4,519	4,748	5,059	5,274	8,633	8,388
病院（人）	1,861	1,636	2,039	2,583	2,719	2,670	4,328	3,913
診療所（人）	1,918	1,967	2,480	2,165	2,339	2,604	4,305	4,475
透析回数（回）	12.5	13	13	13	13	13	13	13
平均年齢（歳）	57.1	56.4	56.9	57.8	58.4	62.6	59.4	60.2
透析歴（年）	8.5	8.9	8.7	9.0	9.0	7.8	8.96	9.01
管理指導料（点）	2,593.2	3,019.4	3,025.8	2,920.6	2,921.3	2,813.6	2,832.3	2,635.1
在宅注射（％）	7.8	6.1	6.3	7.3	7.6	10.5	8.4	9.3
投薬（点）	1,628.1	1,815.0	1,684.3	1,755.5	1,803.1	1,743.4	1,802.6	2,001.7
EPO（％）	72.7	78.1	78.7	79.6	81.9	83.2	82.3	83.0
夜間加算（％）	29.5	30.6	31.1	30.3	29.0	17.9	30.2	29.6
障害者加算（％）	25.9	19.0	17.6	20.8	21.3	24.3	20.8	21.2
検査（点）	533.9	600.9	665.3	575.1	608.0	528.5	524.1	506.3
画像診断（点）	365.8	158.9	161.2	217.7	208.0	212	228.6	218.1
透析食（点）	—	817.9	818	818.7	817.4	—	—	—
院外処方（％）	19.5	13.3	26.5	27.7	25.6	32.8	33.8	37.6
除夜障害手術（点）	43,124.7	43,525.7	43,095.5	42,303.5	42,971.6	39,286.1	39,604.8	39,122.4
透析医療費/1 回（点）	3,317.3	3,348.1	3,315.0	3,254.1	3,305.5	3,022.0	3,046.5	3,009.4
Ⅱ型（％）	—	—	96.9	98.2	98.7	99.0	98.99	99.59

表 1-1 病院・診療所別集計結果表 一病院・診療所計一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	8,388	8,369	8,388	8,388	1,848	184	1,542
合計	505,181	75,440.98	7,449,614	22,102,937	240,500	14,720	689,625
平均	60.22663329	9.014336241	888.1275632	2635.066404	130.1406926	80	447.2276265
標準偏差	12.42171705	7.409565414	101.6120075	217.25858	4.275528122	0	24.82937365
標準誤差	0.135628957	0.080994579	1.109470657	2.372180468	0.099457785	0	0.632300576
中央値(メジアン)	60	7.06	954	2525	130	80	450
最頻値(モード)	56	1.05	954	2460	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	435	142	3,891	781	5,438	5,470	7,698
合計	126,126	24,621	372,865	1,302,731	1,215,994	10,949,451	34,275,584
平均	289.9448276	173.3873239	95.82755076	1668.029449	223.6105186	2001.727788	4452.531047
標準偏差	24.10397389	7.300877817	147.1433078	1065.485055	125.9839939	1292.556922	2779.712583
標準誤差	1.15569709	0.612676056	2.358902004	38.12605286	1.70842442	17.4765625	31.68187963
中央値(メジアン)	294	174	20	1522	210	1763	4069
最頻値(モード)	294	174	10	820	168	30	3991
	うちEPO	うちDV ₃	40：処置	Ⅱ型(280)	Ⅱ型(275)	I型(242)	I型(263)
標本数	6,961	1,601	8,388	6,467	1,887	18	14
合計	27,599,221	3,666,071	262,264,273	23,464,563	6,647,332	53,389	36,542
平均	3964.835656	2289.86321	31266.60384	3628.353642	3522.698463	2966.055556	2610.142857
標準偏差	1975.773324	1027.741331	2900.165541	170.0166711	359.8170321	785.4106811	954.7792219
標準誤差	23.68106886	25.68550782	31.66602696	2.114170838	8.283154595	185.1230729	255.1754806
中央値(メジアン)	3991	2327	29380.5	3640	3575	3419	3146
最頻値(モード)	3991	2327	29120	3640	3575	3419	3146
	特定積層型	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	57	8,387	8,388	2,482	1,779	2,745	133
合計	600,445	30,802,271	213,721,580	14,435,500	2,738,520	1,433,544	509,728
平均	10534.12281	3672.620842	25479.44444	5816.075745	1539.359191	522.2382514	3832.541353
標準偏差	855.6524885	576.7651706	43.17992491	1574.789875	155.7543953	2984.189414	5988.123925
標準誤差	113.3339407	6.297899196	0.471468489	31.60979835	3.692770663	56.95806293	519.2361954
中央値(メジアン)	10725	3640	25480	6500	1560	143	1220
最頻値(モード)	10725	3640	25480	6500	1560	143	3130
	うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	37	2,033	19	13	709	3,233	1,778
合計	112,178	270,042	495,153	199,646	353,184	1,636,847	1,026,730
平均	3031.837838	132.8293163	26060.68421	15357.38462	498.1438646	506.2935354	577.4634421
標準偏差	2008.858832	28.83350397	8777.641344	11826.46351	2685.805774	567.3145094	574.0667963
標準誤差	330.2543576	0.639482602	2013.729031	3280.070814	100.8675531	9.977483971	13.61433867
中央値(メジアン)	2298	143	28628	15837	117	292	363
最頻値(モード)	2121	143	32850	15837	117	292	550
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	1,993	6,555	6,219	999	3,217	3,156	0
合計	584,107	1,429,639	307,320	1,059,466	1,211,307	1,088,421	0
平均	293.0792775	218.0990084	49.41630487	1060.526527	376.5331054	344.8735741	#DIV/0!
標準偏差	287.0899306	794.4155158	44.75018609	1647.686564	315.5900631	181.704365	#DIV/0!
標準誤差	6.430789751	9.812086537	0.567459103	52.13049589	5.564136681	3.234423345	65535
中央値(メジアン)	262	34	18	564	314	314	#NUM!
最頻値(モード)	292	14	14	109	314	276	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	8,388	8,388	8,388	8,388	8,388	8,388	8,388
合計	344,027,882	329,592,382	341,289,362	326,853,862	328,158,832	339,855,812	325,420,312
平均	41014.29208	39293.32165	40687.8114	38966.84096	39122.41679	40516.90653	38795.9361
標準偏差	4841.677906	4322.524787	4777.713192	4201.700122	3862.322317	4400.783616	3735.531577
標準誤差	52.86481097	47.1963357	52.16639968	45.87708786	42.17152466	48.05082008	40.78713506
中央値(メジアン)	40477.5	38623.5	40142	38320	38571.5	40082	38260.5
最頻値(モード)	41411	32824	41411	32824	32824	41036	32824
	除夜障手在						
標本数	8,388						
合計	324,117,581						
平均	38640.62721						
標準偏差	3660.467844						
標準誤差	39.96753695						
中央値(メジアン)	38084.5						
最頻値(モード)	32824						

表 1-2 病院・診療所別集計結果表 一病院・診療所計一最頻値(モード) データ数一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	8,388	8,369	8,388	8,388	1,848	184	1,542
合 計	505,181	75,440.98	7,449,614	22,102,937	240,500	14,720	689,625
平 均	60.22663329	9.014336241	888.1275632	2635.066404	130.1406926	80	447.2276265
最頻値(モード)	56	1.05	954	2,460	130	80	450
最頻値 データ数	349	103	4,291	2,640	1,846	184	1,523
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	435	142	3,891	781	5,438	5,470	7,698
合 計	126,126	24,621	372,865	1,302,731	1,215,994	10,949,451	34,275,584
平 均	289.9448276	173.3873239	95.82755076	1668.029449	223.6105186	2001.727788	4452.531047
最頻値(モード)	294	174	10	820	168	30	3,991
最頻値 データ数	423	141	1,423	70	629	22	373
	うち EPO	うち DV ₃	40：処置	II型(280)	II型(275)	I型(242)	I型(263)
標本数	6,961	1,601	8,388	6,467	1,887	18	14
合 計	27,599,221	3,666,071	262,264,273	23,464,563	6,647,332	53,389	36,542
平 均	3964.835656	2289.86321	31266.60384	3628.353642	3522.698463	2966.055556	2610.142857
最頻値(モード)	3,991	2,327	29,120	3,640	3,575	3,419	3,146
最頻値 データ数	808	314	2,334	6,407	1,834	12	10
	特定積層型	ダイア計	4～5時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔
標本数	57	8,387	8,388	2,482	1,779	2,745	133
合 計	600,445	30,802,271	213,721,580	14,435,500	2,738,520	1,433,544	509,728
平 均	10534.12281	3672.620842	25479.44444	5816.075745	1539.359191	522.2382514	3832.541353
最頻値(モード)	10,725	3,640	25,480	6,500	1,560	143	3,130
最頻値 データ数	54	6,408	8,385	1,860	1,744	1,563	12
	うち輸血	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	37	2,033	19	13	709	3,233	1,778
合 計	112,178	270,042	495,153	199,646	353,184	1,636,847	1,026,730
平 均	3031.837838	132.8293163	26060.68421	15357.38462	498.1438646	506.2935354	577.4634421
最頻値(モード)	2,121	143	32,850	15,837	117	292	550
最頻値 データ数	4	1,584	2	2	494	376	235
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	1,993	6,555	6,219	999	3,217	3,156	0
合 計	584,107	1,429,639	307,320	1,059,466	1,211,307	1,088,421	0
平 均	293.0792775	218.0990084	49.41630487	1060.526527	376.5331054	344.8735741	#DIV/0!
最頻値(モード)	292	14	14	109	314	276	#N/A
最頻値 データ数	472	2,813	3,056	85	135	133	0
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	8,388	8,388	8,388	8,388	8,388	8,388	8,388
合 計	344,027,882	329,592,382	341,289,362	326,853,862	328,158,832	339,855,812	325,420,312
平 均	41014.29208	39293.32165	40687.8114	38966.84096	39122.41679	40516.90653	38795.9361
最頻値(モード)	41,411	32,824	41,411	32,824	32,824	41,036	32,824
最頻値 データ数	6	8	6	8	9	6	9
	除夜障手在						
標本数	8,388						
合 計	324,117,581						
平 均	38640.62721						
最頻値(モード)	32,824						
最頻値 データ数	9						

表 1-3 病院・診療所別集計結果表 一病院・診療所計-請求合計に対する合計の割合-

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	8,388	8,369	8,388	8,388	1,848	184	1,542
比率(%)			2.17%	6.42%	0.07%	0.00%	0.20%
合計	505,181	75,440.98	7,449,614	22,102,937	240,500	14,720	689,625
請求合計	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	435	142	3,891	781	5,438	5,470	7,698
比率(%)	0.04%	0.01%	0.11%	0.38%	0.35%	3.18%	9.96%
合計	126,126	24,621	372,865	1,302,731	1,215,994	10,949,451	34,275,584
請求合計	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882
	うちEPO	うちV・D ₃	40：処置	II型(280)	II型(275)	I型(242)	I型(263)
標本数	6,961	1,601	8,388	6,467	1,887	18	14
比率(%)	8.02%	1.07%	76.23%	6.82%	1.93%	0.02%	0.01%
合計	27,599,221	3,666,071	262,264,273	23,464,563	6,647,332	53,389	36,542
請求合計	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882
	特定積層型	ダイア計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	57	8,387	8,388	2,482	1,779	2,745	133
比率(%)	0.17%	8.95%	62.12%	4.20%	0.80%	0.42%	0.15%
合計	600,445	30,802,271	213,721,580	14,435,500	2,738,520	1,433,544	509,728
請求合計	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882
	うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	37	2,033	19	13	709	3,233	1,778
比率(%)	0.03%	0.08%	0.14%	0.06%	0.10%	0.48%	0.30%
合計	112,178	270,042	495,153	199,646	353,184	1,636,847	1,026,730
請求合計	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	1,993	6,555	6,219	999	3,217	3,156	0
比率(%)	0.17%	0.42%	0.09%	0.31%	0.35%	0.32%	0.00%
合計	584,107	1,429,639	307,320	1,059,466	1,211,307	1,088,421	0
請求合計	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	8,388	8,388	8,388	8,388	8,388	8,388	8,388
比率(%)	100.00%	95.68%	99.16%	94.84%	95.25%	98.74%	94.41%
合計	344,027,882	329,592,382	341,289,362	326,853,862	328,158,832	339,855,812	325,420,312
請求合計	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882	344,027,882
	除夜障手在						
標本数	8,388						
比率(%)	94.03%						
合計	324,117,581						
請求合計	344,027,882						

表 1-4 病院・診療所別集計結果表 一病院 1・2 計一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	3,913	3,908	3,913	3,913	789	72	0
合計	237,863	34,624.00	3,157,681	10,043,272	102,700	5,760	0
平均	60.78788653	8.859774821	806.9718886	2566.642474	130.1647655	80	#DIV/0!
標準偏差	12.50856502	7.438732275	89.34431529	153.2087647	4.628122554	0	#DIV/0!
標準誤差	0.199964346	0.118993065	1.428275547	2.449225017	0.164765526	0	65535
中央値(メジアン)	61	7.04	759	2480	130	80	#NUM!
最頻値(モード)	56	1.05	759	2460	130	80	#N/A
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	435	142	2,045	402	2,680	2,704	3,627
合計	126,126	24,621	158,085	667,846	555,714	5,362,137	17,112,432
平均	289.9448276	173.3873239	77.30317848	1661.308458	207.3559701	1983.038831	4718.067825
標準偏差	24.10397389	7.300877817	132.6578962	1058.174466	110.7731127	1283.454944	2910.88641
標準誤差	1.15569709	0.612676056	2.933502411	52.77694547	2.13976935	24.68182584	48.33386011
中央値(メジアン)	294	174	20	1460	185	1751.5	4177
最頻値(モード)	294	174	10	820	168	1342	3991
	うちEPO	うちDV ₃	40：処置	II型(280)	II型(275)	I型(242)	I型(263)
標本数	3,305	786	3,913	2,877	1,040	12	4
合計	13,725,198	1,850,538	121,690,917	10,422,788	3,663,242	38,135	10,164
平均	4152.858699	2354.374046	31099.13545	3622.797358	3522.348077	3177.916667	2541
標準偏差	2057.118678	990.3135719	2781.055385	215.4149882	355.7606012	507.2353691	698.5938257
標準誤差	35.78274187	35.3233153	44.4584906	4.016113578	11.03166794	146.4262385	349.2969129
中央値(メジアン)	3991	2327	29332	3640	3575	3419	2541
最頻値(モード)	7189	2327	29120	3640	3575	3419	3146
	特定積層型	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	13	3,913	3,913	1,046	911	1,401	93
合計	131,845	14,266,174	99,698,580	6,059,500	1,407,120	950,504	385,359
平均	10141.92308	3645.840532	25478.8091	5793.021033	1544.588364	678.4468237	4143.645161
標準偏差	1521.154357	394.9050423	63.21856946	1603.208223	132.7694053	3447.490793	6442.332891
標準誤差	421.8923101	6.313028575	1.010624309	49.57059017	4.398846644	92.10517826	668.0388009
中央値(メジアン)	10725	3640	25480	6500	1560	143	1250
最頻値(モード)	10725	3640	25480	6500	1560	143	1
	うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	20	1,053	14	9	351	1,737	1,034
合計	62,629	140,648	347,263	119,872	277,431	974,934	629,699
平均	3131.45	133.5688509	24804.5	13319.11111	790.4017094	561.2746114	608.9932302
標準偏差	2494.890726	28.4264821	8743.972981	10525.00581	3520.71751	658.6660273	639.2617073
標準誤差	557.874526	0.876009733	2336.925078	3508.335271	187.9219983	15.80393936	19.88009342
中央値(メジアン)	2281	143	27871.5	15837	117	309	363
最頻値(モード)	2121	143	32850	15837	117	292	550
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	1,027	3,134	2,912	767	1,386	1,335	0
合計	323,284	1,040,722	208,290	780,289	577,818	458,052	0
平均	314.7848101	332.074665	71.52815934	1017.325945	416.8961039	343.1101124	#DIV/0!
標準偏差	329.9011392	856.07144	46.55690139	1288.633549	439.3188468	206.0991028	#DIV/0!
標準誤差	10.29434203	15.29186701	0.862756784	46.52986065	11.80044051	5.640732029	65535
中央値(メジアン)	279	94	92	638	345	332	#NUM!
最頻値(モード)	292	109	109	109	284	284	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	3,913	3,913	3,913	3,913	3,913	3,913	3,913
合計	161,550,085	155,490,585	160,142,965	154,083,465	154,540,075	159,192,455	153,132,955
平均	41285.48045	39736.92435	40925.87912	39377.32303	39494.01354	40682.96831	39134.41222
標準偏差	5127.553421	4657.695588	5075.484973	4555.997476	4009.299904	4513.535526	3898.464016
標準誤差	81.97006317	74.45882475	81.13768687	72.83305901	64.09344562	72.15425405	62.32160163
中央値(メジアン)	40658	39097	40287	38673	39016	40205	38605
最頻値(モード)	38062	37470	39098	37470	39018	43628	37316
	除夜障手在						
標本数	3,913						
合計	152,465,109						
平均	38963.73856						
標準偏差	3824.912106						
標準誤差	61.14578654						
中央値(メジアン)	38424						
最頻値(モード)	37316						

表 1-7 病院・診療所別集計結果表 —診療所—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標 本 数	4,475	4,461	4,475	4,475	1,059	112	1,542
合 計	267,318	40,816.98	4,291,933	12,059,665	137,800	8,960	689,625
平 均	59.73586592	9.149737727	959.0911732	2694.897207	130.1227573	80	447.2276265
標準偏差	12.32574376	7.382094472	39.72770755	245.5285654	3.994803045	0	24.82937365
標準誤差	0.184253869	0.110525754	0.593877655	3.670333321	0.122757318	0	0.632300576
中央値 (メジアン)	60	7.07	954	2590	130	80	450
最 頻 値 (モード)	57	1.05	954	2460	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標 本 数	0	0	1,846	379	2,758	2,766	4,071
合 計	0	0	214,780	634,885	660,280	5,587,314	17,163,152
平 均	#DIV/0!	#DIV/0!	116.3488624	1675.158311	239.4053662	2019.997831	4215.954802
標準偏差	#DIV/0!	#DIV/0!	159.2211588	1074.538317	137.3707495	1301.365895	2635.309738
標準誤差	65535	65535	3.705825216	55.19532584	2.615755438	24.7441952	41.30295419
中央値 (メジアン)	#NUM!	#NUM!	30	1571	210	1778	3991
最 頻 値 (モード)	#N/A	#N/A	10	950	168	30	3991
	うち EPO	うち DV ₃	40：処置	II型(280)	II型(275)	I型(242)	I型(263)
標 本 数	3,656	815	4,475	3,590	847	6	10
合 計	13,874,023	1,815,533	140,573,356	13,041,775	2,984,090	15,254	26,378
平 均	3794.864059	2227.647853	31413.04045	3632.806407	3523.128689	2542.333333	2637.8
標準偏差	1883.435669	1059.479215	2993.083937	121.8498298	364.9464143	1099.159618	1072.896992
標準誤差	31.14925739	37.11193822	44.74271941	2.033656984	12.5397072	448.7300351	339.279819
中央値 (メジアン)	3948	2204	29422	3640	3575	3024.5	3146
最 頻 値 (モード)	3991	2327	29120	3640	3575	3419	3146
	特定積層型	ダイア計	4～5時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔
標 本 数	44	4,474	4,475	1,436	868	1,344	40
合 計	468,600	16,536,097	114,023,000	8,376,000	1,331,400	483,040	124,369
平 均	10650	3696.043138	25480	5832.869081	1533.870968	359.4047619	3109.225
標準偏差	497.4937186	697.2100094	0	1554.108544	176.6045033	2398.697957	4763.489108
標準誤差	75	10.42354927	0	41.0113559	5.994347431	65.42985094	753.1737596
中央値 (メジアン)	10725	3640	25480	6500	1560	143	870
最 頻 値 (モード)	10725	3640	25480	6500	1560	143	470
	うち輸血	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標 本 数	17	980	5	4	358	1,496	744
合 計	49,549	129,394	147,890	79,774	75,753	661,913	397,031
平 均	2914.647059	132.0346939	29578	19943.5	211.6005587	442.4552139	533.6438172
標準偏差	1288.930222	29.25822515	8788.549596	14951.65591	1409.662816	429.4432134	465.5239665
標準誤差	312.6114971	0.934619719	3930.358864	7475.827953	74.50299485	11.10298996	17.06693667
中央値 (メジアン)	3115	143	35152	16190	117	292	550
最 頻 値 (モード)	2298	143	#N/A	#N/A	117	292	550
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標 本 数	966	3,421	3,307	232	1,831	1,821	0
合 計	260,823	388,917	99,030	279,177	633,489	630,369	0
平 均	270.0031056	113.6851798	29.94557	1203.349138	345.9797925	346.1663921	#DIV/0!
標準偏差	231.0578758	717.8080495	32.37345508	2489.176467	163.6845264	161.544201	#DIV/0!
標準誤差	7.434165294	12.27246457	0.562952763	163.4224413	3.825281975	3.785614617	65535
中央値 (メジアン)	261	14	14	392.5	314	314	#NUM!
最 頻 値 (モード)	292	14	14	131	314	314	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標 本 数	4,475	4,475	4,475	4,475	4,475	4,475	4,475
合 計	182,477,797	174,101,797	181,146,397	172,770,397	173,618,757	180,663,357	172,287,357
平 均	40777.16134	38905.4295	40479.64179	38607.90994	38797.4876	40371.69989	38499.96804
標準偏差	4564.488691	3966.607514	4491.467597	3830.004397	3699.036883	4295.016468	3561.167666
標準誤差	68.23318056	59.29563311	67.14161001	57.25359384	55.29579952	64.20492064	53.23483369
中央値 (メジアン)	40319	38333	40012	38023	38288	39955	37965
最 頻 値 (モード)	39324	32824	39324	32824	32824	37358	32824
	除夜障手在						
標 本 数	4,475						
合 計	171,652,472						
平 均	38358.0943						
標準偏差	3486.339314						
標準誤差	52.11624697						
中央値 (メジアン)	37835						
最 頻 値 (モード)	32824						

表 1-8 病院・診療所別集計結果表 一病院・診療所計-TTEST=P 値一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
病院 1							
病院 2	P 値	0.384685868	2.39564E-05	0	1.51595E-45	0.713297131	#DIV/0!
病院 1							
診療所	P 値	0.000834625	0.824524435	0	1.0287E-105	0.764193829	#DIV/0!
病院 2							
診療所	P 値	0.003496668	4.93812E-06	2.88788E-51	2.2978E-104	0.765899402	#DIV/0!
病 院							
診療所	P 値	0.000108402	0.074081044	0	1.7316E-167	0.834576016	#DIV/0!
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
病院 1							
病院 2	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	1.8498E-11	0.433956771	5.86843E-31	0.990565313
病院 1							
診療所	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	2.61032E-08	0.66923603	1.06134E-06	0.327494222
病院 2							
診療所	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	6.1096E-22	0.600422752	4.41722E-39	0.51571465
病 院							
診療所	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	1.03718E-16	0.856068602	4.69415E-21	0.290407243
	うち EPO	うち DV ₃	40：処置	II 型(280)	II 型(275)	I 型(242)	I 型(263)
病院 1							
病院 2	P 値	0.372066576	0.717733144	6.18056E-12	0.907191258	0.003666656	0.263236479
病院 1							
診療所	P 値	9.17545E-14	0.014575557	0.018414791	0.026347082	0.415044384	0.156696136
病院 2							
診療所	P 値	0.00026825	0.267115815	3.2015E-16	0.075744568	0.029546979	0.279888006
病 院							
診療所	P 値	3.91586E-14	0.01359962	7.47777E-07	0.018625976	0.962628994	0.10711772
	特定積層型	ダイア計	4～5 時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔
病院 1							
病院 2	P 値	0.435834574	0.061378885	0.018546826	7.97475E-05	0.933080995	0.32097015
病院 1							
診療所	P 値	0.286257272	3.39383E-05	#DIV/0!	0.577428018	0.185438038	0.002138685
病院 2							
診療所	P 値	0.018117195	0.308826124	0.0048637	0.000151876	0.409190187	0.277714614
病 院							
診療所	P 値	0.059281566	6.94221E-05	0.207640484	0.533732892	0.146912011	0.005089582
	うち輸血	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
病院 1							
病院 2	P 値	0.908169304	0.064707483	0.09480895	#DIV/0!	0.045317075	0.577798336
病院 1							
診療所	P 値	0.790121444	0.068543585	0.169477305	0.374012856	0.000561731	1.73647E-09
病院 2							
診療所	P 値	0.67987413	0.556206395	0.766705504	#DIV/0!	0.99727559	0.000656522
病 院							
診療所	P 値	0.748571776	0.230712388	0.309939908	0.374012856	0.004049012	2.63724E-09
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
病院 1							
病院 2	P 値	0.856420629	0.479096736	5.37664E-22	0.804308606	1.20653E-12	6.81278E-37
病院 1							
診療所	P 値	0.001181746	9.73579E-27	6.2446E-245	0.175930556	2.40398E-18	0.000894053
病院 2							
診療所	P 値	0.011010173	2.16455E-10	1.3159E-276	0.344280089	4.10804E-28	1.25886E-46
病 院							
診療所	P 値	0.00049364	5.74329E-29	0	0.131936241	2.4586E-10	0.640698161
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
病院 1							
病院 2	P 値	0.000821928	0.675646898	0.000808212	0.644962504	0.651651709	0.000145521
病院 1							
診療所	P 値	1.03339E-08	4.62331E-16	1.66403E-07	1.26346E-14	3.99977E-14	1.30827E-05
病院 2							
診療所	P 値	0.825893713	9.89826E-09	0.582567754	2.94643E-08	1.41549E-07	0.155149447
病 院							
診療所	P 値	1.58833E-06	1.26662E-18	1.96014E-05	5.13604E-17	1.51011E-16	0.001227595
	除夜障手在						
病院 1							
病院 2	P 値	0.689370295					
病院 1							
診療所	P 値	4.04094E-12					
病院 2							
診療所	P 値	1.26638E-06					
病 院							
診療所	P 値	3.67732E-14					

表 2-3 男女別集計結果表 一病院・診療所計—TTEST—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
男 性							
女 性	P 値						
	1.17642E-08	0.021119218	0.996114343	0.265536029	0.684735686	#DIV/0!	0.304051682
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
男 性							
女 性	P 値						
	0.932494628	0.456043975	0.202642145	0.785376415	0.000140138	0.000365128	0.934295109
	うち EPO	うち V・D ₃	40：処置	II 型(280)	II 型(275)	I 型(242)	I 型(263)
男 性							
女 性	P 値						
	0.109286851	0.151307394	3.1364E-147	0.026360954	0.130322759	0.37467808	0.273351355
	特定積層型	ダイア計	4～5 時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔
男 性							
女 性	P 値						
	0.168043686	0.630029815	0.17258154	3.2425E-07	0.77884084	0.809878148	0.552633718
	うち輸血	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
男 性							
女 性	P 値						
	0.043678565	0.034025177	0.862631601	0.695853679	0.11380977	0.796179348	0.877788323
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
男 性							
女 性	P 値						
	0.899428047	0.978236785	0.332549806	0.898537536	0.93021031	0.003631601	#DIV/0!
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
男 性							
女 性	P 値						
	4.72566E-44	0.154241581	4.74301E-46	0.189118181	0.157787684	3.52221E-55	0.197404138
	除夜障手在						
男 性							
女 性	P 値						
	0.129540161						

表 3-6-1 年齢別集計結果表 一病院・診療所計—TTEST=P 値—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)	
40 歳未満 40～64 歳	P 値	0	5.7579E-10	0.125453802	0.943658591	0.730788676	#DIV/0!	0.332017182
40 歳未満 65～69 歳	P 値	0	0.014108825	0.163964272	0.009112968	0.489542964	#DIV/0!	0.147760845
40 歳未満 70 歳以上	P 値	0	0.000103533	0.015731076	0.015215781	#DIV/0!	#DIV/0!	0.214412042
40 歳未満 75 歳以上	P 値	0	4.00771E-09	0.001492099	0.004940431	#DIV/0!	#DIV/0!	0.127197034
40～64 歳 65～69 歳	P 値	0	1.52139E-07	0.858703432	8.86565E-06	0.284665217	#DIV/0!	0.14945135
40～64 歳 70 歳以上	P 値	0	2.11466E-64	0.038860246	1.63716E-06	0.54181029	#DIV/0!	0.356126108
40～64 歳 75 歳以上	P 値	0	4.82682E-56	0.000824911	1.61661E-06	0.643452063	#DIV/0!	0.100785058
65～69 歳 70 歳以上	P 値	0	4.23482E-17	0.192460172	0.642983882	0.220057983	#DIV/0!	0.610395674
65～69 歳 75 歳以上	P 値	0	6.61503E-22	0.01370929	0.770438603	0.352334248	#DIV/0!	0.868889075
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射	
40 歳未満 40～64 歳	P 値	0.540763762	0.838771024	0.00494155	0.475481326	0.095009993	0.014431217	0.128980989
40 歳未満 65～69 歳	P 値	0.498756613	#DIV/0!	5.21859E-05	0.576303561	3.07013E-05	0.002837347	0.001370766
40 歳未満 70 歳以上	P 値	0.89307885	#DIV/0!	1.33501E-05	0.577428359	0.006025465	0.288886465	8.56704E-07
40 歳未満 75 歳以上	P 値	0.839420458	#DIV/0!	1.17045E-06	0.386880048	0.040485522	0.890122	1.75416E-07
40～64 歳 65～69 歳	P 値	0.802269007	0.589338821	0.006123178	0.968659046	8.59012E-05	0.19789846	0.001923781
40～64 歳 70 歳以上	P 値	0.411776202	0.418207035	0.000136224	0.682675265	0.058683216	0.0109535	1.81367E-11
40～64 歳 75 歳以上	P 値	0.557327455	0.580562173	1.13851E-05	0.144983564	0.51908436	0.000825753	1.35483E-10
65～69 歳 70 歳以上	P 値	0.461018769	#DIV/0!	0.745653163	0.776496693	0.024019801	0.00180652	0.052365179
65～69 歳 75 歳以上	P 値	0.537872629	#DIV/0!	0.216757154	0.309565655	0.006179262	9.7597E-05	0.014606271
	うち EPO	うち V・D ₃	40：処置	II 型(280)	II 型(275)	I 型(242)	I 型(263)	
40 歳未満 40～64 歳	P 値	0.027832893	0.110607999	1.02661E-10	0.690419194	0.928517402	#DIV/0!	#DIV/0!
40 歳未満 65～69 歳	P 値	0.000908045	0.017276643	9.01223E-60	0.331453012	0.995265435	#DIV/0!	#DIV/0!
40 歳未満 70 歳以上	P 値	7.97373E-08	1.251E-05	2.1553E-183	0.519525013	0.26104853	#DIV/0!	#DIV/0!
40 歳未満 75 歳以上	P 値	9.84398E-09	9.13448E-07	8.397E-140	0.204353055	0.171635412	#DIV/0!	#DIV/0!
40～64 歳 65～69 歳	P 値	0.030326262	0.143711626	1.03818E-45	0.420428646	0.874206408	0.772874108	#DIV/0!
40～64 歳 70 歳以上	P 値	2.75105E-10	9.43654E-05	2.3304E-167	0.061464576	0.012876825	0.956729487	0.701937338
40～64 歳 75 歳以上	P 値	3.67511E-10	1.61719E-05	2.4462E-107	0.003782399	0.014395444	0.743938604	0.701937338
65～69 歳 70 歳以上	P 値	0.010158479	0.090775768	1.49218E-22	0.051096204	0.066241451	0.712560288	#DIV/0!
65～69 歳 75 歳以上	P 値	0.001498756	0.007831542	3.42894E-20	0.008457914	0.049882916	0.474381296	#DIV/0!
	特定積層型	ダイヤ計	4～5 時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	
40 歳未満 40～64 歳	P 値	0.757328956	0.935847262	0.704353548	0.732644328	0.362192307	0.197536984	0.314782793
40 歳未満 65～69 歳	P 値	#DIV/0!	0.755355066	#DIV/0!	0.006410986	0.346165027	0.068362171	0.316082551
40 歳未満 70 歳以上	P 値	0.527389282	0.573877356	#DIV/0!	0.063958674	0.504597519	0.179113344	0.57984387
40 歳未満 75 歳以上	P 値	0.430696696	0.598059131	#DIV/0!	0.564657673	0.539031983	0.149372644	0.583776435
40～64 歳 65～69 歳	P 値	0.570454841	0.506997022	0.570393623	0.000662321	0.69790505	0.312734968	0.996686512
40～64 歳 70 歳以上	P 値	0.099229021	0.352619493	0.45178843	0.048559373	0.24640296	0.958982739	0.04529401
40～64 歳 75 歳以上	P 値	0.027032135	0.439707862	0.573518892	0.624200059	0.265970132	0.639474101	0.120530757
65～69 歳 70 歳以上	P 値	0.241359816	0.243381323	#DIV/0!	0.815958535	0.21507342	0.370961206	0.085364453
65～69 歳 75 歳以上	P 値	0.138726949	0.312630841	#DIV/0!	0.476064316	0.22684096	0.669339214	0.166242212

表3-6-2 年齢別集計結果表 一病院・診療所計—TTEST=P値—

		うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
40歳未満								
40～64歳	P値	0.787012867	0.682632053	#DIV/0!	#DIV/0!	0.553634365	0.310459371	0.04564101
40歳未満								
65～69歳	P値	0.792570161	0.658993228	#DIV/0!	#DIV/0!	0.365376426	0.236540895	0.050893455
40歳未満								
70歳以上	P値	0.613020324	0.427518551	#DIV/0!	#DIV/0!	0.483474778	0.17917078	0.07987695
40歳未満								
75歳以上	P値	0.941390747	0.254690154	#DIV/0!	#DIV/0!	0.395429944	0.38502222	0.158255999
40～64歳								
65～69歳	P値	0.473639193	0.894229529	0.247954415	0.697671499	0.447844457	0.702861809	0.882486066
40～64歳								
70歳以上	P値	0.180684961	0.024182925	0.980765894	0.80017356	0.741953429	0.440255663	0.612529055
40～64歳								
75歳以上	P値	0.526395608	0.016577851	#DIV/0!	0.94323993	0.320043487	0.915410663	0.351819897
65～69歳								
70歳以上	P値	0.888158671	0.073625917	0.282550739	0.62580845	0.662090999	0.818953484	0.798903764
65～69歳								
75歳以上	P値	0.685002162	0.0390192	#DIV/0!	0.762396594	0.855868109	0.70658194	0.478522549
		うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
40歳未満								
40～64歳	P値	0.32144708	0.417474324	0.117566306	0.984073311	0.009296765	0.010638143	#DIV/0!
40歳未満								
65～69歳	P値	0.658039035	0.590562897	0.206714879	0.232712463	8.36147E-05	0.000119046	#DIV/0!
40歳未満								
70歳以上	P値	0.259168276	0.24214619	0.842466652	0.695206106	0.001162554	0.020366231	#DIV/0!
40歳未満								
75歳以上	P値	0.44117301	0.191372722	0.875307524	0.842446115	0.000704815	0.019198517	#DIV/0!
40～64歳								
65～69歳	P値	0.732129758	0.600298065	0.845238297	0.133055052	0.006723513	0.0401077	#DIV/0!
40～64歳								
70歳以上	P値	0.541155677	0.597988255	0.021065686	0.478304285	0.182466572	0.635434961	#DIV/0!
40～64歳								
75歳以上	P値	0.898197162	0.352775216	0.059736084	0.742382275	0.059594923	0.869598026	#DIV/0!
65～69歳								
70歳以上	P値	0.552970616	0.324296916	0.154744038	0.266170382	0.150199103	0.023232146	#DIV/0!
65～69歳								
75歳以上	P値	0.784680594	0.198304865	0.211679428	0.245773092	0.535873225	0.066228287	#DIV/0!
		請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
40歳未満								
40～64歳	P値	0.223616329	4.20532E-06	0.038961993	0.000183908	6.39346E-06	0.006741893	0.000373166
40歳未満								
65～69歳	P値	1.03899E-05	9.35235E-12	4.54836E-08	4.0087E-09	2.78269E-11	2.43144E-11	1.79014E-08
40歳未満								
70歳以上	P値	1.89387E-12	2.25573E-16	1.44251E-16	3.03452E-13	6.87599E-17	1.01273E-22	2.3437E-13
40歳未満								
75歳以上	P値	6.70471E-11	6.26537E-15	3.15411E-14	2.31173E-12	1.96743E-15	2.53311E-20	1.75678E-12
40～64歳								
65～69歳	P値	3.74358E-07	8.25683E-06	3.7588E-08	3.09107E-05	1.17224E-05	8.20885E-11	4.87041E-05
40～64歳								
70歳以上	P値	9.35408E-24	1.05869E-12	4.90173E-26	4.82743E-12	5.13815E-14	1.09955E-32	2.62314E-13
40～64歳								
75歳以上	P値	7.40914E-16	2.6574E-09	5.0296E-17	4.26533E-09	9.73384E-10	3.89036E-22	1.53653E-09
65～69歳								
70歳以上	P値	0.006508528	0.275216443	0.006663518	0.232507624	0.14627517	0.004553935	0.11328198
65～69歳								
75歳以上	P値	0.014475257	0.253355874	0.017267517	0.193787808	0.182662617	0.006918865	0.127387335
		除夜障手在						
40歳未満								
40～64歳	P値	0.003341464						
40歳未満								
65～69歳	P値	6.00597E-07						
40歳未満								
70歳以上	P値	1.40112E-11						
40歳未満								
75歳以上	P値	2.80071E-11						
40～64歳								
65～69歳	P値	0.000133803						
40～64歳								
70歳以上	P値	3.30797E-13						
40～64歳								
75歳以上	P値	3.25685E-10						
65～69歳								
70歳以上	P値	0.0727486						
65～69歳								
75歳以上	P値	0.053646631						

表 4-5-1 透析歴別集計結果表 一病院・診療所計—TTEST=P 値—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
10年未満 10～14年	P 値 8.12498E-11	0	0.981015975	0.918089636	0.446923235	#DIV/0!	0.82878233
10年未満 15年以上	P 値 2.00888E-20	0	0.698013209	0.245199794	0.404872308	#DIV/0!	0.299787257
10年未満 透析歴不明	P 値 0.508405855	#DIV/0!	0.155443707	0.504072904	0.932870367	#DIV/0!	0.816064013
10～14年 15年以上	P 値 0.153714685	0	0.756474239	0.331285442	#DIV/0!	#DIV/0!	0.570467212
10～14年 透析歴不明	P 値 0.8343462	#DIV/0!	0.174966239	0.506878305	#DIV/0!	#DIV/0!	0.803576355
15年以上 透析歴不明	P 値 1.9242E-211	#DIV/0!	1.8198E-194	0	#DIV/0!	#DIV/0!	5.16779E-40
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
10年未満 10～14年	P 値 0.235747209	0.624747323	0.435249397	0.579457878	0.172489029	0.227935711	0.006379725
10年未満 15年以上	P 値 0.401767993	0.617293421	2.23925E-07	0.644302965	0.980600662	0.000198078	0.976361891
10年未満 透析歴不明	P 値 #DIV/0!	#DIV/0!	0.058172591	0.815199345	0.824740086	0.021106188	0.258446887
10～14年 15年以上	P 値 0.113513305	#DIV/0!	0.000775283	0.930345577	0.276258887	0.000100456	0.044234009
10～14年 透析歴不明	P 値 #DIV/0!	#DIV/0!	0.045278736	0.757558261	0.981139031	0.042487284	0.51953149
15年以上 透析歴不明	P 値 #DIV/0!	#DIV/0!	0.056537057	5.99493E-90	3.75042E-06	0.106785414	0.010801577
	うち EPO	うち V・D ₃	40：処置	II型(280)	II型(275)	I型(242)	I型(263)
10年未満 10～14年	P 値 0.272535361	0.001572225	2.60085E-11	0.435123217	0.385792948	0.189129952	0.963654833
10年未満 15年以上	P 値 0.037046985	2.46488E-05	1.1002E-46	0.273032098	0.824271512	0.023539342	0.408385253
10年未満 透析歴不明	P 値 0.89118036	0.380488349	0.86124224	0.795755382	0.71267911	#DIV/0!	#DIV/0!
10～14年 15年以上	P 値 0.489236377	0.4861334	6.1324E-07	0.851486315	0.539315604	0.743418184	0.541469739
10～14年 透析歴不明	P 値 0.776025633	0.231710143	0.327159289	0.841290214	0.791062285	#DIV/0!	#DIV/0!
15年以上 透析歴不明	P 値 2.55187E-09	6.26621E-71	0	0.238733655	0.014549294	#DIV/0!	#DIV/0!
	特定積層型	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障 害	50：手術	手術・麻酔
10年未満 10～14年	P 値 0.202656441	0.751199566	0.583747198	0.299128565	0.24679193	0.644637998	0.667728888
10年未満 15年以上	P 値 0.332407186	2.93876E-05	0.641000723	0.016608905	0.101733305	0.096248045	0.071029739
10年未満 透析歴不明	P 値 #DIV/0!	0.003037567	0.947845317	0.92963884	0.730885803	0.636551844	#DIV/0!
10～14年 15年以上	P 値 0.006152862	0.012925216	0.38504276	0.335995983	0.987857556	0.136850985	0.400795086
10～14年 透析歴不明	P 値 #DIV/0!	0.005261799	#DIV/0!	0.993601298	0.832624539	0.658246414	#DIV/0!
15年以上 透析歴不明	P 値 #DIV/0!	0	1.7364E-274	3.8077E-202	0.654063505	0.081243643	#DIV/0!

表4-5-2 透析歴別集計結果表 一病院・診療所計—TTEST=P値—

		うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
10年未満 10～14年	P値	0.688190762	0.005539299	#DIV/0!	#DIV/0!	0.603504266	0.672802763	0.566936121
10年未満 15年以上	P値	0.561432751	1.48754E-07	0.716315697	0.700699525	0.380118709	0.721610616	0.446949187
10年未満 透析歴不明	P値	#DIV/0!	1.57896E-05	#DIV/0!	#DIV/0!	0.799999071	0.999373636	0.757160024
10～14年 15年以上	P値	0.325981576	0.08806198	#DIV/0!	#DIV/0!	0.710530734	0.515298331	0.264285054
10～14年 透析歴不明	P値	#DIV/0!	0.001853529	#DIV/0!	#DIV/0!	0.812512122	0.955941002	0.666675405
15年以上 透析歴不明	P値	#DIV/0!	5.49127E-08	#DIV/0!	#DIV/0!	0.248646551	0.692849946	0.018960073
		うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
10年未満 10～14年	P値	0.534055819	0.279551325	0.053674274	0.131931357	0.03243115	1.95855E-06	#DIV/0!
10年未満 15年以上	P値	0.484262002	0.276034145	0.004012102	0.936708606	0.000195263	2.9669E-13	#DIV/0!
10年未満 透析歴不明	P値	0.794341621	0.441464835	0.202770001	#DIV/0!	0.408225136	0.319692092	#DIV/0!
10～14年 15年以上	P値	0.998609025	0.078949315	0.54343709	0.181764595	0.229720642	0.084526786	#DIV/0!
10～14年 透析歴不明	P値	0.827254801	0.442259996	0.274040819	#DIV/0!	0.188518467	0.113906159	#DIV/0!
15年以上 透析歴不明	P値	0.706576173	0.360918624	0.02740999	#DIV/0!	0.123157919	#DIV/0!	#DIV/0!
		請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
10年未満 10～14年	P値	0.000111862	0.939030006	2.52399E-05	0.800349457	0.551450346	2.05399E-07	0.321231763
10年未満 15年以上	P値	4.05843E-05	0.00514405	0.002724059	2.6372E-05	0.003427681	0.000476736	5.7075E-06
10年未満 透析歴不明	P値	0.43968001	0.159972815	0.495035484	0.182400163	0.079189562	0.376864169	0.091428479
10～14年 15年以上	P値	0.917631554	0.048485595	0.239773205	0.001179829	0.012496123	0.118500438	9.53592E-05
10～14年 透析歴不明	P値	0.809317698	0.176065881	0.913225701	0.216389977	0.136978272	0.875699387	0.172061601
15年以上 透析歴不明	P値	0.013179445	0.881315096	0.009789852	0.131105567	0.94513172	0.003044129	0.043416138
		除夜障手在						
10年未満 10～14年	P値	0.04259127						
10年未満 15年以上	P値	0.005670209						
10年未満 透析歴不明	P値	0.11183598						
10～14年 15年以上	P値	0.000592656						
10～14年 透析歴不明	P値	0.252048095						
15年以上 透析歴不明	P値	#DIV/0!						

表 5-6-1 年齢別・透析歴別集計結果 一病院・診療所計一透析歴 10 年未満計一TTEST=P 値一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)	
40 歳未満 40～64 歳	P 値	0	0.51599875	0.316787395	0.612838921	0.712446413	#DIV/0!	0.520519599
40 歳未満 65～69 歳	P 値	0	0.203315517	0.640243863	0.37417929	0.466581737	#DIV/0!	0.179701867
40 歳未満 70 歳以上	P 値	0	0.002193941	0.050587628	0.117607317	#DIV/0!	#DIV/0!	0.335367752
40 歳未満 75 歳以上	P 値	0	0.000624302	0.017817742	0.040704479	#DIV/0!	#DIV/0!	0.209617079
40～64 歳 65～69 歳	P 値	0	0.265314148	0.500051993	0.029898563	0.297574946	#DIV/0!	0.035596965
40～64 歳 70 歳以上	P 値	0	4.35019E-06	0.049015098	6.26143E-05	0.478702305	#DIV/0!	0.276886322
40～64 歳 75 歳以上	P 値	0	1.98738E-06	0.012218823	1.2401E-05	0.582635167	#DIV/0!	0.059900348
65～69 歳 70 歳以上	P 値	0	0.024208596	0.046405458	0.41534505	0.16099579	#DIV/0!	0.340964971
65～69 歳 75 歳以上	P 値	0	0.005565402	0.013291165	0.142357659	0.277160704	#DIV/0!	0.849754542
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射	
40 歳未満 40～64 歳	P 値	0.612196041	0.797234823	0.401202006	0.337534936	0.197107644	0.024337068	0.357703467
40 歳未満 65～69 歳	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.086284773	0.381243603	4.23704E-05	0.003243199	0.014806027
40 歳未満 70 歳以上	P 値	0.501534932	#DIV/0!	0.005553397	0.417812948	0.022492897	0.29884066	6.2144E-05
40 歳未満 75 歳以上	P 値	0.573142159	#DIV/0!	0.000901827	0.089182141	0.068199827	0.692718913	2.0235E-05
40～64 歳 65～69 歳	P 値	0.402285246	0.606053571	0.093001367	0.867018582	1.32076E-06	0.138952344	0.008032274
40～64 歳 70 歳以上	P 値	0.45910092	0.369052198	9.29206E-06	0.474818211	0.037409185	0.014206444	5.16706E-10
40～64 歳 75 歳以上	P 値	0.807750439	0.52688721	5.99562E-07	0.006404838	0.284112004	0.002416524	1.90889E-09
65～69 歳 70 歳以上	P 値	0.266889102	#DIV/0!	0.121882603	0.720808725	0.003621972	0.001000429	0.057891048
65～69 歳 75 歳以上	P 値	0.351232618	#DIV/0!	0.02203051	0.050039798	0.001563027	0.000100405	0.02168195
	うち EPO	うち V・D ₃	40：処置	II 型(280)	II 型(275)	I 型(242)	I 型(263)	
40 歳未満 40～64 歳	P 値	0.05512548	0.004298651	2.89596E-12	0.541437869	0.515768459	#DIV/0!	#DIV/0!
40 歳未満 65～69 歳	P 値	0.005405744	0.004818442	1.10481E-47	0.455405091	0.559875919	#DIV/0!	#DIV/0!
40 歳未満 70 歳以上	P 値	5.57663E-06	0.000431321	1.7147E-140	0.699117254	0.864332085	#DIV/0!	#DIV/0!
40 歳未満 75 歳以上	P 値	2.19024E-06	0.000378786	4.0246E-110	0.356202085	0.787769237	#DIV/0!	#DIV/0!
40～64 歳 65～69 歳	P 値	0.100120427	0.356808627	1.17974E-28	0.719207383	0.881982681	0.247483218	#DIV/0!
40～64 歳 70 歳以上	P 値	1.41783E-07	0.132078708	1.6694E-109	0.0841376	0.009174479	#DIV/0!	0.614234002
40～64 歳 75 歳以上	P 値	3.06355E-07	0.067920707	9.15807E-74	0.00938286	0.015082731	#DIV/0!	0.614234002
65～69 歳 70 歳以上	P 値	0.024571611	0.84464008	1.42869E-12	0.15351055	0.047206865	0.03327908	#DIV/0!
65～69 歳 75 歳以上	P 値	0.009416979	0.510450933	7.86212E-12	0.044843037	0.049138962	0.03327908	#DIV/0!
	特定積層型	ダイア計	4～5 時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	
40 歳未満 40～64 歳	P 値	#DIV/0!	0.227133093	0.708118968	0.103116857	0.379382945	0.351164385	0.339518646
40 歳未満 65～69 歳	P 値	#DIV/0!	0.776074995	#DIV/0!	0.002664101	0.429423227	0.189164606	0.406404669
40 歳未満 70 歳以上	P 値	0.645376309	0.310070011	#DIV/0!	0.011627139	0.523704514	0.236695745	0.544445154
40 歳未満 75 歳以上	P 値	0.603645057	0.427010379	#DIV/0!	0.149222238	0.570924065	0.200216016	0.597565815
40～64 歳 65～69 歳	P 値	#DIV/0!	0.035187739	0.578356269	0.018983925	0.879296103	0.7217225	0.746493663
40～64 歳 70 歳以上	P 値	0.334281943	0.825935759	0.422174285	0.072542487	0.29285714	0.428219162	0.094102312
40～64 歳 75 歳以上	P 値	0.264296066	0.998128466	0.537214882	0.454599595	0.245828645	0.285570019	0.11732629
65～69 歳 70 歳以上	P 値	0.368846292	0.088988008	#DIV/0!	0.990871501	0.513146044	0.809838008	0.31509415
65～69 歳 75 歳以上	P 値	0.299689948	0.189646938	#DIV/0!	0.745352378	0.399483265	0.606238382	0.310321456

表 5-6-2 年齢別・透析歴別集計結果 一病院・診療所計一透析歴10年未満計一TTEST=P値一

		うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
40歳未満								
40～64歳	P値	0.819938729	0.895265931	#DIV/0!	#DIV/0!	0.556075921	0.16717399	0.129849419
40歳未満								
65～69歳	P値	0.334883646	0.986195683	#DIV/0!	#DIV/0!	0.447043345	0.212828128	0.303937936
40歳未満								
70歳以上	P値	0.871436651	0.60194109	#DIV/0!	#DIV/0!	0.536323958	0.381130064	0.369216317
40歳未満								
75歳以上	P値	0.900254948	0.4776618	#DIV/0!	#DIV/0!	0.435457539	0.429128714	0.477073607
40～64歳								
65～69歳	P値	0.491244681	0.873109531	0.240939862	0.287496023	0.843316982	0.998310583	0.366758696
40～64歳								
70歳以上	P値	0.488658811	0.418059243	0.844579912	0.437078069	0.973932636	0.301791558	0.108281551
40～64歳								
75歳以上	P値	0.699374535	0.292870626	#DIV/0!	0.398984724	0.502452615	0.373459839	0.113434538
65～69歳								
70歳以上	P値	0.207829862	0.483492977	0.170585922	0.976858291	0.868057333	0.46056725	0.737782936
65～69歳								
75歳以上	P値	0.123103322	0.359552186	#DIV/0!	0.821669245	0.72547989	0.492966677	0.574584079
		うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
40歳未満								
40～64歳	P値	0.263219017	0.49276812	0.283556341	0.6744335	0.086812649	0.148020244	#DIV/0!
40歳未満								
65～69歳	P値	0.579251603	0.863723096	0.254208707	0.07211503	0.011239321	0.070810834	#DIV/0!
40歳未満								
70歳以上	P値	0.36956885	0.422266006	0.751026686	0.311011506	0.015833283	0.136427974	#DIV/0!
40歳未満								
75歳以上	P値	0.664182456	0.427170178	0.514089363	0.415959309	0.013424127	0.140374459	#DIV/0!
40～64歳								
65～69歳	P値	0.031352573	0.201814465	0.764174258	0.075983241	0.027916495	0.455135918	#DIV/0!
40～64歳								
70歳以上	P値	0.756774812	0.996104957	0.171220315	0.327588199	0.146893134	0.863800981	#DIV/0!
40～64歳								
75歳以上	P値	0.677839849	0.874379954	0.609970866	0.475384071	0.095288741	0.835467654	#DIV/0!
65～69歳								
70歳以上	P値	0.113778273	0.126908525	0.215080628	0.150166136	0.306727376	0.567778351	#DIV/0!
65～69歳								
75歳以上	P値	0.314584096	0.135224622	0.522453317	0.192836734	0.575281356	0.636300177	#DIV/0!
		請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
40歳未満								
40～64歳	P値	0.182030779	1.56979E-05	0.051933744	0.000181336	1.31188E-05	0.01127332	0.000204954
40歳未満								
65～69歳	P値	0.000106181	7.204E-10	2.43378E-06	3.72583E-08	5.84078E-10	3.1078E-08	4.21293E-08
40歳未満								
70歳以上	P値	1.34257E-08	1.20901E-11	4.45435E-11	7.74526E-10	1.49196E-12	1.21111E-16	2.2087E-10
40歳未満								
75歳以上	P値	7.69119E-08	1.35465E-10	5.77566E-10	4.52401E-09	2.01624E-11	1.475E-15	1.46783E-09
40～64歳								
65～69歳	P値	7.61162E-05	0.000420359	1.56436E-05	0.001033134	0.000141575	9.63766E-07	0.000395925
40～64歳								
70歳以上	P値	6.81495E-15	1.44105E-07	2.29223E-16	3.58811E-07	5.17163E-08	2.30517E-22	1.44586E-07
40～64歳								
75歳以上	P値	5.53065E-11	7.43995E-06	6.75913E-12	1.17175E-05	7.92973E-06	9.41094E-17	1.3146E-05
65～69歳								
70歳以上	P値	0.057484612	0.621922388	0.062386302	0.549888399	0.755494598	0.016142975	0.66838013
65～69歳								
75歳以上	P値	0.068436282	0.595516887	0.076957749	0.512633685	0.814779954	0.014362507	0.710634425
		除夜障手在						
40歳未満								
40～64歳	P値	0.003774892						
40歳未満								
65～69歳	P値	2.16636E-06						
40歳未満								
70歳以上	P値	6.15962E-09						
40歳未満								
75歳以上	P値	9.92552E-09						
40～64歳								
65～69歳	P値	0.000692296						
40～64歳								
70歳以上	P値	1.04046E-08						
40～64歳								
75歳以上	P値	2.76587E-07						
65～69歳								
70歳以上	P値	0.361952795						
65～69歳								
75歳以上	P値	0.265563575						

表 5-12-1 年齢別・透析歴別集計結果 一病院・診療所計一透析歴 10~14 年一TTEST=P 値一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
40 歳未満 40~64 歳	P 値	5.5421E-161	0.050639643	0.604140962	0.616007539	#DIV/0!	#DIV/0!
40 歳未満 65~69 歳	P 値	2.7905E-233	0.982672177	0.711024898	0.011438459	#DIV/0!	0.517327519
40 歳未満 70 歳以上	P 値	1.8913E-242	0.925760328	0.639314077	0.212948221	#DIV/0!	0.3966372
40 歳未満 75 歳以上	P 値	7.2433E-188	0.758712288	0.518095252	0.470698176	#DIV/0!	0.383075884
40~64 歳 65~69 歳	P 値	1.3273E-113	0.017961402	0.999798877	0.00175001	#DIV/0!	0.075079919
40~64 歳 70 歳以上	P 値	1.4596E-266	0.009834539	0.922666325	0.211009944	#DIV/0!	0.020311852
40~64 歳 75 歳以上	P 値	8.9918E-215	0.102027604	0.568263079	0.672151432	#DIV/0!	0.015698849
65~69 歳 70 歳以上	P 値	8.85796E-81	0.933646224	0.942321487	0.09792526	#DIV/0!	0.667350937
65~69 歳 75 歳以上	P 値	1.772E-123	0.743112028	0.639461883	0.075694706	#DIV/0!	0.666560507
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
40 歳未満 40~64 歳	P 値	0.300015243	#DIV/0!	0.034617368	0.64485316	0.219211855	0.004149108
40 歳未満 65~69 歳	P 値	0.755333586	#DIV/0!	0.001403912	0.754665177	0.098833349	0.07914131
40 歳未満 70 歳以上	P 値	0.650126807	#DIV/0!	0.001039071	0.872258294	0.244887542	0.155333979
40 歳未満 75 歳以上	P 値	0.93467335	#DIV/0!	0.002609453	0.726837274	0.761050633	0.640800578
40~64 歳 65~69 歳	P 値	0.503578199	#DIV/0!	0.019779438	0.416232987	0.901432061	0.301452769
40~64 歳 70 歳以上	P 値	0.603132068	#DIV/0!	0.022953701	0.966404047	0.624815942	0.073393924
40~64 歳 75 歳以上	P 値	0.252954833	#DIV/0!	0.081733727	0.27027634	0.333200058	0.026494254
65~69 歳 70 歳以上	P 値	0.891546963	#DIV/0!	0.787864937	0.656718988	0.504991049	0.626389006
65~69 歳 75 歳以上	P 値	0.691576739	#DIV/0!	0.841922969	0.873992293	0.180699828	0.24560502
	うち EPO	うち V・D ₃	40：処置	II 型(280)	II 型(275)	I 型(242)	I 型(263)
40 歳未満 40~64 歳	P 値	0.636601558	0.749024025	0.00085416	0.541990197	0.710653474	#DIV/0!
40 歳未満 65~69 歳	P 値	0.590511027	0.452046047	9.04131E-09	0.400424887	0.600512526	#DIV/0!
40 歳未満 70 歳以上	P 値	0.225318398	0.091776553	1.4645E-25	0.426273894	0.734078315	#DIV/0!
40 歳未満 75 歳以上	P 値	0.232962126	0.017107253	4.84318E-18	0.226155169	0.663800288	#DIV/0!
40~64 歳 65~69 歳	P 値	0.843084275	0.183957588	6.9814E-05	0.557259518	0.557944402	#DIV/0!
40~64 歳 70 歳以上	P 値	0.197303351	0.017696979	3.24759E-19	0.734448039	0.469755348	#DIV/0!
40~64 歳 75 歳以上	P 値	0.252586221	0.006082828	1.32409E-11	0.274659311	0.685415785	#DIV/0!
65~69 歳 70 歳以上	P 値	0.445250224	0.414480227	9.06634E-05	0.410908675	0.204549245	#DIV/0!
65~69 歳 75 歳以上	P 値	0.443944144	0.08130878	0.000802174	0.176195326	0.377267206	#DIV/0!
	特定積層型	ダイヤ計	4~5 時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔
40 歳未満 40~64 歳	P 値	#DIV/0!	0.412856564	#DIV/0!	0.627045647	0.755108701	0.499016405
40 歳未満 65~69 歳	P 値	#DIV/0!	0.306960043	#DIV/0!	0.575342363	0.526888697	0.39237921
40 歳未満 70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.366805973	#DIV/0!	0.872333192	#DIV/0!	0.435970067
40 歳未満 75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.665369824	#DIV/0!	0.512069453	#DIV/0!	0.513258371
40~64 歳 65~69 歳	P 値	#DIV/0!	0.232897981	#DIV/0!	0.229289479	0.304586932	0.979188222
40~64 歳 70 歳以上	P 値	0.699315467	0.581219871	#DIV/0!	0.942317776	0.484644768	0.372692244
40~64 歳 75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.67351227	#DIV/0!	0.560937747	0.610155894	0.431310933
65~69 歳 70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.210893785	#DIV/0!	0.620407166	0.151404251	0.272011892
65~69 歳 75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.471800364	#DIV/0!	0.423584445	0.297374295	0.318652033

表5-12-2 年齢別・透析歴別集計結果 一病院・診療所計—透析歴10～14年—TTEST=P値—

		うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
40歳未満								
40～64歳	P値	#DIV/0!	0.968971504	#DIV/0!	#DIV/0!	0.039634636	0.897628675	0.124543798
40歳未満								
65～69歳	P値	#DIV/0!	0.940008818	#DIV/0!	#DIV/0!	0.562118713	0.760470782	0.074632091
40歳未満								
70歳以上	P値	#DIV/0!	0.995561937	#DIV/0!	#DIV/0!	0.6226587	0.55348394	0.061942668
40歳未満								
75歳以上	P値	#DIV/0!	0.43706927	#DIV/0!	#DIV/0!	0.29806533	0.951493608	0.224941886
40～64歳								
65～69歳	P値	#DIV/0!	0.879858261	#DIV/0!	#DIV/0!	0.091656959	0.553103135	0.550999796
40～64歳								
70歳以上	P値	#DIV/0!	0.947332571	#DIV/0!	#DIV/0!	0.079899723	0.300638949	0.67498447
40～64歳								
75歳以上	P値	#DIV/0!	0.347890079	#DIV/0!	#DIV/0!	0.487830213	0.83834441	0.955155417
65～69歳								
70歳以上	P値	#DIV/0!	0.926937177	#DIV/0!	#DIV/0!	0.388306607	0.804463822	0.813866823
65～69歳								
75歳以上	P値	#DIV/0!	0.431554015	#DIV/0!	#DIV/0!	0.536813018	0.816918612	0.638640712
		うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
40歳未満								
40～64歳	P値	0.261127147	0.523356595	0.442619088	0.493809118	0.226244032	0.332134732	#DIV/0!
40歳未満								
65～69歳	P値	0.150969575	0.146221106	0.784164634	0.165728848	0.028610826	0.034101069	#DIV/0!
40歳未満								
70歳以上	P値	0.145846083	0.222443201	0.699134616	0.408690007	0.043117704	0.087292277	#DIV/0!
40歳未満								
75歳以上	P値	0.388393567	0.137973076	0.754724318	0.355386856	0.025117535	0.079271703	#DIV/0!
40～64歳								
65～69歳	P値	0.534630262	0.172301448	0.578713563	0.74305901	0.260155598	0.032283526	#DIV/0!
40～64歳								
70歳以上	P値	0.55830723	0.231188053	0.635211874	0.689427895	0.024373667	0.104769969	#DIV/0!
40～64歳								
75歳以上	P値	0.910735207	0.087007142	0.691958587	0.464226368	0.00538114	0.115244407	#DIV/0!
65～69歳								
70歳以上	P値	0.934768413	0.865031405	0.914570177	0.954123484	0.471527942	0.54130923	#DIV/0!
65～69歳								
75歳以上	P値	0.733585685	0.664651284	0.953828936	0.681813514	0.188280684	0.740658549	#DIV/0!
		請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
40歳未満								
40～64歳	P値	0.517007394	0.043077106	0.412018067	0.060422675	0.048686249	0.289868474	0.069959698
40歳未満								
65～69歳	P値	0.070215676	0.029785401	0.047817459	0.036517952	0.042309676	0.023399244	0.05317523
40歳未満								
70歳以上	P値	0.002876796	0.000705718	0.000656602	0.002207616	0.000836971	0.000536498	0.002628067
40歳未満								
75歳以上	P値	0.007962652	0.001145077	0.002140925	0.003988747	0.001168143	0.002108101	0.00407275
40～64歳								
65～69歳	P値	0.083620223	0.487528039	0.082486119	0.466755898	0.512795234	0.053759127	0.490440145
40～64歳								
70歳以上	P値	0.000475822	0.010736151	0.00011283	0.025323979	0.003334351	0.000113981	0.009125672
40～64歳								
75歳以上	P値	0.010219812	0.038909789	0.003702623	0.079940605	0.013949404	0.004160262	0.033347304
65～69歳								
70歳以上	P値	0.256086695	0.211417688	0.154310315	0.315625857	0.131195433	0.214622971	0.207900643
65～69歳								
75歳以上	P値	0.363805486	0.244978572	0.22864978	0.37158384	0.146065478	0.31128117	0.239347528
		除夜障手在						
40歳未満								
40～64歳	P値	0.101335088						
40歳未満								
65～69歳	P値	0.074746734						
40歳未満								
70歳以上	P値	0.004127201						
40歳未満								
75歳以上	P値	0.006361201						
40～64歳								
65～69歳	P値	0.524879569						
40～64歳								
70歳以上	P値	0.011070922						
40～64歳								
75歳以上	P値	0.039541356						
65～69歳								
70歳以上	P値	0.203783257						
65～69歳								
75歳以上	P値	0.238540519						

表 5-18-1 年齢別・透析歴別集計結果 一病院・診療所計—透析歴 15 年以上—TTEST=P 値—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)	
40 歳未満 40～64 歳	P 値	3.438E-103	3.06266E-05	0.144086717	0.623071066	#DIV/0!	#DIV/0!	0.605545526
40 歳未満 65～69 歳	P 値	1.0184E-227	0.000263455	0.049545966	0.044814841	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40 歳未満 70 歳以上	P 値	6.8014E-174	0.051677668	0.108744001	0.154234745	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40 歳未満 75 歳以上	P 値	3.2353E-122	0.081694736	0.002715576	0.124044503	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～64 歳 65～69 歳	P 値	1.2031E-143	0.451017199	0.117021974	0.001670916	#DIV/0!	#DIV/0!	0.320521322
40～64 歳 70 歳以上	P 値	6.7149E-279	1.64897E-05	0.413920047	0.057176335	#DIV/0!	#DIV/0!	0.355573427
40～64 歳 75 歳以上	P 値	3.7357E-195	0.004820752	0.001030253	0.076903265	#DIV/0!	#DIV/0!	0.588060307
65～69 歳 70 歳以上	P 値	1.86308E-94	0.003549121	0.587642109	0.358444992	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
65～69 歳 75 歳以上	P 値	1.9446E-134	0.036323283	0.05753689	0.782587831	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
40 歳未満 40～64 歳	P 値	0.820784917	#DIV/0!	0.040156809	#DIV/0!	0.977401522	0.181892023	0.201852073
40 歳未満 65～69 歳	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.009137467	#DIV/0!	0.720623809	0.398916674	0.050917365
40 歳未満 70 歳以上	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.049326712	#DIV/0!	0.347765253	0.093098989	0.011256856
40 歳未満 75 歳以上	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.041452401	#DIV/0!	0.35839851	0.066889355	0.006165002
40～64 歳 65～69 歳	P 値	0.623642991	#DIV/0!	0.105435453	0.752385624	0.50949601	0.457522111	0.037958378
40～64 歳 70 歳以上	P 値	0.588480513	#DIV/0!	0.970420389	0.426663133	0.05226113	0.47139933	0.00717785
40～64 歳 75 歳以上	P 値	0.67861854	#DIV/0!	0.577533033	0.132124381	0.138607585	0.222149554	0.006739655
65～69 歳 70 歳以上	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.200017496	0.534038142	0.354529385	0.208583203	0.727537084
65～69 歳 75 歳以上	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.645160037	0.349261284	0.373621238	0.095219334	0.363813223
		うち EPO	うち V・D ₃	40：処置	II 型(280)	II 型(275)	I 型(242)	I 型(263)
40 歳未満 40～64 歳	P 値	0.098659865	0.637214257	0.459490688	0.687181088	0.130098433	#DIV/0!	#DIV/0!
40 歳未満 65～69 歳	P 値	0.029370539	0.559176779	9.36194E-08	0.063941004	0.039710602	#DIV/0!	#DIV/0!
40 歳未満 70 歳以上	P 値	0.005214882	0.036273543	2.92387E-18	0.747839829	0.130765414	#DIV/0!	#DIV/0!
40 歳未満 75 歳以上	P 値	0.00063626	0.003962183	1.57372E-11	0.340628756	0.055648456	#DIV/0!	#DIV/0!
40～64 歳 65～69 歳	P 値	0.150854651	0.781956253	3.01721E-13	0.469124121	0.303423165	#DIV/0!	#DIV/0!
40～64 歳 70 歳以上	P 値	0.005485944	0.029326213	4.58546E-25	0.870042224	0.876081557	#DIV/0!	#DIV/0!
40～64 歳 75 歳以上	P 値	0.000483519	0.017177138	1.12973E-12	0.707926196	0.337235466	#DIV/0!	#DIV/0!
65～69 歳 70 歳以上	P 値	0.352347908	0.117573226	0.000185294	0.259945399	0.283740097	#DIV/0!	#DIV/0!
65～69 歳 75 歳以上	P 値	0.045194324	0.045004255	0.002185531	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		特定積層型	ダイヤ計	4～5 時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔
40 歳未満 40～64 歳	P 値	#DIV/0!	0.82059153	0.82855436	0.156224679	0.85447079	0.65143998	#DIV/0!
40 歳未満 65～69 歳	P 値	#DIV/0!	0.840197023	#DIV/0!	0.668367101	0.849638313	0.465335464	#DIV/0!
40 歳未満 70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.793360113	#DIV/0!	0.928135385	#DIV/0!	0.517342794	#DIV/0!
40 歳未満 75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.907029813	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.509817088	#DIV/0!
40～64 歳 65～69 歳	P 値	#DIV/0!	0.993334109	0.68043575	0.023899692	0.852235699	0.098740291	0.823027768
40～64 歳 70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.888950934	0.684644486	0.611469741	0.340492196	0.355243583	0.113296697
40～64 歳 75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.629260412	0.793116068	#DIV/0!	0.549124922	0.604143368	0.235081829
65～69 歳 70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.921463438	#DIV/0!	0.745285819	0.321789135	0.069855055	0.09599857
65～69 歳 75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.69572228	#DIV/0!	#DIV/0!	0.5345501	0.264911587	0.224602635

表5-18-2 年齢別・透析歴別集計結果 一病院・診療所計—透析歴15年以上—TTEST=P値—

		うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
40歳未満								
40～64歳	P値	#DIV/0!	0.59761144	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.985835419	0.83821135
40歳未満								
65～69歳	P値	#DIV/0!	0.449768619	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.874833992	0.840815961
40歳未満								
70歳以上	P値	#DIV/0!	0.469814655	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.270386133	0.601248678
40歳未満								
75歳以上	P値	#DIV/0!	0.505991479	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.351601031	0.477665503
40～64歳								
65～69歳	P値	0.911816796	0.621493223	0.857835564	#DIV/0!	0.936326793	0.749107109	0.410165264
40～64歳								
70歳以上	P値	0.229148755	0.025892268	#DIV/0!	#DIV/0!	0.588807237	0.001737137	0.063546393
40～64歳								
75歳以上	P値	#DIV/0!	0.111446949	#DIV/0!	#DIV/0!	0.538009632	0.147844545	0.151384156
65～69歳								
70歳以上	P値	0.488494242	0.020145494	#DIV/0!	#DIV/0!	0.546696661	0.038541748	0.411068128
65～69歳								
75歳以上	P値	#DIV/0!	0.086633222	#DIV/0!	#DIV/0!	0.45294372	0.176934633	0.354408922
		うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
40歳未満								
40～64歳	P値	0.504927137	0.985195882	0.666619595	0.977934401	0.283060194	0.218113316	#DIV/0!
40歳未満								
65～69歳	P値	0.922016798	0.684560657	0.67276691	0.468626398	0.011682212	0.009223959	#DIV/0!
40歳未満								
70歳以上	P値	0.368588436	0.644217181	0.872603702	0.652575379	0.15055181	0.15435636	#DIV/0!
40歳未満								
75歳以上	P値	0.545115606	0.945699067	0.446621876	0.721162948	0.099505825	0.098723095	#DIV/0!
40～64歳								
65～69歳	P値	0.139799225	0.639197831	0.97012103	0.52734647	0.119163633	0.067017503	#DIV/0!
40～64歳								
70歳以上	P値	0.609262073	0.624489631	0.250410944	0.798806191	0.984184444	0.989330714	#DIV/0!
40～64歳								
75歳以上	P値	0.767708408	0.970268835	0.007859099	0.896111976	0.667553913	0.536885022	#DIV/0!
65～69歳								
70歳以上	P値	0.073007179	0.984823881	0.480216071	0.530830413	0.11587971	0.098637273	#DIV/0!
65～69歳								
75歳以上	P値	0.368904934	0.689458685	0.099227693	0.565057803	0.449951926	0.526021863	#DIV/0!
		請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
40歳未満								
40～64歳	P値	0.950141574	0.190711578	0.654808041	0.458471422	0.232277803	0.501300546	0.566212083
40歳未満								
65～69歳	P値	0.257639147	0.017922167	0.075213524	0.091745253	0.029584972	0.008690703	0.16923082
40歳未満								
70歳以上	P値	0.02173399	0.001094274	0.001601263	0.013816939	0.001459237	0.001097049	0.017563033
40歳未満								
75歳以上	P値	0.091205201	0.001897902	0.018757735	0.012226689	0.002447012	0.013960875	0.015384687
40～64歳								
65～69歳	P値	0.016942672	0.005549586	0.004798921	0.018201968	0.026670232	0.000138929	0.079837931
40～64歳								
70歳以上	P値	7.41429E-05	0.000502469	7.86242E-06	0.002389726	6.99788E-05	5.40045E-06	0.000423164
40～64歳								
75歳以上	P値	0.016713848	0.00479117	0.007553771	0.009184668	0.001458931	0.006155663	0.002973854
65～69歳								
70歳以上	P値	0.219388993	0.645002112	0.202215417	0.665103776	0.181577419	0.532590257	0.182695188
65～69歳								
75歳以上	P値	0.49996548	0.472335586	0.510833385	0.450560172	0.156789251	0.84931199	0.137152254
		除夜障手在						
40歳未満								
40～64歳	P値	0.593913951						
40歳未満								
65～69歳	P値	0.177499722						
40歳未満								
70歳以上	P値	0.021922453						
40歳未満								
75歳以上	P値	0.02134956						
40～64歳								
65～69歳	P値	0.075471628						
40～64歳								
70歳以上	P値	0.000675154						
40～64歳								
75歳以上	P値	0.005676351						
65～69歳								
70歳以上	P値	0.22266667						
65～69歳								
75歳以上	P値	0.191015524						

表 6-5-1 院内・院外別処方集計結果表 一病院・診療所計—TTEST=P 値—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)	
院内外	P 値	0.182615964	0.008114915	0.192120675	1.8447E-27	0.221553516	#DIV/0!	0.107255936
院両内方	P 値	0.273528663	0.333846147	0.018660492	5.04629E-06	0.696522725	#DIV/0!	0.022673841
院な内し	P 値	0.630355876	0.114727333	0.641101774	0.04479498	0.938639326	#DIV/0!	#DIV/0!
院両外方	P 値	0.132518848	0.072102463	0.059134445	0.509070874	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000282442
院な外し	P 値	0.55698302	0.077672817	0.560091236	0.009140112	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
院両方し	P 値	0.83770301	0.173083837	0.425520681	0.018083442	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射	
院内外	P 値	0.303214391	0.300886521	2.9823E-211	3.10773E-08	#DIV/0!	3.82818E-19	0.010088282
院両内方	P 値	0.534573539	0.726370552	4.87968E-12	0.447217942	3.23259E-51	1.0817E-72	2.15514E-05
院な内し	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.860101383	#DIV/0!	#DIV/0!	0.47068674
院両外方	P 値	0.645641364	#DIV/0!	5.58264E-05	0.169012648	#DIV/0!	0.01558128	2.11722E-07
院な外し	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.582894185	#DIV/0!	#DIV/0!	0.603214451
院両方し	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.967768267	#DIV/0!	#DIV/0!	0.08995327
	うち EPO	うち DV ₃	40：処置	II 型(280)	II 型(275)	I 型(242)	I 型(263)	
院内外	P 値	0.039426003	0.377667949	1.61017E-18	0.032272413	0.196984587	#DIV/0!	0.290387608
院両内方	P 値	3.80163E-06	0.860746961	0.030901364	0.824094938	0.475039793	#DIV/0!	#DIV/0!
院な内し	P 値	0.649922553	0.344058769	0.826747379	0.805783553	0.75085405	#DIV/0!	#DIV/0!
院両外方	P 値	7.08899E-08	0.625560266	0.414958055	0.523094107	0.737338106	#DIV/0!	#DIV/0!
院な外し	P 値	0.769895924	0.410272117	0.367867729	0.873585646	0.816031407	#DIV/0!	#DIV/0!
院両方し	P 値	0.137330951	0.422518331	0.467290072	0.850567458	0.780303508	#DIV/0!	#DIV/0!
	特定積層型	ダイア計	4～5 時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	
院内外	P 値	0.07559028	0.003537637	0.3767849	0.035178712	0.001753843	0.067488414	0.015008747
院両内方	P 値	#DIV/0!	0.337397612	0.808838241	0.751118987	0.24072985	0.655613687	0.083227022
院な内し	P 値	#DIV/0!	0.77280687	0.951336738	0.354855215	0.77805723	0.815261922	#DIV/0!
院両外方	P 値	#DIV/0!	0.138170418	#DIV/0!	0.675111377	0.628585983	0.77973085	0.648027139
院な外し	P 値	#DIV/0!	0.684351607	#DIV/0!	0.230901144	0.907510878	0.766732855	#DIV/0!
院両方し	P 値	#DIV/0!	0.608145359	#DIV/0!	0.296278523	#DIV/0!	0.776780425	#DIV/0!

表 6-5-2 院内・院外別処方集計結果表 一病院・診療所計—TTEST=P 値—

		うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	
院内	内外	P 値	0.503375075	0.261949125	0.538808899	0.291677489	0.551470816	5.47743E-08	1.03874E-16
院内	内方	P 値	0.362983571	0.871082032	#DIV/0!	#DIV/0!	0.189424165	7.91359E-05	0.000202741
院内	内し	P 値	#DIV/0!	0.237516113	#DIV/0!	#DIV/0!	0.858812748	0.409335054	#DIV/0!
院内	外方	P 値	0.331280109	0.78667278	#DIV/0!	#DIV/0!	0.272998037	0.112164859	0.581830441
院内	外し	P 値	#DIV/0!	0.273552755	#DIV/0!	#DIV/0!	0.803104177	0.298783362	#DIV/0!
院内	方し	P 値	#DIV/0!	0.272379667	#DIV/0!	#DIV/0!	0.786007718	0.228473378	#DIV/0!
			うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
院内	内外	P 値	0.300539008	5.1942E-08	0.000778976	0.004456393	1.64696E-33	#DIV/0!	#DIV/0!
院内	内方	P 値	0.058160714	0.929691632	0.47513318	0.831749314	5.30264E-12	#DIV/0!	#DIV/0!
院内	内し	P 値	0.552359674	0.930108316	0.136511605	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
院内	外方	P 値	0.325257051	0.16828002	0.630487655	0.372046716	0.000432652	3.16405E-08	#DIV/0!
院内	外し	P 値	0.640106669	0.74952359	0.260620044	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
院内	方し	P 値	0.595773586	0.932753502	0.238310858	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
院内	内外	P 値	4.88717E-22	1.04454E-54	1.13739E-23	7.18595E-60	6.52445E-77	2.03109E-32	5.84091E-85
院内	内方	P 値	0.237975225	0.985321253	0.301592576	0.867657215	0.644979095	0.493072395	0.495588189
院内	内し	P 値	0.02626312	0.017091511	0.023348916	0.013380782	0.012049192	0.019115547	0.008871422
院内	外方	P 値	2.07408E-05	2.602E-07	2.25257E-05	1.83575E-07	1.76196E-09	3.26215E-06	8.17792E-10
院内	外し	P 値	0.174847255	0.299724634	0.170600729	0.28837383	0.305160451	0.175364272	0.290434377
院内	方し	P 値	0.032158201	0.036550166	0.032865053	0.034935493	0.01620242	0.016877814	0.015090869
			除夜障手在						
院内	内外	P 値	2.54452E-82						
院内	内方	P 値	0.499771569						
院内	内し	P 値	0.006181885						
院内	外方	P 値	1.75919E-09						
院内	外し	P 値	0.227111259						
院内	方し	P 値	0.010028291						

表 8-11-1 DM・非 DM 別集計結果 —TTEST=P 値—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
病院・診療所計 D M 非 DM P 値	2.49459E-07	1.50961E-56	0.768121582	8.13831E-26	0.046658443	#DIV/0!	0.615392241
病院 1・2 計 D M 非 DM P 値	0.001626274	2.53283E-30	0.160532516	0.013938218	0.007136775	#DIV/0!	#DIV/0!
病院 1 D M 非 DM P 値	0.00026673	4.31114E-26	0.077176193	0.009620925	0.00853678	#DIV/0!	#DIV/0!
病院 2 D M 非 DM P 値	0.838256224	9.35519E-06	0.838542484	0.867395468	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
診療所 D M 非 DM P 値	6.51292E-05	1.36131E-27	2.00778E-08	1.1818E-26	0.782634074	#DIV/0!	0.615392241
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
病院・診療所計 D M 非 DM P 値	0.770352962	#DIV/0!	0.029768299	#DIV/0!	4.71594E-05	8.35452E-08	0.063468573
病院 1・2 計 D M 非 DM P 値	0.770352962	#DIV/0!	0.016949421	#DIV/0!	0.06376529	0.000142913	0.698996908
病院 1 D M 非 DM P 値	0.770352962	#DIV/0!	0.030713897	#DIV/0!	0.212690981	0.000347105	0.705630038
病院 2 D M 非 DM P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.380782691	#DIV/0!	0.054738212	0.168633766	0.886109918
診療所 D M 非 DM P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.260366166	#DIV/0!	6.45959E-05	0.000143715	0.045348687
	うち EPO	うち V・D ₃	40：処置	II 型(280)	II 型(275)	I 型(242)	I 型(263)
病院・診療所計 D M 非 DM P 値	0.65033179	0.025201775	0.883187429	0.513447674	0.215964559	#DIV/0!	#DIV/0!
病院 1・2 計 D M 非 DM P 値	0.52903961	0.3936573	0.509620051	0.186995039	0.23445344	#DIV/0!	#DIV/0!
病院 1 D M 非 DM P 値	0.92538477	0.511400461	0.626520096	0.338232741	0.556912562	#DIV/0!	#DIV/0!
病院 2 D M 非 DM P 値	0.230456455	0.545572379	0.003231663	0.325168375	0.250548229	#DIV/0!	#DIV/0!
診療所 D M 非 DM P 値	0.783616449	0.030005111	0.537786658	0.38365974	0.601954363	#DIV/0!	#DIV/0!
	特定積層型	ダイア計	4～5 時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔
病院・診療所計 D M 非 DM P 値	0.605960833	0.705323969	0.705776435	0.675155082	8.79108E-08	0.172221588	0.195332503
病院 1・2 計 D M 非 DM P 値	#DIV/0!	0.128334694	0.690142112	0.627701851	0.050243526	0.417818012	0.0331733
病院 1 D M 非 DM P 値	#DIV/0!	0.173152859	#DIV/0!	0.540144504	0.004292679	0.192418017	0.00716
病院 2 D M 非 DM P 値	#DIV/0!	0.463745675	0.685337647	0.733686839	0.200838636	0.424132139	#DIV/0!
診療所 D M 非 DM P 値	0.724813718	0.564155884	#DIV/0!	0.248845286	1.08336E-07	0.279839583	0.442353759

表 8-11-2 DM・非DM 別集計結果 —TTEST=P 値—

	うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
病院・診療所計 D M 非DM P 値	0.922002718	0.076516375	0.097342727	0.971960375	0.000260195	0.781545617	0.670269606
病院1・2計 D M 非DM P 値	#DIV/0!	0.758816726	#DIV/0!	#DIV/0!	0.012016344	0.73461009	0.534553573
病院1 D M 非DM P 値	#DIV/0!	0.99331987	#DIV/0!	#DIV/0!	0.009085644	0.600655624	0.585686364
病院2 D M 非DM P 値	#DIV/0!	0.620388725	#DIV/0!	#DIV/0!	0.454298754	0.742489347	0.76967615
診療所 D M 非DM P 値	0.776085298	0.025121309	#DIV/0!	#DIV/0!	0.002038511	0.843160209	0.921605929
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
病院・診療所計 D M 非DM P 値	0.24642178	0.012911227	0.007566059	0.151140802	0.639721209	0.560216396	#DIV/0!
病院1・2計 D M 非DM P 値	0.855226711	0.434043476	0.102626968	0.560132417	0.529357481	0.526544361	#DIV/0!
病院1 D M 非DM P 値	0.627861766	0.890389129	0.163443548	0.340086048	0.646461323	0.569111424	#DIV/0!
病院2 D M 非DM P 値	0.109152355	0.105839046	0.325175045	0.174155396	0.703208455	0.417850099	#DIV/0!
診療所 D M 非DM P 値	0.071381591	0.013566025	0.488052304	0.004479704	0.051713345	0.064665425	#DIV/0!
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜間手
病院・診療所計 D M 非DM P 値	2.70663E-38	4.71331E-97	4.60618E-15	1.69484E-53	5.239E-113	8.05288E-15	7.39281E-61
病院1・2計 D M 非DM P 値	2.13241E-17	2.85479E-38	6.17659E-07	4.6963E-20	3.00077E-47	4.31081E-07	6.27207E-24
病院1 D M 非DM P 値	1.32767E-12	4.03704E-30	2.59734E-05	8.05256E-17	6.0552E-35	8.89261E-05	1.69025E-18
病院2 D M 非DM P 値	8.11027E-07	7.26699E-10	0.004684182	0.000125655	8.52544E-15	0.000297876	3.92403E-07
診療所 D M 非DM P 値	4.42299E-22	3.74752E-62	2.45163E-09	1.96304E-36	1.72649E-67	6.38082E-09	6.9831E-39
	除夜間手在						
病院・診療所計 D M 非DM P 値	5.71105E-06						
病院1・2計 D M 非DM P 値	0.049062867						
病院1 D M 非DM P 値	0.074793928						
病院2 D M 非DM P 値	0.404915826						
診療所 D M 非DM P 値	2.10397E-05						