

# 第10回透析医療費実態調査報告

— レセプト調査からみた透析医療診療報酬の変遷を含めて —

杉崎弘章<sup>\*1,2</sup> 太田圭洋<sup>\*1,2</sup> 大平整爾<sup>\*1,2</sup> 小野山攻<sup>\*1,2</sup> 隈 博政<sup>\*1,2</sup> 鈴木正司<sup>\*1,2</sup>  
 山川智之<sup>\*1,2</sup> 吉田豊彦<sup>\*1,2</sup> 鈴木 満<sup>\*1</sup> 小野利彦<sup>\*1</sup> 戸澤修平<sup>\*1</sup> 宮本 孝<sup>\*1</sup>  
 山崎親雄<sup>\*2</sup>

## 要 旨

1997年から始まった透析医療費実態調査も今年で10回目を迎えた。この調査結果は厚生労働省へ提出する要望書の裏づけになっている。前年同様ほとんど全国を網羅する41都道府県の185施設、8,821件のレセプトを分析することができた。

今年度は大幅な診療報酬の改定が実施され透析施設の経営に大きく影響した。①人工腎臓手技料が1,960点から2,250点へ290点増加をしたものの、エリスロポエチン（以下EPOと略）が包括化された、②夜間休日加算が500点から300点へ200減点、③管理指導料（慢透）が2,460点から2,305点へ155減点、④特定治療材料のダイアライザが5区分より11区分へ細分類され、減点となった。その結果、1回の透析医療費は3,166点より3,065点へ101点（3.2%）の減点となった。これは透析医療施設の経営をさらに悪化させ、質の維持を一層困難とする要因となった。

## 1 はじめに

レセプトの定点観測も第10回目となり、会員諸兄のご協力により、北海道285件、青森258、岩手281、宮城242、山形179、福島68、栃木126、群馬62、埼玉86、千葉525、東京199、神奈川48、新潟328、富山76、福井77、山梨61、長野874、岐阜93、静岡286、愛知880、三重175、京都293、大阪261、兵庫171、奈良52、和歌山117、鳥取10、島根44、岡山324、広島279、山口42、徳島256、香川214、高知174、

福岡196、佐賀218、熊本612、長崎95、大分86、宮崎193、鹿児島106と41都道府県の8,952件の回答をいただいた。

調査対象は、①慢性維持透析患者外来医学管理料（慢透）を算定していること、②6月に月水金（昼・夜などすべてのシフト）で月13回の透析を実施している患者であること、③HDFやリクセル使用の患者は対象外とすることの条件下に分析したが、処置点数、ダイアライザの回数などレセプト上の不備があったものが131件あり、有効回答数は8,821件となった。内訳は病院3,980件、診療所4,841件、平均年齢61.4歳、透析歴9.0年であった。

なお、本報告は紙面の都合上すべての集計結果を掲載できないため、表の番号が続いていない部分があることをご了解いただきたい。また、透析医療費、慢性維持透析患者外来医学管理料（慢透）の変遷について一覧表にまとめたので、医療費の変動などについて参考にしていきたい。

## 2 集計結果

- 1) 病院・診療所別集計結果（表1-1、1-2、1-3、1-4、1-8）
- 病院と診療所の平均請求点数は39,843.1点、前年度41,160.8点に比し▲1,317.7点（3.2%）の減点であった。
- 請求合計を100%とすると、処置（40）は84.5%（前年75.8%）で一番高く、次いでダイアライザ計が7.5%（前年8.9%）、指導（13）が6.3%（前年

6.4%)であった。処置が増加したのはEPOが技術料に包括されたためと考えられる。

- 処置(40)は33,668点、前年31,193点と比べると2,475点の増加。しかしダイアライザ計は2,998点、前年度が3,659点で661点の減点であった。これは包括されたEPO分のほぼ30%にあたるマイナスである。
- ダイアライザの使用区分については、I型(1.5m<sup>2</sup>未満:以下小とする)191人(2.1%)、I型(1.5m<sup>2</sup>以上:以下大とする)65人(0.7%)、II型(小)252人(2.8%)、II型(大)591人(6.5%)、III型(小)174人(1.9%)、III型(大)1,939人(21.3%)、IV型(小)1,103人(12.1%)、IV型(大)4,505人(49.4%)、V型(小)27人(0.3%)、V型(大)275人(3.0%)、特定積層型79人(0.9%)であった。前年度はI型(小)103人(1.1%)、I型(大)8人(0.1%)、II型(小)1,789人(19.7%)、II型(大)7,152人(78.6%)、特定積層型52人(0.6%)であった。前年度を基準にして移行状況を見ると「I型(小)⇒I型(小)」は1.1%⇒2.1%、「I型(大)⇒I型(大)」は0.1%⇒0.7%とI型は面積の有無にかかわらず増加傾向。「II型(小)⇒II型(小)、III型(小)、IV型(小)、V型(小)」は19.7%⇒17.1%、「II型(大)⇒II型(大)、III型(大)、IV型(大)、V型(大)」は78.6%⇒80.2%と面積の大きいダイアライザへ移行している傾向を認めた。「積層型⇒積層型」は0.6%⇒0.9%でやや増加傾向を認めた。
- 夜間加算については、2,510人で全体の28.5%、前年度は2,627人で全体の28.9%とほとんど変わりがなかった。平均点数は3,479点、前年度5,787点と比べ▲2,308点は大きいマイナスである。
- 障害加算については、1,952人で全体の22.1%、前年度は1,900人で20.9%と僅かに増加していた。
- 病院と診療所を比較してみると、患者の平均年齢は病院61.5歳、診療所61.3歳と有意差はない。透析歴は病院8.7年<診療所9.3年で有意に診療所のほうが長い。これは病院が透析を導入して、維持透析が長期化するに従って診療所へ移っている傾向を示すものであろう。
- 平均請求点数は病院39,804点、診療所39,875点で有意差はない。

- 指導(13)では、病院2,422点<診療所2,510点と診療所が有意に高い。
- 投薬(20)では、病院1,967点<診療所2,087点と診療所が有意に高い。
- 処置(40)では、病院33,589点<診療所33,758点と診療所が有意に高い。  
処置の中で夜間加算については、病院3,458点<診療所3,494点と診療所が高い傾向を認めるが有意差はない。
- 検査(60)では、病院370点>診療所343点と病院が有意に高い。
- 画像(70)では、病院317点>診療所87点と病院が有意に高い。

## 2) 男女別集計結果(表2-1, 2-2, 2-3)

- 男性5,634例、女性3,187例を集計。年齢は男性60.8歳<女性62.5歳、透析歴は男性8.8年<女性9.5年と女性が高い。
- 請求合計は男性40,246点>女性39,129点で有意に男性が高い。

請求合計に関与した因子としては処置(40)が考えられる。男性34,006点>女性33,071点と有意に男性が高く、夜間加算とダイアライザ計が関与したものと考えられる。男性の夜間透析が多いこと、体重も女性より大きいことからダイアライザの大きい面積が選ばれていることが推測された。

もう一つの要因として投薬(20)があげられるが、男性2,096点>女性1,911点。男性の方が年齢が若く、透析歴が短いことが関与したものと考えられる。それは年齢別透析歴別集計による透析歴10年未満の投薬は40歳未満:2,139点、40~64歳:2,101点、65~69歳:2,053点、75歳以上1,904点から推測された(表5-1, 5-2, 5-3, 5-4)。

## 3) 年齢別集計結果(表3-2, 3-5, 3-7-1, 3-7-2)

- 年齢の分布は40歳未満481人(5.5%)、40~64歳4,675人(53.0%)、65~69歳1,275人(14.5%)、70~74歳1,010人(11.5%)、75歳以上1,379人(15.6%)であった。この40~60歳(成年層と呼ぶ)と75歳以上(後期高齢者層と呼ぶ)を比較して後期高齢者の問題点を抽出する。
- 請求合計点数については、40歳未満:40,700点、

40～64歳（成年層）：40,219点，65～69歳：39,748点，70歳以上：38,987点，うち75歳以上（後期高齢者層）：38,788点と加齢と共に有意に下がっている。

- 成年層と後期高齢者層で有意差を認めた項目は、指導（13）、投薬（20）、注射（特にVD3）、処置（40）そのうちのダイアライザ計、夜間加算である。
- 指導（13）は後期高齢者層2,523点に対し成年層2,496点と後期高齢者層が多い。
- 投薬（20）については後期高齢者層が1,838点に対し成年層2,065点と成年層の方が有意に多い。
- 注射（30）については後期高齢者層が1,169点，成年層1,272点で，VD3に限定すると，後期高齢者が1,939点，成年層2,187点で有意に成年層が多い。
- 処置（40）については後期高齢者層32,750点に対し成年層34,075点と有意に成年層が多い。夜間加算については，後期高齢者層の夜間が37人（2.7%）に対し成年層1,895人（40.5%）と有意に成年層が多い。

ダイアライザは後期高齢者2,920点に対し成年層3,036点と有意に成年層が多い。ダイアライザの使用頻度について，後期高齢者層：成年層で比較すると，I型（小）=7.4%：0.6%，I型（大）=2.3%：0.4%，II型（小）=5.7%：1.6%，II型（大）=8.0%：5.8%，III型（小）=4.7%：1.0%，III型（大）=17.7%：22.4%，IV型（小）=22.3%：8.0%，IV型（大）=30.4%：54.9%，V型（小）=0.4%：0.2%，V型（大）=0.6%：4.0%，積層型=0.7%：1.0%であった。後期高齢者層は低機能のI型，膜面積の小さいダイアライザが比較的使用されていることがこの有意差を生じた理由と考えられる。

- 結論として，後期高齢者層と成年層の比較は，請求合計点数は有意に成年層が多いが，夜間加算を除くと後期高齢者層38,703点に対し成年層38,804点となり有意差を認めない（除夜間）。したがって，一部の項目に有意差を認めたが，全体とすればかかっている医療費に大きな差はない。

#### 4) 透析歴別集計結果（表4-1，4-3，4-5-1，4-5-2）

- 10年未満群（集計数5,489人，全体の62.4%，年齢62.5歳，透析歴4.1年）は請求合計39,536点，

15年以上群（1,846人，21.0%，年齢59.4歳，透析歴21.3年）は40,542点，両群間に有意差を認めた。したがって透析歴が長くなると請求合計が高くなることが言える。

この要因は，注射（30）のうちVD3，処置（40）特にダイアライザ計，検査（60）が関与しているものと考えられる。透析歴の長期化により骨代謝の治療のVD3投与，リン除去目的でダイアライザ面積の拡大，骨マーカーの検査が増えたものと推察される。

#### 5) 年齢別透析歴別集計結果

- 透析歴10年未満の比較（表5-1，5-2，5-3，5-4，5-5，5-7-1，5-7-2）

請求合計は，40歳未満40,634点，40～64歳（成年層）39,992点，65～69歳39,364点，70歳以上38,730点，75歳以上（後期高齢者層）38,606点で，10年未満ではすべての群間に有意差を認めた。

処置（40）ですべての群間に有意差を認めたが，そのうちの夜間・障害加算，ダイアライザ計に有意差を認めたものもあるが，一定の傾向は認めなかった。

- 透析歴10～14年の比較（表5-13-1，5-13-2）

請求合計は，40歳未満41,105点，成年層40,231点，65～69歳40,161点，70歳以上39,464点，後期高齢者層39,163点であった。「40歳未満対成年層，70歳以上，後期高齢者層」に，「成年層対70歳以上，後期高齢者層」に，さらに「65～69歳と後期高齢者層」に有意差を認めた。

処置（40）で同様にすべての有意差を認めたが，そのうちの夜間・障害加算，ダイアライザに一定の傾向は認めなかった。

- 透析歴15年以上の比較（表5-19-1，5-19-2）

請求合計は，40歳未満40,402点，成年層40,693点，65～69歳40,570点，70歳以上39,926点，後期高齢者層39,666点で，透析歴が15年以上と長期化すると必ずしも若年者が高いとはいえない。群間で有意差を認めたのは「成年層と70歳以上」，「成年層と後期高齢者層」と「65～69歳と後期高齢者層」であった。

その群間は処置（40）でも有意差を認めたが，そのうち夜間・障害加算，ダイアライザ計に有意差を

認めたものもあるが、一定の傾向を認めなかった。

- 以上、透析歴10年未満、10～14年、15年以上と分けて年齢層を分析すると、「成年層と70歳以上」、「成年層と後期高齢者層」、「65～69歳と後期高齢者層」がすべての透析歴で有意差を認めた。

#### 6) 院内・院外別処方集計結果(表6-1, 6-2)

- 院内処方4,838例(55.0%)、院外処方3,621例(41.1%)、両方332例(3.7%)、なし30例(0.3%)を集計。
- 院内と院外を比較。請求合計、投薬には当然有意差を認めた。

請求合計は院内処方群40,711点>院外処方群38,757点で1,954点の差、投薬(20)処方(25)院内処方は院内処方群2,397点>院外処方群329点で両群間の差は2,068点。この投薬・処方2,068点の差が請求合計では、114点に縮小していた。

#### 7) DM・NDM別集計結果(表8-1, 8-2)

- DM835例(全例の9.5%、年齢63.2歳、透析歴5.0年)非DM7,986例(90.5%、年齢61.2歳、透析歴9.5年)を集計。
- 請求合計はDM42,050点、非DM39,612点と有意にDMが高い。
- 指導(13):DM2,397点<非DM2,522点、処方(25):DM236点>非DM219点、投薬(20):DM2,277点>非DM2,003点、処置(40):DM34,045点>非DM33,629点、障害加算:DM1,544点<非DM1,557点、検査:DM277点<非DM368点、除夜間障害:DM40,349点>非DM38,317点と有意差を認めた。したがって、DMの請求合計が高いのは処方、投薬が関与したものと考えられる。
- なお、成年層と後期高齢者層にDMの占める割合は、成年層4,675人中423人(9.1%)、後期高齢者層1,379人中130人(9.4%)とほとんど差はなく、請求合計に関与したとは考えられない。

### 3 透析医療診療報酬の変遷

表A(pp.60-61)に昭和42年12月より人工腎臓が保険適用となってから現在までの「透析点数の変遷」をまとめた。透析時間を5時間未満、5時間以上、9時間以上と分類し技術料に差をもうけたり、午後1時

以降開始加算、午後5時以降開始加算、透析食+管理加算、水処理加算、除水調整器加算、滅菌加算などをつけたりして、良質な透析治療の普及を誘導した。その後、平成6年より水処理加算を、平成9年より除水調整器加算を技術料に上乘せし包括化、最終的には平成14年より透析食加算を撤廃し、時間区分廃止に伴う大幅な透析医療費削減を実施した。

表Bは「慢性維持透析患者外来医学管理料」の変遷をまとめたものであるが、腎疾患に必要なものをほとんど包括している。ただ平成18年度にはヘモグロビンA<sub>1c</sub>が包括から削除され、出来高請求となった。増加する糖尿病対策として、慢性維持透析患者外来医学管理料以外にもあった包括検査からはずすことにより、検査の実施を促す意図があったと考える。

表Cに第1回から10回までの集計結果の一覧表を示す。2006年度は透析医療費/回が前年度の3,166.2点から3,064.9点と3.2%減額、ダイアライザの差益幅も少なくなり、大変な経営努力を促されている。

昨年の改定後の会員アンケート調査によると、収益減にたいする消極的対応として、1番目がダイアライザの変更・採用の見直し、2番目が医療材料・薬剤等の納入価格の引き下げ、3番目がEPO使用料の削減、次が人件費の削減、後発医療品の利用、給与体系の見直しの順であった。一方、積極的対応として、患者数の増加、送迎等の患者サービスの新規開始・増加、透析クール数の増加、透析時間の延長などとなっており、経営の改善、効率化に取り組んでおられることが分かった。経営困窮の実態が浮き彫りとなった。

### 4 おわりに

繰り返される透析医療費削減の中で、経営努力による良質な透析医療の提供も限界に近づいてきたようにも思える。

一方、透析医会としてもこれからの透析医療を守るために、良質な医療を提供するための医療費の確保と、経済のみを優先した透析医療の削減に歯止めをかけることに、最大限の努力を傾注したいと考えている。

生命予後に最も大きな影響を与える透析時間区分の復活あるいは長時間加算の新設、シャントPTAに対する適切な技術料の新設、緊急時のブラッドアクセスカテーテル設置料、透析液超清浄化のための加算の新設などが、具体的な要望となるであろうか。

もちろん患者の社会復帰，社会還元を考えると夜間透析加算は守るべきものであるし，障害加算についても，今後後期高齢者を含め診療報酬の分析では出てこない看護や介護量の増加を考えると，適応の拡大や，点数の増加も要望するべきであろう。

いずれにしてもこの調査は，医療側が実施するわが国外来透析医療の経済的調査としては唯一のものであり，診療報酬改定などに利用されるものであり，引き続きご協力をお願いするものである。

表1-1 病院・診療所別集計結果表 一病院・診療所計一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	8,820	8,798	8,821	8,821	2,000	164	2,088
合計	541,821	79,475.50	7,584,632	22,141,551	260,130	13,120	928,350
平均	61.43095238	9.033359855	859.8381136	2510.095341	130.065	80	444.612069
標準偏差	12.56185941	7.602920941	90.2367991	236.6796535	6.50130052	0	34.40670932
標準誤差	0.13375796	0.081056621	0.960781806	2.520008547	0.145373499	0	0.752970378
中央値(メジアン)	62	7.04	923	2435	130	80	450
最頻値(モード)	58	1.06	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	653	261	3,900	835	5,170	5,234	5,579
合計	189,777	44,979	372,790	1,529,131	1,139,257	10,629,673	7,206,819
平均	290.6232772	172.3333333	95.58717949	1831.294611	220.3591876	2030.888995	1291.776125
標準偏差	22.03905228	11.9486079	141.6428047	1316.11236	118.4342864	1377.525171	2016.438472
標準誤差	0.862454762	0.739600262	2.268100081	45.54594631	1.647146305	19.04069008	26.99645842
中央値(メジアン)	294	174	20	1571	200	1822.5	286
最頻値(モード)	294	174	10	820	168	30	52
	うちVD <sub>3</sub>	40：処置	I型(230)	I型(207)	II型(166)	II型(188)	III型(171)
標本数	1,899	8,821	191	65	252	591	174
合計	4,062,138	296,985,640	543,950	162,909	523,066	1,369,016	362,349
平均	2139.093207	33668.02403	2847.905759	2506.292308	2075.65873	2316.439932	2082.465517
標準偏差	1033.96753	1997.828893	502.5490932	457.2238826	374.4260024	456.1199322	480.0616007
標準誤差	23.72708677	21.27156185	36.36317617	56.71164293	23.58662111	18.76226694	36.39337603
中央値(メジアン)	2147	32639	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値(モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	III型(222)	IV型(224)	IV型(235)	V型(262)	V型(266)	特定積層型	ダイア計
標本数	1,939	1,103	4,505	27	275	79	8,821
合計	5,270,946	3,153,472	13,236,860	89,342	916,370	813,384	26,441,664
平均	2718.383703	2858.995467	2938.259711	3308.962963	3332.254545	10296	2997.581227
標準偏差	496.6795144	312.5325028	467.7038518	504.2192351	504.7367247	0	734.9063848
標準誤差	11.27943493	9.410385908	6.9682472	97.03703704	30.4367697	0	7.824797542
中央値(メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
最頻値(モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うちPTA
標本数	2,510	1,952	3,387	95	29	2,288	16
合計	8,732,100	3,034,800	1,273,905	282,058	69,462	280,779	372,400
平均	3478.924303	1554.713115	376.1160319	2969.031579	2395.241379	122.7180944	23275
標準偏差	967.4443773	76.85194932	2436.818876	3805.065597	3225.826513	23.52255354	10020.3111
標準誤差	19.31030548	1.739462142	41.87122353	390.3914931	599.0209452	0.491763686	2505.077775
中央値(メジアン)	3900	1560	130	2367	1500	130	23011
最頻値(モード)	3900	1560	130	3130	800	130	34821
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	19	1,168	4,430	1,996	3,374	6,941	6,786
合計	342,278	232,231	1,579,231	966,435	613,845	1,290,977	340,706
平均	18014.63158	198.827911	356.485553	484.1858717	181.9339063	185.9929405	50.20719128
標準偏差	11632.3289	962.3475921	451.5289158	580.1727778	158.7841256	530.0504123	41.056861
標準誤差	2668.639271	28.15856655	6.783966655	12.98605025	2.733597336	6.362182965	0.498400896
中央値(メジアン)	15344	104	224	350	161	60	60
最頻値(モード)	15127	104	55	150	55	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	894	3,987	3,954	0	8,821	8,821	8,821
合計	899,005	1,307,601	1,176,611	0	351,456,422	342,724,322	348,421,622
平均	1005.598434	327.96614	297.5748609	#DIV/0!	39843.14953	38853.22775	39499.1069
標準偏差	965.7014955	305.879906	177.4777399	#DIV/0!	3718.954519	3449.982537	3612.822341
標準誤差	32.29788951	4.844264304	2.822445451	65535	39.59697015	36.73313422	38.46694484
中央値(メジアン)	774.5	280	277	#NUM!	39256	38080	38848
最頻値(モード)	129	310	310	#N/A	39718	35818	39718
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	8,821	8,821	8,821	8,821	8,821	8,821	
合計	339,689,522	350,180,750	341,426,259	347,123,559	338,391,459	336,862,328	
平均	38509.18513	39698.53191	38706.07176	39351.95091	38362.02914	38188.67793	
標準偏差	3289.514877	3402.871966	3092.057964	3289.949644	2917.838683	2808.306819	
標準誤差	35.02458062	36.231532	32.92218989	35.02920974	31.06721812	29.90099521	
中央値(メジアン)	37714	39191	38025	38791	37665	37507	
最頻値(モード)	36587	39718	36269	39718	35818	35818	

表 1-2 病院・診療所別集計結果表 一病院・診療所計一最頻値(モード) データ数一

	年 齢	透析歴	再診計	13:指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	8,820	8,798	8,821	8,821	2,000	164	2,088
合 計	541,821	79,475.50	7,584,632	22,141,551	260,130	13,120	928,350
平 均	61.43095238	9.033359855	859.8381136	2510.095341	130.065	80	444.612069
最頻値(モード)	58	1.06	923	2,305	130	80	450
最頻値 データ数	357	86	4,816	2,704	1,995	164	2,038
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14:在宅	25:処方	20:投薬	30:注射
標本数	653	261	3,900	835	5,170	5,234	5,579
合 計	189,777	44,979	372,790	1,529,131	1,139,257	10,629,673	7,206,819
平 均	290.6232772	172.3333333	95.58717949	1831.294611	220.3591876	2030.888995	1291.776125
最頻値(モード)	294	174	10	820	168	30	52
最頻値 データ数	638	256	1,346	60	524	70	302
	うち VD <sub>3</sub>	40:処置	I型(230)	I型(207)	II型(166)	II型(188)	III型(171)
標本数	1,899	8,821	191	65	252	591	174
合 計	4,062,138	296,985,640	543,950	162,909	523,066	1,369,016	362,349
平 均	2139.093207	33668.02403	2847.905759	2506.292308	2075.65873	2316.439932	2082.465517
最頻値(モード)	2,223	32,305	2,990	2,691	2,158	2,444	2,223
最頻値 データ数	356	1,528	171	49	236	541	159
	III型(222)	IV型(224)	IV型(235)	V型(262)	V型(266)	特定積層型	ダイア計
標本数	1,939	1,103	4,505	27	275	79	8,821
合 計	5,270,946	3,153,472	13,236,860	89,342	916,370	813,384	26,441,664
平 均	2718.383703	2858.995467	2938.259711	3308.962963	3332.254545	10296	2997.581227
最頻値(モード)	2,886	2,912	3,055	3,406	3,458	10,296	3,055
最頻値 データ数	1,695	1,053	4,180	26	244	79	4,180
	夜 間	障 害	50:手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うち PTA
標本数	2,510	1,952	3,387	95	29	2,288	16
合 計	8,732,100	3,034,800	1,273,905	282,058	69,462	280,779	372,400
平 均	3478.924303	1554.713115	376.1160319	2969.031579	2395.241379	122.7180944	23275
最頻値(モード)	3,900	1,560	130	3,130	800	130	34,821
最頻値 データ数	1,847	1,939	1,870	26	6	1,924	2
	うちシャント	うちその他	60:検査	うち生体	うち検体	70:画像	うち胸部
標本数	19	1,168	4,430	1,996	3,374	6,941	6,786
合 計	342,278	232,231	1,579,231	966,435	613,845	1,290,977	340,706
平 均	18014.63158	198.827911	356.485553	484.1858717	181.9339063	185.9929405	50.20719128
最頻値(モード)	15,127	104	55	150	55	13	13
最頻値 データ数	2	880	663	226	884	2,451	2,682
	うち胸部ほか	80:その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	894	4,052	3,954	0	8,821	8,821	8,821
合 計	899,005	1,307,601	1,176,611	0	351,456,422	342,724,322	348,421,622
平 均	1005.598434	322.7050839	297.5748609	#DIV/0!	39843.14953	38853.22775	39499.1069
最頻値(モード)	129	310	310	#N/A	39,718	35,818	39,718
最頻値 データ数	33	211	211	0	9	12	10
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	8,821	8,821	8,821	8,821	8,821	8,821	
合 計	339,689,522	350,180,750	341,426,259	347,123,559	338,391,459	336,862,328	
平 均	38509.18513	39698.53191	38706.07176	39351.95091	38362.02914	38188.67793	
最頻値(モード)	36,587	39,718	36,269	39,718	35,818	35,818	
最頻値 データ数	14	9	11	10	13	14	





表 1-4 病院・診療所別集計結果表 一病院 1・2 計一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	3,980	3,970	3,980	3,980	672	66	0
合計	244,898	34,642.69	3,111,478	9,640,606	87,620	5,280	0
平均	61.5321608	8.726118388	781.778392	2422.262814	130.3869048	80	#DIV/0!
標準偏差	12.766593	7.477237407	77.94846981	158.8902478	7.086794752	0	#DIV/0!
標準誤差	0.202364103	0.118671359	1.23556631	2.518579745	0.273379043	0	65535
中央値 (メジアン)	62	7.01	741	2325	130	80	#NUM!
最頻値 (モード)	58	3.06	741	2305	130	80	#N/A
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	653	261	1,816	408	2,388	2,434	2,562
合計	189,777	44,979	139,050	747,577	480,825	4,787,062	3,449,707
平均	290.6232772	172.3333333	76.56938326	1832.296569	201.3505025	1966.746919	1346.489852
標準偏差	22.03905228	11.9486079	125.2065561	1367.974003	115.7302087	1427.479157	2055.302183
標準誤差	0.862454762	0.739600262	2.938117419	67.72480489	2.368261065	28.93406741	40.60561765
中央値 (メジアン)	294	174	20	1460	168	1726.5	338
最頻値 (モード)	294	174	10	820	168	30	52
	うち VD <sub>3</sub>	40：処置	I型(230)	I型(207)	II型(166)	II型(188)	III型(171)
標本数	929	3,980	83	21	194	299	101
合計	2,011,300	133,563,817	244,490	54,234	408,360	706,504	213,237
平均	2165.016146	33558.74799	2945.662651	2582.571429	2104.948454	2362.889632	2111.257426
標準偏差	1001.125792	1867.884304	272.2767278	331.3231914	304.2139406	374.9488348	426.7713592
標準誤差	32.8458718	29.60795667	29.88625354	72.30064781	21.84128806	21.68385099	42.46533742
中央値 (メジアン)	2223	32598.5	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値 (モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	III型(222)	IV型(224)	IV型(235)	V型(262)	V型(266)	特定積層型	ダイヤ計
標本数	839	588	1,816	15	134	13	3,980
合計	2,340,546	1,677,760	5,375,860	51,090	447,944	133,848	11,653,873
平均	2789.68534	2853.333333	2960.27533	3406	3342.865672	10296	2928.108794
標準偏差	388.9314732	323.6794707	443.7929818	0	504.7498568	0	502.0773188
標準誤差	13.42740561	13.3483164	10.41411833	0	43.60374641	0	7.958460528
中央値 (メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	2964
最頻値 (モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うちPTA
標本数	1,074	938	1,590	55	14	1,115	11
合計	3,713,700	1,460,640	793,649	187,855	38,152	135,901	263,751
平均	3457.821229	1557.185501	499.1503145	3415.545455	2725.142857	121.8843049	23977.36364
標準偏差	991.3885043	57.00989188	3094.78968	4233.608201	4436.935964	24.51954988	11340.9507
標準誤差	30.25113948	1.861438954	77.61266173	570.8596134	1185.821016	0.734302589	3419.425295
中央値 (メジアン)	3900	1560	130	3130	1325	130	23733
最頻値 (モード)	3900	1560	130	3130	800	130	34821
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	12	537	2,183	1,052	1,643	2,996	2,888
合計	243,836	135,393	808,789	502,042	301,966	949,056	186,539
平均	20319.66667	252.1284916	370.4942739	477.2262357	183.7894096	316.7743658	64.59106648
標準偏差	11840.32316	1356.113193	449.4591758	504.1139434	148.2898886	724.5642318	40.10003101
標準誤差	3418.006883	58.52060378	9.619741086	15.54249871	3.658413216	13.23750041	0.746184312
中央値 (メジアン)	15524.5	104	229	350	195	92	78
最頻値 (モード)	15127	104	55	24	55	92	92
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	659	1,832	1,800	0	3,980	3,980	3,980
合計	726,767	606,990	484,770	0	158,420,388	154,706,688	156,959,748
平均	1102.83308	331.3264192	269.3166667	#DIV/0!	39804.11759	38871.02714	39437.12261
標準偏差	1017.775045	397.5424964	175.1954194	#DIV/0!	4018.338956	3774.9303	3910.969569
標準誤差	39.6468868	9.28797047	4.129395635	65535	63.69495448	59.83666791	61.99303529
中央値 (メジアン)	1174	235	223	#NUM!	39125.5	38036.5	38731.5
最頻値 (モード)	427	140	140	#N/A	39456	35786	39456
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	
合計	153,246,048	157,626,739	153,888,881	156,141,941	152,428,241	151,680,664	
平均	38504.03216	39604.70829	38665.54799	39231.64347	38298.55302	38110.7196	
標準偏差	3614.535983	3489.855849	3191.941677	3367.912003	3007.473127	2876.917797	
標準誤差	57.29424707	55.31793408	50.59567699	53.38499417	47.6716539	45.60221279	
中央値 (メジアン)	37630	39034.5	37978	38660	37569.5	37414	
最頻値 (モード)	35786	35696	35696	35696	35696	35648	

表1-8 病院・診療所別集計結果表 一病院・診療所計-TTEST=P値一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
病院1							
病院2	P値	0.181869349	0.010757926	0	4.94311E-91	0.598136022	#DIV/0!
病院1							
診療所	P値	0.241566883	0.030632878	0	2.395E-126	0.101094373	#DIV/0!
病院2							
診療所	P値	0.512983934	4.03038E-05	9.33835E-84	8.1939E-174	0.886009299	#DIV/0!
病院							
診療所	P値	0.492652723	0.000585926	0	1.822E-232	0.115240507	#DIV/0!
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
病院1							
病院2	P値	#DIV/0!	#DIV/0!	8.88576E-08	0.272444613	4.5923E-25	0.389653805
病院1							
診療所	P値	#DIV/0!	#DIV/0!	6.33845E-08	0.686958889	2.57368E-09	0.00084229
病院2							
診療所	P値	#DIV/0!	#DIV/0!	1.41225E-16	0.361548188	1.88579E-48	0.219333702
病院							
診療所	P値	#DIV/0!	#DIV/0!	3.94349E-15	0.982859175	5.90915E-27	0.001678892
	うちVD <sub>3</sub>	40：処方	I型(230)	I型(207)	II型(166)	II型(188)	III型(171)
病院1							
病院2	P値	0.693807296	0.048589889	0.030298089	#DIV/0!	4.39408E-05	0.051211885
病院1							
診療所	P値	0.39382858	0.000390106	0.0083402	0.356840979	9.09645E-05	0.004035116
病院2							
診療所	P値	0.35139161	2.99079E-05	0.966789578	#DIV/0!	0.867757599	0.802574085
病院							
診療所	P値	0.285094233	3.15483E-06	0.018036451	0.356840979	0.022841547	0.012117517
	III型(222)	IV型(224)	IV型(235)	V型(262)	V型(266)	特定積層型	ダイア計
病院1							
病院2	P値	0.37458112	0.826994718	0.006882402	#DIV/0!	0.388791604	#DIV/0!
病院1							
診療所	P値	1.78724E-06	0.612811068	0.243640765	0.271829213	0.896771126	#DIV/0!
病院2							
診療所	P値	0.000591482	0.541774382	0.000219481	#DIV/0!	0.336383171	#DIV/0!
病院							
診療所	P値	3.0164E-08	0.520520188	0.009406123	0.271829213	0.734633136	#DIV/0!
	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うちPTA
病院1							
病院2	P値	0.00050103	0.395960856	0.704721409	0.000332912	#DIV/0!	0.731344852
病院1							
診療所	P値	0.64093093	0.332331622	0.008595353	0.892399061	0.324425263	0.10251283
病院2							
診療所	P値	0.00066154	0.214360435	0.018688618	0.001029676	#DIV/0!	0.359537489
病院							
診療所	P値	0.344704989	0.171672354	0.005693516	0.181261883	0.603776032	0.098328649
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
病院1							
病院2	P値	0.549885757	0.207903854	3.2797E-05	0.806424305	4.03621E-10	0.013135298
病院1							
診療所	P値	0.29648818	0.027569626	0.000663331	0.553778518	0.004011364	5.34555E-68
病院2							
診療所	P値	0.355220927	0.728490722	0.04923842	0.889497334	9.17837E-05	3.29225E-60
病院							
診療所	P値	0.269969312	0.080772951	0.041801974	0.571686964	0.508501558	2.05073E-73
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
病院1							
病院2	P値	0.557609833	3.70489E-31	2.80498E-87	#DIV/0!	0.371152716	0.679374368
病院1							
診療所	P値	1.1009E-07	3.77386E-13	0.338500849	#DIV/0!	0.644334897	0.812511387
病院2							
診療所	P値	0.000501997	2.61105E-58	1.083E-96	#DIV/0!	0.184816818	0.524388977
病院							
診療所	P値	3.90307E-07	0.103505642	3.59127E-20	#DIV/0!	0.371467737	0.660425695
0.001841212	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
病院1							
病院2	P値	0.598087727	0.094097691	0.839721976	0.105295635	0.92043235	0.949285515
病院1							
診療所	P値	0.715852946	0.13360603	0.340983473	0.025579077	0.093744626	0.030656906
病院2							
診療所	P値	0.70164314	0.004742376	0.390192318	0.001164195	0.218644137	0.130237012
病院							
診療所	P値	0.893885365	0.018865658	0.264411867	0.001841212	0.063936237	0.018069439

表 2-1 男女別集計結果表 一病院・診療所計一男 性一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	5,633	5,620	5,634	5,634	1,290	112	1,275
合計	342,730	49,254.27	4,835,963	14,112,894	167,830	8,960	566,775
平均	60.84324516	8.764104982	858.3533901	2504.951012	130.1007752	80	444.5294118
標準偏差	12.46189209	7.567458324	89.40298404	234.7055993	6.270777673	0	34.66839601
標準誤差	0.16604053	0.100944318	1.191087298	3.126907465	0.174592888	0	0.97090929
中央値 (メジアン)	61	6.11	923	2435	130	80	450
最頻値 (モード)	58	1.08	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	414	168	2,508	556	3,352	3,394	3,543
合計	120,246	29,058	233,655	1,030,721	723,811	7,113,927	4,648,155
平均	290.4492754	172.9642857	93.1638756	1853.814748	215.9340692	2096.030348	1311.926334
標準偏差	22.59606529	9.464014958	138.1356571	1349.123192	120.5387543	1443.126969	2074.012876
標準誤差	1.110536023	0.730164606	2.758303382	57.21556781	2.081971087	24.77129002	34.84382887
中央値 (メジアン)	294	174	20	1536	198	1867	267
最頻値 (モード)	294	174	10	950	168	30	52
	うち VD <sub>3</sub>	40：処置	I型(230)	I型(207)	II型(166)	II型(188)	III型(171)
標本数	1,185	5,634	71	35	104	414	58
合計	2,568,768	191,587,313	201,710	88,389	209,326	970,268	115,425
平均	2167.736709	34005.55786	2840.985915	2525.4	2012.75	2343.642512	1990.086207
標準偏差	1026.263601	2040.53748	552.6821741	504.0529384	487.7889236	422.4143081	590.3646594
標準誤差	29.81259295	27.18542675	65.5913067	85.2004971	47.83163923	20.76053063	77.51867751
中央値 (メジアン)	2223	33696	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値 (モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	III型(222)	IV型(224)	IV型(235)	V型(262)	V型(266)	特定積層型	ダイア計
標本数	1,373	427	3,135	8	211	53	5,628
合計	3,713,394	1,206,464	9,239,730	27,248	703,304	545,688	17,020,946
平均	2704.584122	2825.442623	2947.282297	3406	3333.194313	10296	3024.332978
標準偏差	516.0315658	402.1764478	676.5092195	0	505.5498988	0	831.0261423
標準誤差	13.92646845	19.46268243	12.08244834	0	34.80349033	0	11.07739499
中央値 (メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
最頻値 (モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うちPTA
標本数	2,117	1,215	2,065	52	22	1,436	9
合計	7,449,000	1,888,080	797,270	171,909	59,278	176,635	237,298
平均	3518.658479	1553.975309	386.0871671	3305.942308	2694.454545	123.0048747	26366.44444
標準偏差	914.3089031	81.93248345	2490.881875	3905.821775	3607.320543	23.51541811	8210.467147
標準誤差	19.8715855	2.350541807	54.81420309	541.6400263	769.0833238	0.62054815	2736.822382
中央値 (メジアン)	3900	1560	130	3130	1580	130	26283
最頻値 (モード)	3900	1560	130	3130	1500	130	34821
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	14	666	2,908	1,281	2,261	4,438	4,321
合計	236,594	106,785	1,015,299	605,124	404,444	847,144	218,757
平均	16899.57143	160.3378378	349.1399587	472.3840749	178.8783724	190.8841821	50.62647535
標準偏差	11123.97073	391.6373744	467.6442628	574.7110735	160.1074163	519.315995	43.24937682
標準誤差	2973.006233	15.17564001	8.671982835	16.05739165	3.367139954	7.795393635	0.657942167
中央値 (メジアン)	15418.5	104	205	350	140	60	60
最頻値 (モード)	15127	104	55	150	55	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	600	2,557	2,493	0	5,634	5,634	5,634
合計	596,184	802,697	731,797	0	226,751,532	219,302,532	224,863,452
平均	993.64	313.9213923	293.540714	#DIV/0!	40246.98829	38924.83706	39911.86581
標準偏差	870.0762236	283.3657626	168.0820415	#DIV/0!	3778.882807	3507.968784	3685.185806
標準誤差	35.52071308	5.603792063	3.366357034	65535	50.34484431	46.73554363	49.0965492
中央値 (メジアン)	829.5	274	276	#NUM!	39750.5	38134.5	39515.5
最頻値 (モード)	129	310	310	#N/A	39718	35818	39718
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	5,634	5,634	5,634	5,634	5,634	5,634	
合計	217,414,452	225,954,262	218,485,677	224,046,597	216,597,597	215,566,876	
平均	38589.71459	40105.47781	38779.85037	39766.87913	38444.7279	38261.78133	
標準偏差	3351.382825	3461.463681	3141.754786	3361.772133	2972.400829	2858.539572	
標準誤差	44.6493991	46.11597104	41.85659192	44.78781251	39.60034344	38.08340641	
中央値 (メジアン)	37763	39706	38082	39458.5	37709.5	37572.5	
最頻値 (モード)	35818	39718	35818	39718	35818	35818	

表2-2 男女別集計結果表 一病院・診療所計一女性一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	3,187	3,178	3,187	3,187	710	52	813
合計	199,091	30,221.23	2,748,669	8,028,657	92,300	4,160	361,575
平均	62.46972074	9.509512272	862.4628177	2519.18952	130	80	444.7416974
標準偏差	12.67209008	7.643236409	91.64756237	239.8969605	6.904547672	0	34.01310521
標準誤差	0.224469438	0.135581473	1.623416241	4.249459688	0.259123057	0	1.19289168
中央値(メジアン)	63	7.11	923	2435	130	80	450
最頻値(モード)	59	1.06	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	239	93	1,392	279	1,818	1,840	2,036
合計	69,531	15,921	139,135	498,410	415,446	3,515,746	2,558,664
平均	290.9246862	171.1935484	99.9533046	1786.415771	228.5181518	1910.731522	1256.711198
標準偏差	21.08253532	15.45488389	147.7020773	1248.879509	114.0358591	1238.921808	1912.11364
標準誤差	1.363715844	1.602596805	3.958831213	74.76846047	2.674511682	28.88251357	42.37647351
中央値(メジアン)	294	174	30	1580	210	1755.5	340
最頻値(モード)	294	174	10	820	168	30	52
	うちVD <sub>3</sub>	40：処置	I型(230)	I型(207)	II型(166)	II型(188)	III型(171)
標本数	714	3,187	120	30	148	177	116
合計	1,493,370	105,398,327	339,480	74,520	313,740	398,748	246,924
平均	2091.554622	33071.32946	2829	2484	2119.864865	2252.813559	2128.655172
標準偏差	1045.618608	1769.183066	529.7096081	403.1509515	260.5656497	522.3999407	409.2489856
標準誤差	39.13129291	31.33875522	48.35565021	73.60495673	21.41836447	39.26598404	37.99781439
中央値(メジアン)	2071	32305	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値(モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	III型(222)	IV型(224)	IV型(235)	V型(262)	V型(266)	特定積層型	ダイア計
標本数	566	676	1,360	19	64	26	3,183
合計	1,557,552	1,947,008	3,993,825	62,094	213,066	267,696	9,414,653
平均	2751.858657	2880.189349	2936.636029	3268.105263	3329.15625	10296	2957.792334
標準偏差	444.917486	237.1168293	479.7544939	601.0692227	506.0155973	0	716.8486007
標準誤差	18.70127683	9.119878052	13.00917025	137.8947368	63.25194966	0	12.70600794
中央値(メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	2912
最頻値(モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うちPTA
標本数	393	737	1,322	43	7	852	7
合計	1,283,100	1,146,720	476,635	110,149	10,184	104,144	135,102
平均	3264.885496	1555.929444	360.5408472	2561.604651	1454.857143	122.2347418	19300.28571
標準偏差	1193.15161	67.68481473	2350.730945	3683.661889	1287.045121	23.54047572	11329.92805
標準誤差	60.18653711	2.493202195	64.65277895	561.7531716	486.4573308	0.806483409	4282.310284
中央値(メジアン)	3900	1560	130	1490	800	130	14016
最頻値(モード)	3900	1560	130	3130	800	130	#N/A
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	5	502	1,522	715	1,113	2,503	2,465
合計	105,684	125,446	563,932	361,311	209,401	443,833	121,949
平均	21136.8	249.8924303	370.5203679	505.3300699	188.1410602	177.3204155	49.47221095
標準偏差	13791.27651	1396.088401	418.8093749	589.6457348	155.9483602	548.5654167	36.89751044
標準誤差	6167.646353	62.31047476	10.73517351	22.0515002	4.674479187	10.96473147	0.74317074
中央値(メジアン)	14978	104	243	350	200	60	60
最頻値(モード)	#N/A	104	55	150	55	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	294	1,495	1,461	0	3,187	3,187	3,187
合計	302,821	504,904	444,814	0	124,704,890	123,421,790	123,558,170
平均	1030.003401	337.7284281	304.45859	#DIV/0!	39129.24067	38726.63634	38769.42893
標準偏差	1137.433082	341.3179019	192.3186724	#DIV/0!	3498.900113	3341.806507	3359.908811
標準誤差	66.33644449	8.827515137	5.031486877	65535	61.9784217	59.19571472	59.51637328
中央値(メジアン)	726	280	280	#NUM!	38386	37995	37960
最頻値(モード)	427	310	310	#N/A	36587	36587	36587
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除障害手	除夜障手在	
標本数	3,187	3,187	3,187	3,187	3,187	3,187	
合計	122,275,070	124,228,255	122,940,582	123,076,962	121,793,862	121,295,452	
平均	38366.8246	38979.68466	38575.64543	38618.43803	38215.8337	38059.44525	
標準偏差	3172.719025	3171.846237	2998.239298	3023.215576	2813.318079	2712.860334	
標準誤差	56.20055198	56.18509169	53.1098727	53.55229466	49.83423608	48.05475903	
中央値(メジアン)	37602	38315	37948	37896	37541	37411	
最頻値(モード)	36587	36230	36036	36337	36036	36036	

表 2-3 男女別集計結果表 一病院・診療所計—TTEST=P 値—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
男 性							
女 性	P 値						
	5.01694E-09	9.89427E-06	0.039905783	0.006636582	0.740196572	#DIV/0!	0.890696938
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
男 性							
女 性	P 値						
	0.790828663	0.252316675	0.151558698	0.485505039	0.000262483	3.30995E-06	0.324853914
	うち VD <sub>s</sub>	40：処置	I 型(230)	I 型(207)	II 型(166)	II 型(188)	III 型(171)
男 性							
女 性	P 値						
	0.119922076	2.5627E-101	0.881945409	0.718977874	0.025069829	0.026474071	0.072573652
	III 型(222)	IV 型(224)	IV 型(235)	V 型(262)	V 型(266)	特定積層型	ダイア計
男 性							
女 性	P 値						
	0.05669681	0.004553864	0.599046672	0.527035961	0.95541421	#DIV/0!	0.000151768
	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うち PTA
男 性							
女 性	P 値						
	1.70817E-06	0.586154995	0.766036221	0.345319065	0.385558153	0.449113486	0.169148085
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
男 性							
女 性	P 値						
	0.500182647	0.115428558	0.134489527	0.223903587	0.111139922	0.306007136	0.265389367
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
男 性							
女 性	P 値						
	0.597130277	0.016918242	0.061882822	#DIV/0!	2.63977E-42	0.009535409	1.08207E-46
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
男 性							
女 性	P 値						
	0.002231342	5.34538E-51	0.002881496	1.19222E-56	0.000399779	0.00114862	

表3-2 年齢別集計結果表 一病院・診療所計—40～64歳—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	4,675	4,661	4,675	4,675	1,091	97	1,020
合計	257,514	47,349.68	4,018,861	11,668,810	141,700	7,760	453,375
平均	55.08320856	10.15869556	859.6494118	2496.002139	129.8808433	80	444.4852941
標準偏差	6.257330008	8.089535118	89.66189092	228.3041553	6.819057861	0	34.80782485
標準誤差	0.091516258	0.118490631	1.311345366	3.339050662	0.206448628	0	1.089875272
中央値(メジアン)	56	8.07	923	2435	130	80	450
最頻値(モード)	58	1.06	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	319	140	2,006	423	2,724	2,761	2,962
合計	92,904	24,186	173,010	746,886	586,195	5,700,529	3,768,836
平均	291.2351097	172.7571429	86.24626122	1765.687943	215.1964023	2064.660992	1272.395679
標準偏差	20.00120804	10.36101675	135.0002944	947.5626713	117.5948932	1422.168011	1825.975721
標準誤差	1.119852659	0.875665739	3.014180467	46.07207367	2.25312305	27.06560271	33.55076844
中央値(メジアン)	294	174	20	1580	198	1855	336
最頻値(モード)	294	174	10	950	168	30	52
	うちVD <sub>3</sub>	40：処置	I型(230)	I型(207)	II型(166)	II型(188)	III型(171)
標本数	1,145	4,675	31	19	79	281	51
合計	2,503,629	159,303,762	86,020	48,231	165,668	658,188	110,979
平均	2186.575546	34075.67102	2774.83871	2538.473684	2097.063291	2342.30605	2176.058824
標準偏差	1041.251023	2080.04852	669.0733441	413.0911076	319.1714973	377.6379676	290.3546391
標準誤差	30.77178558	30.42164247	120.16912	94.7695996	35.90959899	22.52799244	40.65778185
中央値(メジアン)	2223	33696	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値(モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	III型(222)	IV型(224)	IV型(235)	V型(262)	V型(266)	特定積層型	ダイア計
標本数	1,093	392	2,683	12	195	48	4,670
合計	2,950,158	1,121,792	7,853,465	40,872	650,104	494,208	14,179,685
平均	2699.138152	2861.714286	2927.12076	3406	3333.866667	10296	3036.335118
標準偏差	505.9354663	320.0572839	487.5369478	0	498.2020071	0	773.1329843
標準誤差	15.3032983	16.16533399	9.412331138	0	35.67698675	0	11.31346823
中央値(メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
最頻値(モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うちPTA
標本数	1,895	922	1,671	44	13	1,141	8
合計	6,611,700	1,429,200	676,628	167,355	22,931	139,340	227,393
平均	3489.023747	1550.10846	404.9239976	3803.522727	1763.923077	122.1209465	28424.125
標準偏差	954.2689318	105.7858712	2736.463017	4830.768163	1570.786293	24.13044429	8179.118315
標準誤差	21.92129354	3.48387213	66.94241227	728.2657021	435.6577324	0.714368829	2891.755012
中央値(メジアン)	3900	1560	130	3130	1150	130	29393
最頻値(モード)	3900	1560	130	3130	800	130	34821
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	8	571	2,342	999	1,827	3,635	3,541
合計	166,345	125,671	825,472	476,878	353,187	698,122	173,895
平均	20793.125	220.089317	352.4645602	477.3553554	193.3152709	192.0555708	49.10900875
標準偏差	14998.44301	1013.438419	407.8059592	547.1866055	166.0212387	582.9501052	36.08337772
標準誤差	5302.750379	42.41107786	8.426750246	17.31221806	3.884135537	9.66894695	0.606379096
中央値(メジアン)	18263	104	228.5	350	200	60	60
最頻値(モード)	#N/A	104	55	150	55	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	463	2,166	2,124	0	4,675	4,675	4,675
合計	489,301	668,027	631,537	0	188,022,573	181,410,873	186,593,373
平均	1056.805616	308.4150508	297.3338041	#DIV/0!	40218.73219	38804.46481	39913.02096
標準偏差	1098.686515	252.3434148	186.052832	#DIV/0!	3708.186684	3401.310366	3615.737498
標準誤差	51.06029251	5.422040406	4.037002598	65535	54.23389331	49.74568953	52.8817825
中央値(メジアン)	989	276	278	#NUM!	39814	38064	39630
最頻値(モード)	281	310	310	#N/A	39718	35818	39718
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	4,675	4,675	4,675	4,675	4,675	4,675	
合計	179,981,673	187,345,945	180,728,567	185,911,067	179,299,367	178,552,481	
平均	38498.75358	40073.99893	38658.51701	39767.07316	38352.80578	38193.04406	
標準偏差	3252.909011	3325.61308	2950.450992	3229.227047	2784.884837	2702.374852	
標準誤差	47.57525316	48.63858278	43.15166898	47.22889381	40.73018971	39.52344417	
中央値(メジアン)	37749	39769	38023	39569	37703	37553	
最頻値(モード)	35818	39718	35818	39718	35818	35818	



表3-7-1 年齢別集計結果表 一病院・診療所計—TTEST=P値—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)	
40歳未満								
40～64歳	P値	0	1.28782E-10	0.221801412	0.802156151	0.85664534	#DIV/0!	0.101661391
40歳未満								
65～69歳	P値	0	0.000471475	0.631633538	0.006517084	0.552987402	#DIV/0!	0.06209343
40歳未満								
70歳以上	P値	0	0.035496095	0.119275904	0.001893215	0.643700358	#DIV/0!	0.115030409
40歳未満								
75歳以上	P値	0	1.26694E-05	0.115721718	0.018801014	0.528193792	#DIV/0!	0.139314488
40～64歳								
65～69歳	P値	0	2.45579E-05	0.284184279	1.11716E-05	0.225703385	#DIV/0!	0.465323305
40～64歳								
70歳以上	P値	0	2.0761E-58	0.384652386	2.85506E-09	0.281561812	#DIV/0!	0.826673817
40～64歳								
75歳以上	P値	0	1.03897E-56	0.317415033	0.000134347	0.209172107	#DIV/0!	0.644699045
65～69歳								
70歳以上	P値	0	4.34744E-17	0.114001238	0.735362275	0.721594289	#DIV/0!	0.401553242
65～69歳								
75歳以上	P値	0	9.87372E-24	0.108234982	0.598563065	0.930821712	#DIV/0!	0.337011954
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射	
40歳未満								
40～64歳	P値	0.84296179	0.73570275	0.031537751	0.917113251	0.615741246	0.640946413	0.756895121
40歳未満								
65～69歳	P値	0.493023713	0.633489533	0.000547998	0.737200041	0.014295647	0.910526907	0.546808496
40歳未満								
70歳以上	P値	0.860739827	0.653445073	1.92331E-05	0.763664803	0.060868801	0.01801729	0.831596638
40歳未満								
75歳以上	P値	0.98366768	0.572771799	0.000982664	0.797267954	0.300772974	0.002390542	0.291020405
40～64歳								
65～69歳	P値	0.121173795	0.546031135	0.011677727	0.200849989	0.00052352	0.595580419	0.131464407
40～64歳								
70歳以上	P値	0.978349762	0.560377397	1.57826E-07	0.17560456	0.006128699	0.000572423	0.943318403
40～64歳								
75歳以上	P値	0.736347492	0.279375765	0.00813381	0.281779757	0.324709901	4.21329E-05	0.155630973
65～69歳								
70歳以上	P値	0.165279593	0.902246991	0.110110776	0.949775644	0.275703095	0.001339546	0.261992084
65～69歳								
75歳以上	P値	0.331474701	0.800361581	0.916836645	0.99624994	0.048390077	8.62182E-05	0.042419463
	うちVD <sub>s</sub>	40：処置	I型(230)	I型(207)	II型(166)	II型(188)	III型(171)	
40歳未満								
40～64歳	P値	0.459603633	5.58805E-08	0.219275995	0.614088529	0.643093062	0.771945485	0.144305473
40歳未満								
65～69歳	P値	0.065574267	1.19587E-29	0.010281553	0.117386795	0.5854478	0.818297891	0.594913177
40歳未満								
70歳以上	P値	0.007750202	4.3226E-110	0.051168666	0.802014906	0.561494093	0.299178626	0.725108279
40歳未満								
75歳以上	P値	0.007685652	8.5868E-114	0.070820414	0.831065337	0.547126586	0.25042653	0.55720135
40～64歳								
65～69歳	P値	0.073242649	2.53164E-27	0.229361419	0.425412992	0.710183044	0.414701314	0.229175637
40～64歳								
70歳以上	P値	0.001900676	9.9729E-143	0.547294732	0.63005396	0.487616867	0.027458699	0.104915081
40～64歳								
75歳以上	P値	0.002500069	3.4868E-108	0.641579502	0.613408943	0.478418339	0.019603545	0.23708637
65～69歳								
70歳以上	P値	0.456978444	4.71914E-19	0.318277638	0.349585221	0.844104666	0.04562824	0.751856012
65～69歳								
75歳以上	P値	0.254942152	1.04865E-20	0.296282353	0.364707538	0.816819179	0.032816273	0.954686113
	III型(222)	IV型(224)	IV型(235)	V型(262)	V型(266)	特定積層型	ダイア計	
40歳未満								
40～64歳	P値	0.610763407	0.849473437	0.856314903	#DIV/0!	0.85266752	#DIV/0!	0.195992864
40歳未満								
65～69歳	P値	0.399508738	0.804357373	0.838954217	#DIV/0!	0.874900479	#DIV/0!	0.746597698
40歳未満								
70歳以上	P値	0.055500175	0.729634353	0.241711236	0.661780331	0.459194157	#DIV/0!	0.274635354
40歳未満								
75歳以上	P値	0.014364544	0.869499986	0.261096894	0.603645057	0.078661959	#DIV/0!	0.139135979
40～64歳								
65～69歳	P値	0.499517606	0.290356245	0.574938997	#DIV/0!	0.666564825	#DIV/0!	0.017157594
40～64歳								
70歳以上	P値	0.007997406	0.736141638	0.002932862	0.258451697	0.352126974	#DIV/0!	7.81571E-06
40～64歳								
75歳以上	P値	0.003530593	0.924927704	0.005541713	0.163485487	0.014634928	#DIV/0!	5.2442E-06
65～69歳								
70歳以上	P値	0.171671232	0.139116982	0.141993921	0.528757116	0.336684846	#DIV/0!	0.224195528
65～69歳								
75歳以上	P値	0.052255047	0.331078974	0.148940929	0.446813334	0.037503692	#DIV/0!	0.081243666



表 3-7-2 年齢別集計結果表 一病院・診療所計—TTEST=P 値—

		夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うち PTA
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.161739376	0.549694972	0.717387574	0.349320803	0.952700517	0.883170586	#DIV/0!
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.161617913	#DIV/0!	0.071484881	0.017855081	0.825266218	0.964360004	#DIV/0!
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	1.96311E-05	0.780881481	0.657978454	0.0021049	0.685572823	0.542326138	#DIV/0!
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.006777298	#DIV/0!	0.931072242	0.00936771	0.595010638	0.722480505	#DIV/0!
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.664649866	0.083191155	0.098079987	0.078759426	0.768088211	0.762509589	#DIV/0!
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	4.46685E-05	0.067994811	0.939366072	0.052201902	0.287358096	0.133204162	0.011993534
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.036484481	0.073939957	0.641091564	0.091170131	0.162445063	0.38572027	0.071956375
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.006968919	0.420192272	0.061740124	0.085622479	0.672153638	0.421519721	#DIV/0!
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.111312321	#DIV/0!	0.034151937	0.195542068	0.553416089	0.672695544	#DIV/0!
		うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	#DIV/0!	0.095447994	0.406306509	0.076477944	0.222703816	0.106871163	0.026028421
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	#DIV/0!	0.05558931	0.094588943	0.01646618	0.004535946	0.151245607	0.15326516
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.019960224	0.67573067	0.116762138	6.56442E-05	0.096135864	0.386085672
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.06808099	0.692252908	0.166767456	5.25202E-05	0.083190751	0.701937483
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.331082411	0.16071958	0.007957712	0.003924016	0.007212052	0.628763614	0.551351594
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.582826662	0.258616261	0.417207098	0.380568775	2.38691E-07	0.641879425	0.02015174
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.751082638	0.383028985	0.477784935	0.264299578	1.65046E-05	0.991153443	0.005386859
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.229946169	0.098433122	0.006625499	0.001207526	0.143684791	0.893620492	0.263799724
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.367914817	0.091372747	0.021669365	0.002915522	0.127184584	0.663252905	0.109033617
		うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.074104306	0.008390865	0.022481805	#DIV/0!	0.006462259	0.092209569	0.000151338
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.119471561	0.001173267	0.002824854	#DIV/0!	2.11346E-06	0.000724133	1.87222E-10
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.071752999	0.000802732	0.009780506	#DIV/0!	1.30979E-21	0.06714321	4.89564E-31
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.073937564	0.001921684	0.025356472	#DIV/0!	1.21944E-24	0.331610215	3.79698E-34
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.34659513	0.013150715	0.326972773	#DIV/0!	6.59711E-05	0.000962021	3.23189E-07
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.30778233	7.98806E-05	0.708410634	#DIV/0!	2.56441E-40	0.62017429	8.94156E-51
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.669735731	0.003117837	0.888338133	#DIV/0!	6.17159E-37	0.334223035	6.25198E-45
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.851414092	0.547849541	0.491535479	#DIV/0!	2.16461E-09	0.00999124	3.85213E-10
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.60832915	0.792288071	0.314850096	#DIV/0!	1.29549E-11	0.000755684	1.91049E-12
		除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.5209601	0.003916439	0.031602523	4.18966E-05	0.337331937	0.750800591	
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.053422158	5.5867E-06	3.37122E-05	3.34995E-10	0.008149081	0.072278222	
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.868137437	6.58483E-26	0.047406648	3.19986E-38	0.899410445	0.47589267	
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.513375788	1.00814E-31	0.371327296	2.08008E-44	0.3275016	0.076328642	
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.018615544	0.000185268	1.16737E-05	7.13112E-07	0.000691067	0.005707488	
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.381776063	6.05483E-51	0.922283217	2.77728E-65	0.136274887	0.044655923	
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.035642247	7.81877E-49	0.079689468	1.24203E-59	0.001837948	0.00054526	
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.006666866	8.66734E-13	0.000279072	3.35948E-14	0.000118571	0.000208581	
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.000456999	4.93934E-16	5.30088E-06	2.40223E-17	1.82853E-06	4.34518E-06	

表4-1 透析歴別集計結果表 一病院・診療所計—10年未満—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	5,488	5,489	5,489	5,489	1,221	88	1,299
合計	343,032	22,758.80	4,711,880	13,756,156	158,860	7,040	578,025
平均	62.5058309	4.146256149	858.4222991	2506.131536	130.1064701	80	444.9769053
標準偏差	13.12736263	2.63149661	88.71421907	234.3822595	6.445621139	0	33.25381342
標準誤差	0.177202739	0.035518629	1.197420306	3.1635749	0.184462013	0	0.922649775
中央値(メジアン)	63	4.04	923	2435	130	80	450
最頻値(モード)	58	1.06	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	415	158	2,450	721	3,256	3,296	3,311
合計	120,099	27,057	212,930	1,306,088	715,804	6,710,938	3,478,225
平均	289.3951807	171.2468354	86.91020408	1811.495146	219.8415233	2036.085558	1050.505889
標準偏差	25.63762663	15.27817923	136.1606194	1256.541277	118.209393	1375.314934	1851.310175
標準誤差	1.258501595	1.215466678	2.750859923	46.79604256	2.07161854	23.95568299	32.17359552
中央値(メジアン)	294	174	20	1571	198	1826	169
最頻値(モード)	294	174	10	820	168	30	52
	うちVD <sub>3</sub>	40：処置	I型(230)	I型(207)	II型(166)	II型(188)	III型(171)
標本数	871	5,489	150	50	186	380	115
合計	1,747,271	183,676.718	425,500	125,649	383,128	876,644	237,348
平均	2006.051665	33462.69229	2836.666667	2512.98	2059.827957	2306.957895	2063.895652
標準偏差	934.8596198	1835.085732	524.6611776	461.9394116	408.6152918	466.6478542	516.3499319
標準誤差	31.6765098	24.76907243	42.83840576	65.32809809	29.96112685	23.93852982	48.14987942
中央値(メジアン)	1957	32354	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値(モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	III型(222)	IV型(224)	IV型(235)	V型(262)	V型(266)	特定積層型	ダイア計
標本数	1,211	753	2,690	19	147	43	5,482
合計	3,276,276	2,147,936	7,891,535	62,094	483,854	442,728	16,352,692
平均	2705.430223	2852.504648	2933.656134	3268.105263	3291.52381	10296	2982.979205
標準偏差	517.6084889	331.4896428	727.7735746	601.0692227	620.484271	0	790.6043697
標準誤差	14.8740528	12.08015413	14.0320183	137.8947368	51.17668013	0	10.67799455
中央値(メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	2990
最頻値(モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うちPTA
標本数	1,325	1,172	2,475	49	17	1,708	14
合計	4,545,000	1,816,625	917,108	178,481	31,622	212,302	322,467
平均	3430.188679	1550.021331	370.5486869	3642.469388	1860.117647	124.2985948	23033.35714
標準偏差	1011.165929	108.0908167	2483.158036	3868.587803	1700.63767	20.50915632	9950.147209
標準誤差	27.77886444	3.157366468	49.91335454	552.6554004	412.4652203	0.496253819	2659.2887
中央値(メジアン)	3900	1560	130	3130	1168	130	23011
最頻値(モード)	3900	1560	130	3130	800	130	34821
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	10	817	2,758	1,275	2,085	4,417	4,329
合計	205,920	166,675	917,836	584,257	329,006	839,085	224,186
平均	20250	204.0085679	332.7904278	458.2407843	157.7966427	189.9671723	51.78701779
標準偏差	13250.50081	1112.792633	407.1731101	469.3817212	142.7732652	553.4963928	43.47117416
標準誤差	4190.17627	38.93168616	7.753217339	13.14531752	3.126755067	8.328199025	0.660704976
中央値(メジアン)	15524.5	104	200	309	85	60	60
最頻値(モード)	#N/A	104	55	150	55	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	571	2,456	2,402	1	5,489	5,489	5,489
合計	577,425	750,057	680,157	37,723	217,018,408	212,473,408	215,201,848
平均	1011.252189	305.3978013	283.162781	37723	39536.9663	38708.94662	39206.02077
標準偏差	1033.763713	287.4647609	178.8242448	#DIV/0!	3651.462734	3405.797776	3532.95533
標準誤差	43.26166493	5.800566801	3.64871463	0	49.28562375	45.96976061	47.68606989
中央値(メジアン)	746	266	266	37723	38875	37951	38496
最頻値(モード)	129	310	310	#N/A	40487	36587	39718
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	5,489	5,489	5,489	5,489	5,489	5,489	
合計	210,656,783	216,101,300	211,533,702	214,262,142	209,717,142	208,411,054	
平均	38377.98925	39369.88522	38537.74859	39034.82274	38206.80306	37968.85662	
標準偏差	3232.186395	3265.82304	2975.884651	3133.356839	2780.253547	2618.862382	
標準誤差	43.62644074	44.0804514	40.16700757	42.29248866	37.52647643	35.34809895	
中央値(メジアン)	37602	38803	37892	38406	37537	37334	
最頻値(モード)	36587	36879	36269	36879	36269	36269	

表 4-3 透析歴別集計結果表 一病院・診療所計—15年以上—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	1,846	1,846	1,846	1,846	435	44	451
合計	109,643	39,367.65	1,598,081	4,654,147	56,550	3,520	198,900
平均	59.39490791	21.32592091	865.6993499	2521.206392	130	80	441.0199557
標準偏差	10.30392122	4.989068624	96.27788412	247.7076653	0	0	44.09285204
標準誤差	0.239820708	0.116119092	2.240839178	5.765322392	0	0	2.076251313
中央値(メジアン)	59	20.09	923	2435	130	80	450
最頻値(モード)	57	15.07	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	117	46	799	31	1,021	1,032	1,278
合計	34,398	8,004	97,745	58,836	227,340	2,004,490	2,203,032
平均	294	174	122.3341677	1897.935484	222.6640548	1942.335271	1723.812207
標準偏差	0	0	150.2899111	1611.88217	116.9314688	1298.236459	2281.490498
標準誤差	0	0	5.316874848	289.5025839	3.659472889	40.41233577	63.81947651
中央値(メジアン)	294	174	30	1460	210	1755	1044
最頻値(モード)	294	174	10	1460	168	30	2223
	うちVD <sub>3</sub>	40：処置	I型(230)	I型(207)	II型(166)	II型(188)	III型(171)
標本数	592	1,846	20	5	38	104	36
合計	1,373,510	63,233,447	59,800	13,455	82,004	248,348	75,411
平均	2320.118243	34254.30498	2990	2691	2158	2387.961538	2094.75
標準偏差	1154.126986	2397.77926	0	0	0	306.4953768	448.4822261
標準誤差	47.44342692	55.80760063	0	0	0	30.05434437	74.74703769
中央値(メジアン)	2223	33800	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値(モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	III型(222)	IV型(224)	IV型(235)	V型(262)	V型(266)	特定積層型	ダイア計
標本数	412	217	969	5	82	26	1,845
合計	1,125,540	620,256	2,847,965	17,030	277,704	267,696	5,635,209
平均	2731.893204	2858.322581	2939.076367	3406	3386.634146	10296	3054.313821
標準偏差	456.4468595	327.4352454	466.2345297	0	315.7019814	0	897.1370901
標準誤差	22.48752273	22.22775281	14.97761097	0	34.86345159	0	20.88625744
中央値(メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
最頻値(モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うちPTA
標本数	701	557	455	29	11	274	1
合計	2,481,000	868,800	158,700	55,583	18,049	31,388	14,659
平均	3539.229672	1559.78456	348.7912088	1916.655172	1640.818182	114.5547445	14659
標準偏差	920.8468028	5.084563183	1915.341173	3574.272186	737.7123854	34.32177402	#DIV/0!
標準誤差	34.77990373	0.215439856	89.79257916	663.7256824	222.4286532	2.073454196	0
中央値(メジアン)	3900	1560	130	864	1660	130	14659
最頻値(モード)	3900	1560	130	170	800	130	#N/A
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	3	194	939	399	728	1,396	1,356
合計	53,372	42,079	378,800	216,312	168,486	237,583	60,417
平均	17790.66667	216.9020619	403.4078807	542.1353383	231.4368132	170.1883954	44.55530973
標準偏差	14110.98984	507.0285535	432.7305957	671.5276941	189.3362296	482.3132086	34.49848226
標準誤差	8146.983784	36.40252867	14.12162928	33.61843405	7.01726754	12.90881707	0.936850179
中央値(メジアン)	15344	104	256	360	228	60	32
最頻値(モード)	#N/A	104	256	980	256	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	166	904	880	0	1,846	1,846	1,846
合計	169,496	321,823	290,413	0	74,840,254	72,359,254	73,971,454
平均	1021.060241	355.9988938	330.0147727	#DIV/0!	40541.8494	39197.86241	40071.21018
標準偏差	841.3042162	323.8545382	170.5468112	#DIV/0!	3807.92096	3545.736251	3725.523535
標準誤差	65.29787097	10.77124172	5.749131832	65535	88.62823018	82.52595889	86.71045457
中央値(メジアン)	806	310	310	#NUM!	39963.5	38445	39637.5
最頻値(モード)	281	310	310	#N/A	39657	35818	40046
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	1,846	1,846	1,846	1,846	1,846	1,846	
合計	71,490,454	74,681,554	72,199,644	73,811,844	71,330,844	71,272,008	
平均	38727.22319	40455.87974	39111.39978	39984.74756	38640.76056	38608.88841	
標準偏差	3400.502318	3652.130289	3363.290415	3575.732239	3220.033824	3197.826779	
標準誤差	79.14568219	85.00224854	78.27958621	83.22410661	74.94533156	74.42846919	
中央値(メジアン)	37875	39918	38380	39578.5	37813.5	37782	
最頻値(モード)	36587	38410	35818	40046	35818	35818	

表 4-5-1 透析歴別集計結果表 一病院・診療所計—TTEST=P値—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
10年未満 10～14年	P値 2.4712E-11	0	0.846447376	0.432697209	0.814111741	#DIV/0!	0.118059551
10年未満 15年以上	P値 2.47831E-20	0	0.002865768	0.018494007	0.730553556	#DIV/0!	0.046582773
10年未満 透析歴不明	P値 0.919577714	#DIV/0!	0.627874465	0.501986209	0.96774514	#DIV/0!	0.735691882
10～14年 15年以上	P値 0.165096304	0	0.016414205	0.25022891	1	#DIV/0!	0.00803124
10～14年 透析歴不明	P値 0.281595059	#DIV/0!	0.645782379	0.430217222	1	#DIV/0!	0.831792047
15年以上 透析歴不明	P値 0.1174747	#DIV/0!	0.42063899	0.355632974	#DIV/0!	#DIV/0!	0.649393449
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
10年未満 10～14年	P値 0.386151304	0.175754322	0.178268906	0.531548267	0.89984424	0.16948404	4.46245E-12
10年未満 15年以上	P値 0.052729285	0.223867135	5.56207E-10	0.711270205	0.504549666	0.05289582	1.02633E-24
10年未満 透析歴不明	P値 #DIV/0!	#DIV/0!	0.522310578	0.004690512	0.474947826	0.309724005	0.004165272
10～14年 15年以上	P値 0.163913644	#DIV/0!	0.0005465	0.979169123	0.533492388	0.008297592	0.034988539
10～14年 透析歴不明	P値 #DIV/0!	#DIV/0!	0.656679111	0.042116514	0.476545901	0.439398244	0.064457879
15年以上 透析歴不明	P値 #DIV/0!	#DIV/0!	0.967629207	0.07219063	0.527015414	0.186604184	0.163857169
	うちVD <sub>3</sub>	40：処置	I型(230)	I型(207)	II型(166)	II型(188)	III型(171)
10年未満 10～14年	P値 0.008044188	1.1332E-05	0.182302273	0.423364965	0.222864103	0.805353104	0.437371076
10年未満 15年以上	P値 1.22561E-08	1.09859E-48	0.194142342	0.396673796	0.140721666	0.094872793	0.747662068
10年未満 透析歴不明	P値 0.208169636	0.86313485	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000139998	0.074311549	#DIV/0!
10～14年 15年以上	P値 0.017962037	5.02607E-13	0.075324862	0.22652707	#DIV/0!	0.10882361	0.599176907
10～14年 透析歴不明	P値 0.341020794	0.663578541	#DIV/0!	#DIV/0!	1.13793E-08	0.125583617	#DIV/0!
15年以上 透析歴不明	P値 0.524945338	0.149757259	#DIV/0!	#DIV/0!	3.28497E-12	0.004842462	#DIV/0!
	III型(222)	IV型(224)	IV型(235)	V型(262)	V型(266)	特定積層型	ダイア計
10年未満 10～14年	P値 0.195702781	0.129585445	0.062295635	0.701205161	0.440260642	#DIV/0!	0.777237497
10年未満 15年以上	P値 0.356257132	0.819373171	0.828701073	0.618850934	0.196050707	#DIV/0!	0.001212621
10年未満 透析歴不明	P値 0.356396753	#DIV/0!	0.637318344	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.002181294
10～14年 15年以上	P値 0.656668433	0.193817459	0.029764516	#DIV/0!	0.721866218	#DIV/0!	0.016684821
10～14年 透析歴不明	P値 0.434688102	#DIV/0!	0.576570139	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000171809
15年以上 透析歴不明	P値 0.3727925	#DIV/0!	0.482287644	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.022567719

表 4-5-2 透析歴別集計結果表 一病院・診療所計—TTEST=P 値—

		夜間	障害	50:手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うちPTA
10年未満 10~14年	P 値	0.045556539	0.667923779	0.57794541	0.561715795	0.003084172	0.023117099	#DIV/0!
10年未満 15年以上	P 値	0.017392253	0.033288834	0.859176028	0.053945846	0.69108822	8.10473E-11	#DIV/0!
10年未満 透析歴不明	P 値	0.042447663	0.836560543	0.744483338	#DIV/0!	#DIV/0!	0.630068812	#DIV/0!
10~14年 15年以上	P 値	0.935499315	0.125026408	0.545197529	0.351771237	0.008660164	0.008234192	#DIV/0!
10~14年 透析歴不明	P 値	0.012294204	0.880564173	0.696106956	#DIV/0!	#DIV/0!	0.503346429	#DIV/0!
15年以上 透析歴不明	P 値	0.014266692	0.924617546	0.700714191	#DIV/0!	#DIV/0!	0.327198056	#DIV/0!
		うちシャント	うちその他	60:検査	うち生体	うち検体	70:画像	うち胸部
10年未満 10~14年	P 値	0.148708565	0.560102653	0.004823856	0.111340796	2.02077E-13	0.895382812	0.639349516
10年未満 15年以上	P 値	0.756946174	0.874881268	6.47905E-06	0.005367042	2.23864E-27	0.230582492	2.26461E-08
10年未満 透析歴不明	P 値	#DIV/0!	0.872707448	0.990103643	0.491533857	0.12598799	0.26259087	0.435105271
10~14年 15年以上	P 値	0.428126855	0.177093016	0.507368421	0.607709389	0.023267859	0.258564289	8.92208E-06
10~14年 透析歴不明	P 値	#DIV/0!	0.872529026	0.744088268	0.817252827	0.015774708	0.203185916	0.417425423
15年以上 透析歴不明	P 値	#DIV/0!	0.683897359	0.552245901	0.860603191	0.020705516	0.266525888	0.924364853
		うち胸部ほか	80:その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
10年未満 10~14年	P 値	0.59539568	0.006370612	0.002932464	#DIV/0!	1.82049E-07	0.018823284	2.90584E-10
10年未満 15年以上	P 値	0.910915184	1.28326E-05	1.97931E-11	#DIV/0!	6.61692E-24	1.32809E-07	3.50444E-19
10年未満 透析歴不明	P 値	#DIV/0!	0.833492418	0.453808337	#DIV/0!	0.28255559	0.084146307	0.271513656
10~14年 15年以上	P 値	0.537526873	0.370929171	0.008288273	#DIV/0!	0.000809421	0.038907389	0.112715623
10~14年 透析歴不明	P 値	#DIV/0!	0.867702326	0.74829448	#DIV/0!	0.741847387	0.170941785	0.842770117
15年以上 透析歴不明	P 値	#DIV/0!	0.740884118	0.901873142	#DIV/0!	0.818025398	0.320350843	0.946354483
		除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
10年未満 10~14年	P 値	0.000494294	8.20132E-10	0.002221484	7.90206E-14	9.46505E-06	1.95211E-10	
10年未満 15年以上	P 値	7.47243E-05	8.37743E-33	4.66128E-12	2.80843E-27	2.68114E-08	1.2536E-17	
10年未満 透析歴不明	P 値	0.070664181	0.174946745	0.031422364	0.159260895	0.022116826	0.052506137	
10~14年 15年以上	P 値	0.892220092	7.72432E-05	0.007478203	0.038540905	0.540122226	0.193628125	
10~14年 透析歴不明	P 値	0.20426743	0.643453012	0.101095862	0.748860301	0.122808532	0.352641923	
15年以上 透析歴不明	P 値	0.222610399	0.836370436	0.27882239	0.971677721	0.185320206	0.528778612	

表5-1 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計—40歳未満—透析歴10年未満—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	321	321	321	321	72	12	73
合計	10,699	1,408.00	277,587	800,601	9,360	960	32,850
平均	33.33021807	4.386292835	864.7570093	2494.084112	130	80	450
標準偏差	5.171737161	2.788580334	90.89900039	226.3796916	0	0	0
標準誤差	0.28865822	0.155643377	5.073487458	12.63528225	0	0	0
中央値(メジアン)	35	4.1	923	2355	130	80	450
最頻値(モード)	39	2.06	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	28	6	132	19	181	185	216
合計	8,232	1,044	8,250	34,036	39,184	395,796	264,001
平均	294	174	62.5	1791.368421	216.4861878	2139.437838	1222.226852
標準偏差	0	0	99.97041547	956.4678778	120.2795174	1627.185025	1531.344826
標準誤差	0	0	8.701307795	219.4287801	8.94030612	119.6330223	104.1948179
中央値(メジアン)	294	174	20	1810	198	1852	482.5
最頻値(モード)	294	174	10	820	168	2496	52
	うちVD <sub>3</sub>	40：処置	I型(230)	I型(207)	II型(166)	II型(188)	III型(171)
標本数	98	321	2	2	4	19	5
合計	221,135	11,114,331	3,680	4,761	8,632	44,180	9,063
平均	2256.479592	34624.08411	1840	2380.5	2158	2325.263158	1812.6
標準偏差	1048.661722	1985.80727	1626.345597	439.1133111	0	281.7250121	917.682298
標準誤差	105.9308307	110.8369535	1150	310.5	0	64.63215041	410.4
中央値(メジアン)	2223	35605	1840	2380.5	2158	2444	2223
最頻値(モード)	2223	36205	#N/A	#N/A	2158	2444	2223
	III型(222)	IV型(224)	IV型(235)	V型(262)	V型(266)	特定積層型	ダイア計
標本数	72	17	202	1	12	1	321
合計	194,472	48,160	594,315	3,406	39,634	10,296	960,599
平均	2701	2832.941176	2942.153465	3406	3302.833333	10296	2992.520249
標準偏差	495.707433	325.96788	447.9777016	#DIV/0!	537.5131006	#DIV/0!	461.3634011
標準誤差	58.41968123	79.05882353	31.51960109	0	155.1666667	0	25.75079395
中央値(メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
最頻値(モード)	2886	2912	3055	#N/A	3458	#N/A	3055
	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うちPTA
標本数	198	28	125	2	1	90	0
合計	696,600	43,680	40,363	6,840	1,500	11,288	0
平均	3518.181818	1560	322.904	3420	1500	125.4222222	#DIV/0!
標準偏差	860.098405	0	1927.526919	2234.457429	#DIV/0!	20.71691367	#DIV/0!
標準誤差	61.12453203	0	172.4032488	1580	0	2.183754442	65535
中央値(メジアン)	3900	1560	130	3420	1500	130	#NUM!
最頻値(モード)	3900	1560	130	#N/A	#N/A	130	#N/A
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	0	40	130	56	102	255	246
合計	0	27,838	45,713	23,103	22,531	40,730	13,510
平均	#DIV/0!	695.95	351.6384615	412.5535714	220.8921569	159.7254902	54.91869919
標準偏差	#DIV/0!	3347.481089	337.8521534	389.2940893	166.2732992	435.780433	84.1141201
標準誤差	65535	529.2832332	29.63159405	52.02161089	16.46350987	27.28962927	5.362920421
中央値(メジアン)	#NUM!	104	256	350	233.5	60	60
最頻値(モード)	#N/A	104	256	530	256	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	25	153	150	0	321	321	321
合計	22,002	40,205	40,205	0	13,043,623	12,347,023	12,999,943
平均	880.08	262.7777778	268.0333333	#DIV/0!	40634.33956	38464.24611	40498.2648
標準偏差	642.7782095	141.1527365	137.5032113	#DIV/0!	3239.218833	2773.118814	3170.67637
標準誤差	128.5556419	11.41152239	11.22709019	65535	180.7955649	154.7803987	176.9698977
中央値(メジアン)	1135	272	272	#NUM!	40189	37908	40179
最頻値(モード)	129	310	310	#N/A	39573	35669	39573
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	321	321	321	321	321	321	
合計	12,303,343	13,003,260	12,306,400	12,959,320	12,262,720	12,228,684	
平均	38328.17134	40508.59813	38337.6947	40371.7134	38201.61994	38095.58879	
標準偏差	2655.800715	3011.779552	2431.022617	2942.905607	2301.584707	2274.012519	
標準誤差	148.232341	168.1011422	135.6864509	164.2569734	128.4619313	126.9230019	
中央値(メジアン)	37747	40169	37892	40128	37742	37714	
最頻値(モード)	35669	38836	35669	38836	35669	35669	

表 5-2 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計—40~64 歳—透析歴 10 年未満—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	2,623	2,623	2,623	2,623	604	45	564
合計	144,795	11,281.44	2,249,811	6,528,870	78,520	3,600	251,325
平均	55.20205871	4.300968357	857.7243614	2489.085017	130	80	445.6117021
標準偏差	6.192836493	2.63494892	89.89607041	221.9000762	7.486859688	0	31.14208437
標準誤差	0.120917864	0.05144854	1.755260432	4.332696876	0.304636	0	1.311318309
中央値 (メジアン)	56	4.06	923	2385	130	80	450
最頻値 (モード)	58	1.06	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	180	76	1,147	366	1,581	1,603	1,563
合計	52,185	13,050	84,175	642,092	340,616	3,368,124	1,528,586
平均	289.9166667	171.7105263	73.38709677	1754.349727	215.4433903	2101.137867	977.9820857
標準偏差	24.22471036	14.01885948	123.312399	870.5837645	118.9161075	1461.991463	1611.89823
標準誤差	1.805603304	1.608073468	3.641036546	45.50614235	2.990713079	36.51556925	40.77163516
中央値 (メジアン)	294	174	20	1580	198	1875	164
最頻値 (モード)	294	174	10	950	168	30	52
	うち VD <sub>3</sub>	40：処置	I 型(230)	I 型(207)	II 型(166)	II 型(188)	III 型(171)
標本数	471	2,623	20	11	51	156	30
合計	958,974	88,918,663	57,730	29,601	105,244	361,712	64,296
平均	2036.038217	33899.60465	2886.5	2691	2063.607843	2318.666667	2143.2
標準偏差	920.8984481	1973.021634	462.8660713	0	394.5843422	403.6860699	377.6801603
標準誤差	42.43276064	38.52411777	103.5	0	55.25285959	32.32075254	68.95464776
中央値 (メジアン)	2041	33254	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値 (モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	III 型(222)	IV 型(224)	IV 型(235)	V 型(262)	V 型(266)	特定積層型	ダイヤ計
標本数	630	245	1,487	7	103	25	2,620
合計	1,676,544	696,192	4,315,070	23,842	339,682	257,400	7,927,313
平均	2661.180952	2841.6	2901.862811	3406	3297.883495	10296	3025.691985
標準偏差	554.7633669	382.3198215	528.492638	0	613.554723	0	749.4401292
標準誤差	22.10230159	24.42551743	13.70513941	0	60.45534323	0	14.64152449
中央値 (メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
最頻値 (モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うち PTA
標本数	967	506	1,172	21	6	815	8
合計	3,327,900	780,360	497,112	111,899	12,714	101,203	227,393
平均	3441.468459	1542.213439	424.1569966	5328.52381	2119	124.1754601	28424.125
標準偏差	996.6232401	142.2751549	2974.599885	5334.512364	2297.895559	20.31042594	8179.118315
標準誤差	32.04924279	6.324902115	86.88899039	1164.086034	938.1119336	0.711443191	2891.755012
中央値 (メジアン)	3900	1560	130	3130	800	130	29393
最頻値 (モード)	3900	1560	130	3130	800	130	34821
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	3	384	1,305	563	1,020	2,097	2,047
合計	75,915	84,002	430,121	260,329	167,074	426,387	104,141
平均	25305	218.7552083	329.594636	462.3960924	163.7980392	203.3319027	50.87493894
標準偏差	22866.58811	1171.213253	404.2875262	467.0666825	141.9309788	644.5822797	35.81145631
標準誤差	13202.0308	59.76822602	11.1914172	19.68451375	4.444031329	14.07599639	0.791522129
中央値 (メジアン)	21399	104	200	350	112	60	60
最頻値 (モード)	#N/A	104	55	150	55	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	273	1,164	1,143	0	2,623	2,623	2,623
合計	294,010	344,682	325,262	0	104,899,277	101,571,377	104,118,917
平均	1076.959707	296.1185567	284.5686789	#DIV/0!	39992.0995	38723.36142	39694.59283
標準偏差	1236.701321	251.7598243	198.9234563	#DIV/0!	3849.163823	3579.340879	3744.64646
標準誤差	74.84856889	7.379211137	5.883867461	65535	75.15662166	69.88820966	73.11587405
中央値 (メジアン)	798	266	266	#NUM!	39622	37954	39336
最頻値 (モード)	601	170	170	#N/A	40487	36587	40487
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623	
合計	100,791,017	104,402,165	101,069,627	103,617,167	100,289,267	99,647,175	
平均	38425.85475	39802.57911	38532.07282	39503.30423	38234.56615	37989.77316	
標準偏差	3414.895407	3251.630703	2906.602765	3134.669855	2708.419909	2575.469857	
標準誤差	66.67733926	63.4895239	56.7527012	61.20581174	52.88309352	50.2871851	
中央値 (メジアン)	37648	39549	37900	39266	37589	37399	
最頻値 (モード)	36587	40487	36587	40487	36587	36036	

表5-3 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計—65～69歳—透析歴10年未満—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	801	801	801	801	182	10	214
合計	53,578	3,297.46	689,671	2,015,864	23,660	800	94,275
平均	66.88888889	4.116679151	861.0124844	2516.684145	130	80	440.5373832
標準偏差	1.44270194	2.682946227	87.7061705	237.9673536	0	0	45.26723991
標準誤差	0.050975367	0.094797244	3.09894516	8.40816301	0	0	3.094404816
中央値(メジアン)	67	4.02	923	2435	130	80	450
最頻値(モード)	65	3.06	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	49	22	376	128	503	508	471
合計	13,818	3,741	33,265	241,148	114,402	1,042,862	562,344
平均	282	170.0454545	88.47074468	1883.96875	227.4393638	2052.877953	1193.936306
標準偏差	40.66632514	18.54846232	121.4478838	1424.092395	116.8897896	1322.102143	2307.764644
標準誤差	5.809475019	3.954545455	6.263196382	125.8731737	5.211858117	58.65879712	106.3361817
中央値(メジアン)	294	174	30	1672	210	1894.5	162
最頻値(モード)	294	174	10	1220	168	30	52
	うちVD <sub>3</sub>	40：処置	I型(230)	I型(207)	II型(166)	II型(188)	III型(171)
標本数	112	801	18	4	36	59	17
合計	199,847	26,545,643	52,900	10,764	74,036	139,308	36,252
平均	1784.348214	33140.62797	2938.888889	2691	2056.555556	2361.152542	2132.470588
標準偏差	742.124728	1846.756027	216.8460796	0	409.0819299	349.580281	373.2623269
標準誤差	70.12419543	65.25191579	51.11111111	0	68.18032166	45.51147609	90.52941176
中央値(メジアン)	1729	32305	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値(モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	III型(222)	IV型(224)	IV型(235)	V型(262)	V型(266)	特定積層型	ダイア計
標本数	179	112	379	3	21	5	798
合計	492,174	314,496	1,106,850	10,218	69,426	51,480	2,357,904
平均	2749.575419	2808	2920.448549	3406	3306	10296	2954.766917
標準偏差	455.8164901	437.7198907	520.2725521	0	580.1692856	0	638.7414506
標準誤差	34.06932406	41.36064195	26.7246059	0	126.6033175	0	22.61120225
中央値(メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	2990
最頻値(モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うちPTA
標本数	102	193	356	2	0	241	0
合計	353,100	301,080	56,846	3,400	0	30,001	0
平均	3461.764706	1560	159.6797753	1700	#DIV/0!	124.4854772	#DIV/0!
標準偏差	1012.891569	0	788.0412041	2022.325394	#DIV/0!	20.9791761	#DIV/0!
標準誤差	100.2912098	0	41.76610029	1430	65535	1.35138753	65535
中央値(メジアン)	3900	1560	130	1700	#NUM!	130	#NUM!
最頻値(モード)	3900	1560	130	#N/A	#N/A	130	#N/A
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	1	122	428	201	329	660	648
合計	14,978	12,517	151,478	102,953	48,198	113,881	34,178
平均	14978	102.5983607	353.9205607	512.2039801	146.4984802	172.5469697	52.74382716
標準偏差	#DIV/0!	34.31903306	454.5804389	525.4180651	137.5099802	452.0948937	37.03595887
標準誤差	0	3.107099262	21.97297487	37.06013287	7.581170616	17.59776987	1.45490987
中央値(メジアン)	14978	104	195.5	360	56	78	60
最頻値(モード)	#N/A	104	55	150	55	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	85	326	321	0	801	801	801
合計	79,515	98,216	90,076	0	31,530,643	31,177,543	31,229,563
平均	935.4705882	301.2760736	280.6105919	#DIV/0!	39364.09863	38923.27466	38988.21848
標準偏差	836.7553063	264.3507644	159.4561296	#DIV/0!	3564.188758	3378.019336	3426.298272
標準誤差	90.75885584	14.64103472	8.899973269	65535	125.9344176	119.3564445	121.0622968
中央値(メジアン)	601	249	250	#NUM!	38521	38143	38182
最頻値(モード)	129	310	310	#N/A	36587	36587	36587
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	801	801	801	801	801	801	
合計	30,876,463	31,473,797	31,120,047	31,172,067	30,818,967	30,577,819	
平均	38547.39451	39293.12984	38851.49438	38916.4382	38475.61423	38174.55556	
標準偏差	3201.901744	3500.05108	3326.183686	3358.349728	3145.035379	2949.360649	
標準誤差	113.1336353	123.6682242	117.5249218	118.6614531	111.1243612	104.2105345	
中央値(メジアン)	37778	38441	38073	38145	37756	37498	
最頻値(モード)	36587	36322	36322	36322	36322	36322	



表 5-4 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計—70 歳以上—透析歴 10 年未満—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	1,743	1,743	1,743	1,743	363	21	447
合計	133,960	6,770.79	1,493,888	4,407,816	47,320	1,680	199,125
平均	76.85599541	3.884561102	857.0786001	2528.86747	130.3581267	80	445.4697987
標準偏差	5.210651837	2.55156095	86.9754582	249.7154114	6.823230454	0	31.63877334
標準誤差	0.12480827	0.061116328	2.083281858	5.981314693	0.358126722	0	1.496462629
中央値 (メジアン)	76	3.11	923	2435	130	80	450
最頻値 (モード)	71	1.07	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	158	54	794	208	990	999	1,060
合計	45,864	9,222	86,990	388,812	221,485	1,901,728	1,123,239
平均	290.278481	170.7777778	109.559194	1869.288462	223.7222222	1903.631632	1059.659434
標準偏差	23.16484087	16.58445131	160.4462398	1679.037936	117.2252531	1187.923462	2004.117402
標準誤差	1.842895789	2.256857965	5.694023985	116.4203341	3.725663112	37.58423507	61.55597669
中央値 (メジアン)	294	174	30	1457.5	210	1710	169
最頻値 (モード)	294	174	10	300	168	30	52
	うち VD <sub>3</sub>	40：処置	I型(230)	I型(207)	II型(166)	II型(188)	III型(171)
標本数	190	1,743	110	33	95	145	63
合計	367,315	57,066,387	311,190	80,523	195,216	329,000	127,737
平均	1933.236842	32740.3253	2829	2440.090909	2054.905263	2268.965517	2027.571429
標準偏差	978.2741805	1162.5555	535.6055477	547.0774833	427.8198834	579.3088364	567.8551813
標準誤差	70.9714684	27.84613996	51.06798523	95.23396592	43.8933939	48.10898031	71.54302811
中央値 (メジアン)	1729	32305	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値 (モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	III型(222)	IV型(224)	IV型(235)	V型(262)	V型(266)	特定積層型	ダイア計
標本数	330	379	622	8	11	12	1,742
合計	913,086	1,089,088	1,875,300	24,628	35,112	123,552	5,104,432
平均	2766.927273	2873.583113	3014.951768	3078.5	3192	10296	2930.213548
標準偏差	472.1345445	249.7369311	1177.379216	926.3098834	882.2221942	0	943.8794908
標準誤差	25.99015129	12.82812448	47.20860557	327.5	266	0	22.61478557
中央値 (メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	2912
最頻値 (モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うち PTA
標本数	58	445	821	24	10	562	6
合計	167,400	691,505	322,735	56,342	17,408	69,810	95,074
平均	2886.206897	1553.94382	393.0998782	2347.583333	1740.8	124.2170819	15845.66667
標準偏差	1486.600771	87.50165501	2261.126653	1189.781599	1460.551783	20.60819957	7434.034669
標準誤差	195.2002443	4.147976257	78.91386431	242.8631519	461.8670275	0.869304432	3034.931945
中央値 (メジアン)	3900	1560	130	3130	1284	130	13999
最頻値 (モード)	3900	1560	130	3130	700	130	#N/A
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	6	270	895	455	634	1,404	1,387
合計	115,027	42,266	290,524	197,872	91,203	258,009	72,279
平均	19171.16667	156.5407407	324.6078212	434.8835165	143.8533123	183.767094	52.11175198
標準偏差	9210.358677	367.1973581	396.678482	454.001802	139.6848142	461.0375534	45.96618431
標準誤差	3760.113185	22.34691957	13.25949931	21.28393276	5.54759267	12.30418204	1.234241723
中央値 (メジアン)	15524.5	104	158	197	56	60	60
最頻値 (モード)	#N/A	104	55	60	55	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	188	813	788	1	1,743	1,743	1,743
合計	181,898	266,954	224,614	37,723	67,506,630	67,339,230	66,815,190
平均	967.5425532	328.3567036	285.0431472	37723	38730.13769	38634.09639	38333.44234
標準偏差	807.5510966	355.4723399	161.7677463	#DIV/0!	3277.64526	3250.839104	3086.623594
標準誤差	58.89671692	12.46695926	5.762737352	0	78.50788081	77.86580569	73.93242954
中央値 (メジアン)	759.5	266	266	37723	37972	37854	37486
最頻値 (モード)	129	310	310	#N/A	38162	38162	36039
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	1,743	1,743	1,743	1,743	1,743	1,743	
合計	66,647,725	67,183,895	66,999,445	66,475,405	66,308,005	65,919,193	
平均	38237.36374	38544.97705	38439.15376	38138.49971	38042.45841	37819.38784	
標準偏差	3052.707898	3031.378246	2992.40997	2810.580972	2780.972655	2575.423613	
標準誤差	73.12006296	72.60916395	71.67577533	67.32051166	66.61131769	61.68789909	
中央値 (メジアン)	37389	37884	37783	37406	37332	37155	
最頻値 (モード)	36039	38465	38465	36879	35795	35795	

表5-5 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計—75歳以上—透析歴10年未満—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	1,051	1,051	1,051	1,051	202	15	267
合計	84,212	4,013.30	899,346	2,654,558	26,390	1,200	119,025
平均	80.12559467	3.818553758	855.7050428	2525.745005	130.6435644	80	445.7865169
標準偏差	4.095923816	2.533311065	88.2311173	249.7494052	9.146768081	0	30.55777416
標準誤差	0.126342804	0.078142475	2.721575714	7.703766387	0.643564356	0	1.870105409
中央値(メジアン)	79	3.09	923	2435	130	80	450
最頻値(モード)	78	3.09	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	100	37	483	108	603	609	651
合計	28,959	6,264	50,165	191,504	130,689	1,126,398	639,229
平均	289.59	169.2972973	103.8612836	1773.185185	216.7313433	1849.586207	981.9185868
標準偏差	25.20265138	19.94417886	158.8422435	1674.577068	115.9915829	1153.610988	1913.463851
標準誤差	2.520265138	3.278802807	7.227572337	161.1362535	4.723542411	46.74667629	74.99456108
中央値(メジアン)	294	174	20	1411	200	1631	151
最頻値(モード)	294	174	10	300	84	30	52
	うちVD <sub>3</sub>	40：処置	I型(230)	I型(207)	II型(166)	II型(188)	III型(171)
標本数	112	1,051	87	28	61	91	48
合計	212,999	34,360,730	245,410	68,103	125,828	205,860	100,890
平均	1901.776786	32693.36822	2820.804598	2432.25	2062.754098	2262.197802	2101.875
標準偏差	1097.595363	1159.396314	558.4034933	584.4670649	402.595937	598.7540437	474.516669
標準誤差	103.7130132	35.76272121	59.86713847	110.4538931	51.54712765	62.7664785	68.49058164
中央値(メジアン)	1729	32305	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値(モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	III型(222)	IV型(224)	IV型(235)	V型(262)	V型(266)	特定積層型	ダイア計
標本数	189	250	318	6	5	8	1,051
合計	527,028	718,144	969,140	17,816	14,364	82,368	3,074,951
平均	2788.507937	2872.576	3047.610063	2969.333333	2872.8	10296	2925.738344
標準偏差	421.7596827	256.4056545	1608.193712	1069.610521	1308.54698	0	1108.491996
標準誤差	30.67850272	16.21651746	90.1830252	436.6666667	585.2	0	34.1925274
中央値(メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	2912
最頻値(モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うちPTA
標本数	23	261	485	17	8	327	4
合計	69,000	405,665	242,697	38,041	15,540	40,500	75,846
平均	3000	1554.272031	500.4061856	2237.705882	1942.5	123.853211	18961.5
標準偏差	1553.588222	92.53817686	2771.072225	1268.749274	1579.424669	22.39802756	6368.267713
標準誤差	323.9455378	5.727969349	125.827908	307.7168982	558.410947	1.238613754	3184.133857
中央値(メジアン)	3900	1560	130	3130	1450	130	18152.5
最頻値(モード)	3900	1560	130	3130	#N/A	130	#N/A
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	4	161	519	274	349	846	835
合計	84,200	27,386	168,939	115,668	52,074	161,213	44,270
平均	21050	170.0993789	325.5086705	422.1459854	149.2091691	190.5591017	53.01796407
標準偏差	11280.55474	392.2399968	373.37922	423.3741241	143.3118709	509.8401914	50.53755081
標準誤差	5640.277372	30.91284232	16.3895287	25.57696621	7.671308569	17.52866685	1.748924063
中央値(メジアン)	15552.5	104	172	210	58	60	60
最頻値(モード)	#N/A	104	55	60	55	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	109	486	472	1	1,051	1,051	1,051
合計	113,131	160,664	135,104	37,723	40,575,233	40,506,233	40,169,633
平均	1037.899083	330.5843621	286.2372881	37723	38606.31113	38540.65937	38220.39296
標準偏差	936.3695154	361.8709232	162.0845329	#DIV/0!	3258.167153	3233.394917	3081.247008
標準誤差	89.68793345	16.41479842	7.460545347	0	100.5013749	99.73725086	95.04409875
中央値(メジアン)	819	268	266	37723	37806	37751	37334
最頻値(モード)	129	310	310	#N/A	36797	36797	36797
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	
合計	40,100,568	40,332,536	40,262,561	39,925,961	39,856,961	39,665,457	
平均	38154.67935	38375.39106	38308.81161	37988.5452	37922.89343	37740.68221	
標準偏差	3051.561331	2931.701722	2921.319213	2751.245928	2735.463942	2579.843652	
標準誤差	94.1284148	90.43122712	90.11096841	84.86489041	84.37807952	79.57781838	
中央値(メジアン)	37286	37729	37669	37263	37199	37052	
最頻値(モード)	36797	36879	36879	36879	36879	36879	

表 5-7-1 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計一透析歴 10 年未満一TTEST=P 値一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)	
40 歳未満 40～64 歳	P 値	0	0.586423119	0.186473498	0.703861132	1	#DIV/0!	0.229374604
40 歳未満 65～69 歳	P 値	0	0.132837358	0.522583434	0.145229066	#DIV/0!	#DIV/0!	0.075492594
40 歳未満 70 歳以上	P 値	0	0.001445316	0.149109047	0.02012899	0.656578173	#DIV/0!	0.222117098
40 歳未満 75 歳以上	P 値	0	0.000620384	0.110413145	0.042482195	0.551459234	#DIV/0!	0.240090425
40～64 歳 65～69 歳	P 値	0	0.084597133	0.362255084	0.002477666	1	#DIV/0!	0.076083504
40～64 歳 70 歳以上	P 値	0	2.33515E-07	0.813848968	3.67638E-08	0.456869549	#DIV/0!	0.943054243
40～64 歳 75 歳以上	P 値	0	4.16942E-07	0.536240875	1.32312E-05	0.318612201	#DIV/0!	0.939421139
65～69 歳 70 歳以上	P 値	0	0.036130957	0.290716184	0.246222621	0.479400953	#DIV/0!	0.105480028
65～69 歳 75 歳以上	P 値	0	0.014555632	0.198669592	0.429987155	0.343178945	#DIV/0!	0.130930891
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射	
40 歳未満 40～64 歳	P 値	0.374441583	0.691872075	0.328290247	0.857370505	0.911135807	0.73894081	0.035885573
40 歳未満 65～69 歳	P 値	0.123680975	0.610849679	0.027702226	0.78448827	0.283747318	0.4748475	0.869537478
40 歳未満 70 歳以上	P 値	0.397425586	0.638477721	0.001134135	0.842372746	0.447108313	0.020163341	0.26000616
40 歳未満 75 歳以上	P 値	0.357625289	0.57060569	0.004648136	0.963437837	0.980281206	0.007107805	0.094092749
40～64 歳 65～69 歳	P 値	0.086122314	0.650361226	0.038993994	0.22633038	0.047985334	0.507394081	0.022338483
40～64 歳 70 歳以上	P 値	0.888879117	0.729692096	2.33075E-08	0.280868	0.084257977	0.00033169	0.249135732
40～64 歳 75 歳以上	P 値	0.91520881	0.458435645	3.24236E-05	0.876406444	0.819809177	0.000138086	0.96055311
65～69 歳 70 歳以上	P 値	0.074606041	0.866506897	0.023991989	0.934420741	0.562227424	0.026696908	0.248885654
65～69 歳 75 歳以上	P 値	0.163878055	0.886843567	0.119726038	0.583350467	0.127941431	0.006171978	0.093512302
	うち VD <sub>s</sub>	40：処置	I 型(230)	I 型(207)	II 型(166)	II 型(188)	III 型(171)	
40 歳未満 40～64 歳	P 値	0.035881548	6.2214E-10	0.024371139	0.011030721	0.637211447	0.944974456	0.160661391
40 歳未満 65～69 歳	P 値	0.000189854	8.03613E-31	0.003408256	0.177807806	0.62676842	0.68556264	0.248577878
40 歳未満 70 歳以上	P 値	0.010029364	9.4072E-108	0.014030988	0.881371395	0.632597322	0.677697812	0.439529814
40 歳未満 75 歳以上	P 値	0.01796158	8.38816E-90	0.020685445	0.90383033	0.640199376	0.655311618	0.244682283
40～64 歳 65～69 歳	P 値	0.007318209	7.67332E-22	0.663706278	#DIV/0!	0.935737017	0.476427501	0.925549843
40～64 歳 70 歳以上	P 値	0.202545285	8.898E-103	0.653346674	0.138736795	0.904379443	0.385817846	0.314083853
40～64 歳 75 歳以上	P 値	0.182639116	1.09268E-73	0.62624454	0.15371476	0.991022241	0.377840334	0.687737585
65～69 歳 70 歳以上	P 値	0.165100302	4.03627E-11	0.39323916	0.371147902	0.984119865	0.255717962	0.474237076
65～69 歳 75 歳以上	P 値	0.349281601	2.3105E-10	0.380521712	0.389577094	0.942100221	0.25278302	0.810811622
	III 型(222)	IV 型(224)	IV 型(235)	V 型(262)	V 型(266)	特定積層型	ダイア計	
40 歳未満 40～64 歳	P 値	0.560109832	0.927508169	0.30120779	#DIV/0!	0.978704082	#DIV/0!	0.438309105
40 歳未満 65～69 歳	P 値	0.457285593	0.822092326	0.615894036	#DIV/0!	0.987750766	#DIV/0!	0.335931482
40 歳未満 70 歳以上	P 値	0.288016716	0.517848989	0.390846992	#DIV/0!	0.716914479	#DIV/0!	0.247276896
40 歳未満 75 歳以上	P 値	0.155218249	0.545326336	0.363480326	#DIV/0!	0.3387691	#DIV/0!	0.293116914
40～64 歳 65～69 歳	P 値	0.051226244	0.462470865	0.539892232	#DIV/0!	0.955643393	#DIV/0!	0.015611184
40～64 歳 70 歳以上	P 値	0.003274461	0.206630235	0.002368163	0.368846292	0.604202315	#DIV/0!	0.000210159
40～64 歳 75 歳以上	P 値	0.003684058	0.289392699	0.004415439	0.299689948	0.158318494	#DIV/0!	0.001614534
65～69 歳 70 歳以上	P 値	0.688791549	0.044591543	0.139993606	0.568321759	0.662848515	#DIV/0!	0.504150264
65～69 歳 75 歳以上	P 値	0.395331082	0.079861855	0.147052852	0.516489552	0.258550921	#DIV/0!	0.508638877

表 5-7-2 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計一透析歴 10 年未満一TTEST=P 値一

		夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うち PTA
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.313264849	0.508942108	0.709765623	0.626958934	#DIV/0!	0.581400189	#DIV/0!
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.613205339	#DIV/0!	0.188622122	0.504324825	#DIV/0!	0.717083321	#DIV/0!
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	5.7348E-05	0.714624396	0.741993357	0.255504857	#DIV/0!	0.606941996	#DIV/0!
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.014327946	0.743885417	0.499866519	0.255807679	#DIV/0!	0.550279131	#DIV/0!
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.845184201	0.08300626	0.097192384	0.35865559	#DIV/0!	0.836359617	#DIV/0!
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	7.15384E-05	0.132250764	0.800756868	0.01074627	0.691020824	0.970369365	0.011993534
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.039002692	0.215207832	0.62829642	0.025500427	0.867120739	0.814082189	0.071956375
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.004220824	0.336867905	0.057935826	0.483300077	#DIV/0!	0.866444929	#DIV/0!
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.078833076	0.39042505	0.024470829	0.594268269	#DIV/0!	0.732849101	#DIV/0!
		うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	#DIV/0!	0.057864901	0.547887781	0.440306705	0.000146419	0.293197748	0.169551328
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	#DIV/0!	0.050545034	0.957786357	0.187664636	7.53484E-06	0.697754382	0.59225109
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.01068832	0.46013125	0.724692766	6.25009E-07	0.439996366	0.448013113
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.052070621	0.46761516	0.87570629	2.28284E-05	0.382198317	0.661571813
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	#DIV/0!	0.2742361	0.295416287	0.209911079	0.052961035	0.253680689	0.250974769
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.56828453	0.398979319	0.774606938	0.344299332	0.005242217	0.32638867	0.376667097
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.754981695	0.606821136	0.842320158	0.228316166	0.098479565	0.606590358	0.199054252
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.106410462	0.231055572	0.056052927	0.779400488	0.603918659	0.759174664
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.059183475	0.291227104	0.039315641	0.801871178	0.475006986	0.907663859
		うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.432810645	0.108755234	0.323629671	#DIV/0!	0.004165472	0.21075173	0.000231256
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.760814374	0.091459908	0.405768599	#DIV/0!	3.88675E-08	0.030972057	1.55748E-11
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.603814483	0.024798664	0.227610671	#DIV/0!	2.60971E-21	0.379498879	1.05991E-29
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.425464231	0.02396157	0.215161385	#DIV/0!	7.40483E-22	0.702084607	2.40139E-29
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.324628501	0.746495562	0.742889578	#DIV/0!	4.03911E-05	0.161139796	1.97393E-06
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.286794088	0.018342144	0.955754638	#DIV/0!	6.16382E-29	0.402751179	9.23966E-36
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.766338914	0.027132589	0.871768441	#DIV/0!	1.71566E-24	0.150945644	3.19748E-29
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.764069616	0.213643027	0.677835766	#DIV/0!	1.09477E-05	0.039670583	1.70089E-06
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.429545237	0.20991625	0.629232355	#DIV/0!	2.08182E-06	0.013433342	4.59782E-07
		除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.620990182	0.000218973	0.250278835	2.52247E-06	0.834541619	0.481919952	
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.277715673	5.74934E-08	0.012161717	1.83026E-11	0.157015215	0.666513464	
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.617642718	6.20213E-26	0.566320418	4.0499E-37	0.33405097	0.072527259	
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.358828428	1.5368E-28	0.872175311	2.32349E-38	0.098099872	0.02687434	
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.371191547	0.000140831	0.008607302	5.30664E-06	0.034078979	0.086270649	
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.062616499	3.73905E-37	0.306679459	1.24753E-47	0.023207575	0.032341955	
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.02510341	2.10839E-34	0.035707676	1.14378E-41	0.001684478	0.008131073	
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.019229328	4.16364E-08	0.001861914	1.32154E-09	0.000475936	0.002070667	
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.007300349	1.04609E-09	0.000198128	8.37458E-11	5.65343E-05	0.000769921	

表 5-13-1 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計一透析歴 10~14 年—TTEST=P 値—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)	
40 歳未満 40~64 歳	P 値	7.3058E-134	0.015976622	0.602343584	0.546090328	0.742352258	#DIV/0!	0.64573743
40 歳未満 65~69 歳	P 値	1.6811E-232	0.03684831	0.901847856	0.032483853	0.540211836	#DIV/0!	#DIV/0!
40 歳未満 70 歳以上	P 値	2.9612E-257	0.008495969	0.324826249	0.026081436	#DIV/0!	#DIV/0!	0.656841435
40 歳未満 75 歳以上	P 値	2.0726E-215	0.008024903	0.617757936	0.210420606	#DIV/0!	#DIV/0!	0.556348872
40~64 歳	P 値	9.7874E-162	0.523010767	0.691451116	0.028694266	#DIV/0!	#DIV/0!	0.539642188
40~64 歳	P 値	0	4.04097E-05	0.791230234	0.150334976	#DIV/0!	#DIV/0!	0.675641511
70 歳以上	P 値	2.2517E-281	0.508405618	0.965934446	0.253153171	0.689525737	#DIV/0!	0.672873965
75 歳以上	P 値	4.21607E-92	0.632759715	0.276711569	0.803765679	0.264389874	#DIV/0!	0.436283972
75 歳以上	P 値	6.1917E-140	0.494632915	0.647937227	0.225792357	0.456060592	#DIV/0!	0.301275722
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射	
40 歳未満 40~64 歳	P 値	0.193827961	#DIV/0!	0.353135518	#DIV/0!	0.251028693	0.716852203	0.537757735
40 歳未満 65~69 歳	P 値	0.271829213	#DIV/0!	0.241914011	#DIV/0!	0.027209307	0.720593451	0.885736367
40 歳未満 70 歳以上	P 値	0.103077472	#DIV/0!	0.030499991	#DIV/0!	0.048529039	0.455786798	0.781040356
40 歳未満 75 歳以上	P 値	0.271829213	#DIV/0!	0.18654438	#DIV/0!	0.065129769	0.133042924	0.924868733
40~64 歳	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.045115521	0.768135989	0.016428836	0.196789746	0.618031859
40~64 歳	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.069666319	0.803971642	0.069925131	0.249255148	0.238862357
75 歳以上	P 値	0.625985258	#DIV/0!	0.629760744	0.47211485	0.208654013	0.07731417	0.527825115
65~69 歳	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.28891964	0.838812427	0.56598288	0.16210214	0.608106708
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.881786767	0.896292186	0.602945602	0.035731704	0.95605333
	うち VD <sub>s</sub>	40：処置	I 型(230)	I 型(207)	II 型(166)	II 型(188)	III 型(171)	
40 歳未満 40~64 歳	P 値	0.639211334	0.005599699	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.408804292	#DIV/0!
40 歳未満 65~69 歳	P 値	0.301736131	8.92563E-08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.478068032	#DIV/0!
40 歳未満 70 歳以上	P 値	0.156759075	1.59934E-18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.319688844	#DIV/0!
40 歳未満 75 歳以上	P 値	0.071162421	5.96309E-18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.24621087	#DIV/0!
40~64 歳	P 値	0.469512457	0.000734942	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.617404436	0.058469603
40~64 歳	P 値	0.059971295	2.32839E-14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.004726269	0.289181164
75 歳以上	P 値	0.061866368	2.33222E-15	0.239792534	0.325065665	#DIV/0!	0.231754843	0.457687905
65~69 歳	P 値	0.901240686	0.001855093	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.35429771	0.634937555
70 歳以上	P 値	0.569344332	0.000463877	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.231135992	0.605917033
	III 型(222)	IV 型(224)	IV 型(235)	V 型(262)	V 型(266)	特定積層型	ダイア計	
40 歳未満 40~64 歳	P 値	0.088495489	#DIV/0!	0.827878007	#DIV/0!	0.379938246	#DIV/0!	0.70266312
40 歳未満 65~69 歳	P 値	0.808894716	#DIV/0!	0.347134624	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.264812972
40 歳未満 70 歳以上	P 値	0.001219052	0.721559621	0.63382757	#DIV/0!	0.200394198	#DIV/0!	0.886487606
40 歳未満 75 歳以上	P 値	0.026401757	0.684773244	0.455734901	#DIV/0!	0.052356306	#DIV/0!	0.617552874
40~64 歳	P 値	0.61051749	0.299032906	0.861761954	#DIV/0!	0.482476214	#DIV/0!	0.571809964
40~64 歳	P 値	0.382499058	0.241107344	0.913458762	#DIV/0!	0.600750653	#DIV/0!	0.141612122
70 歳以上	P 値	0.174486012	0.104345591	0.493640392	#DIV/0!	0.002667209	#DIV/0!	0.193133218
75 歳以上	P 値	0.004472056	0.312126292	0.652869373	#DIV/0!	0.200394198	#DIV/0!	0.75466365
65~69 歳	P 値	0.053035234	0.24750314	0.942039321	#DIV/0!	0.052356306	#DIV/0!	0.865162339

表 5-13-2 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計一透析歴 10～14 年—TTEST=P 値—

		夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うち PTA
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.427242296	0.778781495	0.086410034	0.035702697	#DIV/0!	0.834386986	#DIV/0!
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.25816416	#DIV/0!	0.144555515	0.399578827	#DIV/0!	0.948488046	#DIV/0!
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.257386235	#DIV/0!	0.24924973	0.246278012	#DIV/0!	0.534546311	#DIV/0!
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.196916182	#DIV/0!	0.356336556	0.335601213	#DIV/0!	0.921218891	#DIV/0!
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.481024804	0.548700896	0.832658493	0.320567472	0.290748005	0.660276911	#DIV/0!
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.096156316	0.534981248	0.986369252	0.368089644	#DIV/0!	0.165869856	#DIV/0!
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.406220412	0.49951429	0.755025204	0.712997057	#DIV/0!	0.915271005	#DIV/0!
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.916608459	#DIV/0!	0.394835979	0.753168447	#DIV/0!	0.361508081	#DIV/0!
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.697640236	#DIV/0!	0.409777901	0.836276225	#DIV/0!	0.843012621	#DIV/0!
		うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	#DIV/0!	0.546262378	0.150211181	0.461118414	0.201055171	0.251336902	0.351170411
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	#DIV/0!	0.77314824	0.199470228	0.304886325	0.323640761	0.315001588	0.041661176
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.624532059	0.726256625	0.818028426	0.858457677	0.358420244	0.95888862
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.534473207	0.856192653	0.803969949	0.435099585	0.402426178	0.965321167
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	#DIV/0!	0.475543808	0.014733601	0.114541083	0.355938475	0.307274259	0.676202561
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.791665259	0.044927562	0.470273831	0.135152371	0.341339971	0.605844248
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.420469537	0.092229907	0.472884454	0.010222455	0.669759436	0.156976624
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.851131155	0.034951547	0.066309554	0.306914584	0.713102167	0.005602239
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.640183191	0.09832607	0.158129003	0.051661039	0.722905121	0.010718742
		うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.044131454	0.235470585	0.190401595	#DIV/0!	0.018206465	0.471901237	0.010414985
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.058615162	0.138879718	0.176996408	#DIV/0!	0.070549621	0.456830322	0.030300209
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.052463651	0.046963379	0.056553698	#DIV/0!	0.000934659	0.705367492	0.000145108
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.134584701	0.113706761	0.164722276	#DIV/0!	0.000346601	0.996240822	4.39513E-05
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.601722811	0.006776533	0.002553607	#DIV/0!	0.622674409	0.001798155	0.14535606
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.971233908	0.000122055	0.035772853	#DIV/0!	0.001642416	0.001744757	2.5515E-05
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.659637132	0.143406899	0.770529483	#DIV/0!	0.000105257	0.336510668	3.33436E-06
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.606711301	0.775189385	0.381480612	#DIV/0!	0.056839262	0.588161497	0.034821193
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.555372647	0.511719927	0.847709199	#DIV/0!	0.014194437	0.353128975	0.006000564
		除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.352636339	0.095933068	0.817997963	0.062116478	0.976024726	0.836766061	
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.671148181	0.179350535	0.076071369	0.075726065	0.150983602	0.295170655	
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.931037323	0.000530131	0.264007166	4.59929E-05	0.577947337	0.801969857	
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.627620241	4.20187E-05	0.509433379	1.82652E-06	0.987355244	0.639089544	
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.027895322	0.511656578	0.001777058	0.096530153	0.03142259	0.0344576	
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.031669391	0.000600295	0.001582318	5.64864E-06	0.034394012	0.047097041	
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.80708673	1.34193E-05	0.437374282	2.16132E-07	0.990109965	0.615014705	
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.473621942	0.014782433	0.330735623	0.00731419	0.235817882	0.30813332	
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.238087556	0.002866592	0.179307902	0.000890342	0.101216717	0.08651705	

表 5-19-1 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計一透析歴 15 年以上—TTEST=P 値—

		年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	5.4241E-112	8.70068E-09	0.775154251	0.906524438	#DIV/0!	#DIV/0!	0.403913991
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	9.0559E-277	1.84729E-07	0.933386331	0.267394974	#DIV/0!	#DIV/0!	0.514305387
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	4.1189E-201	2.81332E-05	0.926589328	0.438546436	#DIV/0!	#DIV/0!	0.350305806
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	9.6083E-149	0.006673307	0.948971546	0.835706828	#DIV/0!	#DIV/0!	0.456184517
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	9.7874E-162	0.523010767	0.691451116	0.028694266	#DIV/0!	#DIV/0!	0.539642188
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0	4.04097E-05	0.791230234	0.150334976	#DIV/0!	#DIV/0!	0.675641511
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	6.3744E-254	1.15619E-06	0.846420627	0.860233825	#DIV/0!	#DIV/0!	0.872020177
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	2.0754E-114	0.005259	0.946167794	0.53934497	#DIV/0!	#DIV/0!	0.408054878
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	9.7162E-173	6.92376E-05	0.967343515	0.239873896	#DIV/0!	#DIV/0!	0.810321652
		特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.160931779	#DIV/0!	0.944187664	0.655059102	0.235810098
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.029462773	#DIV/0!	0.224267451	0.306725505	0.212519746
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.028249609	#DIV/0!	0.346288334	0.866328599	0.212803151
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.211923933	#DIV/0!	0.403869103	0.641833677	0.199695887
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.045115521	0.768135989	0.016428836	0.196789746	0.618031859
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.069666319	0.803971642	0.069925131	0.249255148	0.238862357
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.963551153	0.449895574	0.201575519	0.218192363	0.40643364
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.862629673	0.650642753	0.626608621	0.056734845	0.650801085
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.231759288	0.409398343	0.721207066	0.076824182	0.731435973
		うち VD <sub>s</sub>	40：処置	I 型(230)	I 型(207)	II 型(166)	II 型(188)	III 型(171)
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.497269972	0.700972341	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.31595132	0.065829288	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.496953751
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.729127031	7.16964E-05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.699938606
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.822419772	8.253E-09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.661780331
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.469512457	0.000734942	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.617404436	0.058469603
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.059971295	2.32839E-14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.004726269	0.289181164
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.227660331	1.56103E-11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.002832502	0.220062838
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.043302372	0.002573347	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.118277289	0.590923289
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.144414246	0.000406485	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.090858752	0.773411544
		III 型(222)	IV 型(224)	IV 型(235)	V 型(262)	V 型(266)	特定積層型	ダイア計
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.609694004	0.826831092	0.163718959	#DIV/0!	0.781619165	#DIV/0!	0.443456843
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.823719291	0.860727441	0.284783455	#DIV/0!	0.139409977	#DIV/0!	0.637504349
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.961662368	0.844682832	0.216706977	#DIV/0!	0.292351992	#DIV/0!	0.984168345
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.437613404	0.681694905	0.777083987	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000334634
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.61051749	0.299032906	0.861761954	#DIV/0!	0.482476214	#DIV/0!	0.571809964
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.382499058	0.241107344	0.913458762	#DIV/0!	0.600750653	#DIV/0!	0.141612122
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.590726306	0.058567577	0.393744354	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.003555107
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.815098396	0.964554516	0.821562248	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.485238909
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.419338336	0.505402133	0.500611791	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.013878629

表 5-19-2 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計一透析歴 15 年以上—TTEST=P 値—

		夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うち PTA
40 歳未満 40～64 歳	P 値	0.170594709	0.900131591	0.654668643	#DIV/0!	#DIV/0!	0.325468273	#DIV/0!
40 歳未満 65～69 歳	P 値	0.10638686	#DIV/0!	0.500928736	#DIV/0!	#DIV/0!	0.279074909	#DIV/0!
40 歳未満 70 歳以上	P 値	0.03258664	#DIV/0!	0.56614961	#DIV/0!	#DIV/0!	0.042082715	#DIV/0!
40 歳未満 75 歳以上	P 値	0.788503657	#DIV/0!	0.153035635	#DIV/0!	#DIV/0!	0.034071039	#DIV/0!
40～64 歳 65～69 歳	P 値	0.481024804	0.548700896	0.832658493	0.320567472	0.290748005	0.660276911	#DIV/0!
40～64 歳 70 歳以上	P 値	0.096156316	0.534981248	0.986369252	0.368089644	#DIV/0!	0.165869856	#DIV/0!
40～64 歳 75 歳以上	P 値	0.777637959	0.668934194	0.466378644	0.393314441	#DIV/0!	0.149420767	#DIV/0!
65～69 歳 70 歳以上	P 値	0.336069985	#DIV/0!	0.814970862	0.918872067	#DIV/0!	0.447791785	#DIV/0!
65～69 歳 75 歳以上	P 値	0.67712314	#DIV/0!	0.261548057	0.287798956	#DIV/0!	0.325227993	#DIV/0!
		うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
40 歳未満 40～64 歳	P 値	#DIV/0!	0.525475019	0.166076639	0.110330787	0.369360539	0.159233604	0.39555664
40 歳未満 65～69 歳	P 値	#DIV/0!	0.479305012	0.044558574	0.002361439	0.579086392	0.087364768	0.542539507
40 歳未満 70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.442930413	0.062090661	0.011187112	0.803321325	0.067461069	0.571963645
40 歳未満 75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.247861477	0.033164719	0.005801173	0.931763067	0.042004689	0.983061931
40～64 歳 65～69 歳	P 値	#DIV/0!	0.475543808	0.014733601	0.114541083	0.355938475	0.307274259	0.676202561
40～64 歳 70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.791665259	0.044927562	0.470273831	0.135152371	0.341339971	0.605844248
40～64 歳 75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.367173621	0.04538344	0.667855649	0.226345256	0.238986811	0.22899035
65～69 歳 70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.516231429	0.728104257	0.321828485	0.603207359	0.933709149	0.945279727
65～69 歳 75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.552829021	0.875534489	0.342222214	0.511951762	0.746503094	0.438200905
		うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
40 歳未満 40～64 歳	P 値	0.267032351	0.162787459	0.143771547	#DIV/0!	0.533827805	0.044367465	0.984076251
40 歳未満 65～69 歳	P 値	0.274135467	0.033237804	0.012951739	#DIV/0!	0.768922704	0.004010062	0.528312655
40 歳未満 70 歳以上	P 値	0.215615811	0.09599968	0.056945029	#DIV/0!	0.390471399	0.004322566	0.066049053
40 歳未満 75 歳以上	P 値	0.293168714	0.127612835	0.087474514	#DIV/0!	0.164406619	0.007109385	0.009943195
40～64 歳 65～69 歳	P 値	0.601722811	0.006776533	0.002553607	#DIV/0!	0.622674409	0.001798155	0.14535606
40～64 歳 70 歳以上	P 値	0.971233908	0.000122055	0.035772853	#DIV/0!	0.001642416	0.001744757	2.5515E-05
40～64 歳 75 歳以上	P 値	0.821290299	0.003574818	0.170072248	#DIV/0!	0.002269166	0.074476116	6.32466E-05
65～69 歳 70 歳以上	P 値	0.613274283	0.363303867	0.506565744	#DIV/0!	0.07048521	0.970238107	0.060000387
65～69 歳 75 歳以上	P 値	0.856931094	0.484359459	0.496042502	#DIV/0!	0.040380543	0.691620342	0.023337354
		除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
40 歳未満 40～64 歳	P 値	0.16303098	0.596192066	0.045606547	0.925355315	0.178361067	0.199215917	
40 歳未満 65～69 歳	P 値	0.041959235	0.883462336	0.004899522	0.414069121	0.052970517	0.062455315	
40 歳未満 70 歳以上	P 値	0.049968144	0.284605584	0.004199581	0.035612701	0.056255081	0.068604521	
40 歳未満 75 歳以上	P 値	0.090024399	0.150301969	0.00796063	0.008709759	0.098636153	0.127676264	
40～64 歳 65～69 歳	P 値	0.027895322	0.511656578	0.001777058	0.096530153	0.03142259	0.0344576	
40～64 歳 70 歳以上	P 値	0.031669391	0.000600295	0.001582318	5.64864E-06	0.034394012	0.047097041	
40～64 歳 75 歳以上	P 値	0.380410642	0.0021003	0.048971693	5.07462E-05	0.306528006	0.409390623	
65～69 歳 70 歳以上	P 値	0.956041581	0.057597433	0.971294666	0.048309434	0.956454217	0.904664997	
65～69 歳 75 歳以上	P 値	0.578027544	0.048927329	0.797145357	0.0285558	0.679331251	0.589639055	



表 6-1 院内・院外別処方集計結果表 一病院・診療所計一院 内一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	4,837	4,826	4,838	4,838	1,208	0	1,093
合計	296,777	42,685.37	4,155,890	12,131,873	157,300	0	482,625
平均	61.35559231	8.844875673	859.0099215	2507.621538	130.2152318	#DIV/0!	441.5599268
標準偏差	12.56969307	7.501956998	92.45771293	230.6670501	5.2874333	#DIV/0!	42.77213375
標準誤差	0.180732655	0.107989346	1.329260851	3.31629098	0.152128798	65535	1.293751407
中央値 (メジアン)	62	7.02	923	2435	130	#NUM!	450
最頻値 (モード)	58	3.08	923	2305	130	#N/A	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	331	48	3,404	486	4,838	4,838	3,029
合計	95,403	8,265	236,690	986,801	1,106,123	10,486,669	4,285,076
平均	288.2265861	172.1875	69.53290247	2030.454733	228.6322861	2167.562836	1414.683394
標準偏差	28.5977328	12.55736835	120.8452421	1374.636848	114.8985736	1325.986088	2164.238292
標準誤差	1.571873554	1.8125	2.071260773	62.35479367	1.65189221	19.0636491	39.32379651
中央値 (メジアン)	294	174	20	1792	210	1936	351
最頻値 (モード)	294	174	10	300	168	1472	52
	うち VD <sub>3</sub>	40：処置	I型(230)	I型(207)	II型(166)	II型(188)	III型(171)
標本数	1,034	4,838	118	19	85	285	121
合計	2,261,235	162,472,607	345,690	49,680	176,292	673,980	250,344
平均	2186.881044	33582.59756	2929.576271	2614.736842	2074.023529	2364.842105	2068.958678
標準偏差	1084.633626	1914.926367	290.662062	332.4233984	373.4987084	332.3352599	492.3518118
標準誤差	33.73050125	27.53082001	26.75761167	76.26315789	40.5116229	19.68584182	44.75925562
中央値 (メジアン)	2202	32605	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値 (モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	III型(222)	IV型(224)	IV型(235)	V型(262)	V型(266)	特定積層型	ダイア計
標本数	925	650	2,484	27	245	43	4,835
合計	2,566,764	1,853,824	7,328,710	89,342	815,290	442,728	14,592,644
平均	2774.88	2852.036923	2950.366345	3308.962963	3327.714286	10296	3018.126991
標準偏差	390.6563348	331.5027351	465.3286968	504.2192351	527.9577107	0	731.2466334
標準誤差	12.84470117	13.00260704	9.336498688	97.03703704	33.72998087	0	10.51636474
中央値 (メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
最頻値 (モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うちPTA
標本数	1,273	1,100	1,873	58	19	1,374	11
合計	4,281,600	1,704,185	889,184	206,439	52,190	169,933	287,396
平均	3363.393559	1549.259091	474.7378537	3559.293103	2746.842105	123.6775837	26126.90909
標準偏差	1078.394939	111.5924975	2919.491101	4251.941971	3951.637723	22.43557045	9469.462703
標準誤差	30.22481416	3.364640396	67.45874651	558.307333	906.5678683	0.605262476	2855.150432
中央値 (メジアン)	3900	1560	130	3130	1500	130	26283
最頻値 (モード)	3900	1560	130	3130	800	130	34821
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	13	498	2,511	1,124	1,915	4,061	3,974
合計	240,990	138,469	866,298	509,199	351,952	709,785	190,788
平均	18537.69231	278.0502008	345.0011947	453.0240214	183.7869452	174.7808422	48.00905888
標準偏差	11741.13533	1414.86415	476.5600003	596.7705806	155.382094	488.8377366	41.01791789
標準誤差	3256.405036	63.40157858	9.510300309	17.80017408	3.550721261	7.670933712	0.650668347
中央値 (メジアン)	15271	104	205	201	171	60	32
最頻値 (モード)	15127	104	55	150	55	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	482	97	0	1	4,838	4,838	4,838
合計	492,255	44,680	0	37,723	196,962,517	192,680,917	195,258,397
平均	1021.275934	460.6185567	#DIV/0!	37723	40711.55788	39826.56408	40359.32141
標準偏差	898.3981984	781.6179992	#DIV/0!	#DIV/0!	3990.434088	3735.832017	3860.484002
標準誤差	40.92091662	79.36128381	65535	0	57.37031173	53.70990791	55.50202454
中央値 (メジアン)	1146.5	0	#NUM!	37723	39984	38971	39589.5
最頻値 (モード)	1202	0	#N/A	#N/A	38156	37949	40046
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	4,838	4,838	4,838	4,838	4,838	4,838	
合計	190,976,732	196,073,333	191,791,668	194,369,148	190,087,548	189,100,747	
平均	39474.31418	40527.76623	39642.75899	40175.51633	39290.52253	39086.55374	
標準偏差	3556.45897	3532.141429	3232.457725	3393.60388	3033.376006	2915.28978	
標準誤差	51.13106877	50.78145646	46.4729158	48.78970764	43.61072586	41.9130049	
中央値 (メジアン)	38648.5	39929.5	38908	39511	38584	38378	
最頻値 (モード)	37658	37039	37949	40046	37949	37949	

表6-2 院内・院外別処方集計結果表 一病院・診療所計一院 外一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	3,621	3,610	3,621	3,621	675	142	938
合計	222,801	33,419.35	3,120,779	9,105,435	87,620	11,360	420,075
平均	61.53024027	9.257437673	861.8555648	2514.61889	129.8074074	80	447.8411514
標準偏差	12.59362659	7.765725804	87.1904619	245.3840456	8.670951793	0	21.94524406
標準誤差	0.209284252	0.129249375	1.448954393	4.077857637	0.33374509	0	0.716537619
中央値(メジアン)	62	7.06	923	2435	130	80	450
最頻値(モード)	57	1.09	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	310	140	423	312	0	63	2,327
合計	90,846	24,099	125,030	486,599	0	1,498	2,645,581
平均	293.0516129	172.1357143	295.5791962	1559.612179	#DIV/0!	23.77777778	1136.906317
標準偏差	11.78820295	12.64354171	131.0419698	1191.653916	#DIV/0!	52.39565497	1828.806222
標準誤差	0.669524937	1.068574307	6.371478606	67.46411807	65535	6.601232039	37.91137177
中央値(メジアン)	294	174	250	1400	#NUM!	6	221
最頻値(モード)	294	174	250	820	#N/A	2	52
	うちVD <sub>3</sub>	40：処置	I型(230)	I型(207)	II型(166)	II型(188)	III型(171)
標本数	774	3,621	64	45	164	297	49
合計	1,631,357	122,290,147	170,660	110,538	341,794	674,920	103,113
平均	2107.696382	33772.47915	2666.5625	2456.4	2084.109756	2272.457912	2104.346939
標準偏差	993.4119467	2118.16596	778.3177193	500.4716594	362.7816361	547.2072638	471.1612229
標準誤差	35.70745505	35.2002479	97.28971492	74.60591008	28.32848643	31.75218594	67.30874613
中央値(メジアン)	2206.5	32725	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値(モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	III型(222)	IV型(224)	IV型(235)	V型(262)	V型(266)	特定積層型	ダイア計
標本数	906	392	1,829	0	28	35	3,614
合計	2,415,360	1,124,032	5,369,985	0	95,228	360,360	10,765,990
平均	2665.960265	2867.428571	2936.022417	#DIV/0!	3401	10296	2978.967903
標準偏差	571.6125475	297.669997	802.3109702	#DIV/0!	167.5642497	0	892.8058128
標準誤差	18.99055489	15.03460524	18.76013148	65535	31.66666667	0	14.85124747
中央値(メジアン)	2886	2912	3055	#NUM!	3458	10296	2990
最頻値(モード)	2886	2912	3055	#N/A	3458	10296	3055
	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うちPTA
標本数	1,118	776	1,376	36	11	829	4
合計	4,032,900	1,210,560	341,304	59,819	17,337	100,889	56,977
平均	3607.245081	1560	248.0406977	1661.638889	1576.090909	121.6996381	14244.25
標準偏差	802.9775134	0	1557.514155	1550.136384	773.8836417	24.79501006	7552.609985
標準誤差	24.01499396	0	41.98776766	258.356064	233.3346974	0.861166295	3776.304992
中央値(メジアン)	3900	1560	130	1140	1400	130	13999
最頻値(モード)	3900	1560	130	3130	800	130	#N/A
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	6	612	1,696	774	1,281	2,631	2,567
合計	101,288	88,134	630,460	411,307	225,581	504,016	135,898
平均	16881.33333	144.0098039	371.7334906	531.4043928	176.09758	191.568225	52.94039735
標準偏差	12410.36149	362.4601608	416.5913807	564.24508	161.8365756	564.5020039	41.22846579
標準誤差	5066.508862	14.65158361	10.11573296	20.28137058	4.521703857	11.00538054	0.81373733
中央値(メジアン)	15524.5	104	239	360	140	60	60
最頻値(モード)	#N/A	104	55	980	55	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	361	3,621	3,621	0	3,621	3,621	3,621
合計	352,335	1,189,237	1,107,607	0	140,338,255	136,305,355	139,127,695
平均	975.9972299	328.4277824	305.8842861	#DIV/0!	38756.76747	37643.01436	38422.45098
標準偏差	1068.454649	282.1333343	165.8935661	#DIV/0!	3079.738224	2646.68667	3001.015925
標準誤差	56.23445519	4.688567136	2.756863609	65535	51.17991271	43.98334627	49.87168451
中央値(メジアン)	601	280	280	#NUM!	38225	36845	37473
最頻値(モード)	427	310	310	#N/A	39718	35818	39718
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	3,621	3,621	3,621	3,621	3,621	3,621	
合計	135,094,795	139,996,951	135,940,088	138,762,428	134,729,528	134,242,929	
平均	37308.69787	38662.51063	37542.13974	38321.57636	37207.82325	37073.44076	
標準偏差	2495.938858	2922.572117	2438.824397	2833.318842	2275.852702	2192.308606	
標準誤差	41.47817885	48.56808436	40.52903549	47.08484958	37.82072832	36.43237021	
中央値(メジアン)	36580	38134	36779	37398	36522	36400	
最頻値(モード)	36587	39718	35818	39718	35818	35818	

表 8-1 DM・非 DM 別集計結果表 一病院・診療所計—DM—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	835	832	835	835	190	10	18
合計	52,761	4,143.81	713,788	2,001,339	24,570	800	7,875
平均	63.18682635	4.980540865	854.8359281	2396.813174	129.3157895	80	437.5
標準偏差	11.0224784	4.361002829	116.4839844	148.4847563	9.431191251	0	53.03300859
標準誤差	0.381448594	0.15119057	4.031094503	5.13852688	0.684210526	0	12.5
中央値 (メジアン)	64	4.02	923	2315	130	80	450
最頻値 (モード)	59	1.09	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	4	2	410	835	522	529	541
合計	1,176	348	41,895	1,529,131	123,152	1,204,472	667,287
平均	294	174	102.1829268	1831.294611	235.9233716	2276.884688	1233.432532
標準偏差	0	0	145.8226078	1316.11236	130.4979165	1435.206439	2232.719151
標準誤差	0	0	7.201665282	45.54594631	5.711738637	62.40027996	95.99209388
中央値 (メジアン)	294	174	30	1571	210	2083	169
最頻値 (モード)	294	174	10	820	168	30	52
	うち VD <sub>3</sub>	40：処置	I型(230)	I型(207)	II型(166)	II型(188)	III型(171)
標本数	104	835	22	6	33	62	24
合計	191,857	28,427,776	65,780	14,076	70,716	145,136	50,274
平均	1844.778846	34045.24072	2990	2346	2142.909091	2340.903226	2094.75
標準偏差	853.9821393	1678.363315	0	595.1624988	86.69067267	424.737632	401.0305475
標準誤差	83.73983832	58.08215757	0	242.9740727	15.09090909	53.94173321	81.86001771
中央値 (メジアン)	1729	33856	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値 (モード)	2223	33865	2990	2691	2158	2444	2223
	III型(222)	IV型(224)	IV型(235)	V型(262)	V型(266)	特定積層型	ダイア計
標本数	158	133	385	9	22	9	834
合計	430,236	378,336	1,140,925	30,654	75,544	92,664	2,494,341
平均	2723.012658	2844.631579	2963.441558	3406	3433.818182	10296	2990.816547
標準偏差	553.7501447	382.040722	426.9590722	0	78.26915488	0	808.50078
標準誤差	44.05399612	33.12713188	21.7598492	0	16.68703989	0	27.99609238
中央値 (メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	2990
最頻値 (モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うちPTA
標本数	133	633	388	8	2	257	4
合計	443,400	977,400	201,828	49,707	5,192	31,079	96,163
平均	3333.834586	1544.075829	520.1752577	6213.375	2596	120.9299611	24040.75
標準偏差	1106.378697	134.2364976	3134.205361	5923.204464	705.6925676	25.44316117	14063.18576
標準誤差	95.93519981	5.335421779	159.1151697	2094.169022	499	1.587100788	7031.592878
中央値 (メジアン)	3900	1560	130	3130	2596	130	28048
最頻値 (モード)	3900	1560	130	3130	#N/A	130	34821
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	3	139	580	233	496	693	679
合計	51,870	18,135	160,938	100,778	59,383	116,336	35,005
平均	17290	130.4676259	277.4793103	432.5236052	119.7237903	167.8730159	51.55375552
標準偏差	3560.152103	300.2357601	377.7922155	455.616313	126.8521223	440.9510852	36.52589876
標準誤差	2055.454775	25.4656648	15.68696791	29.84841709	5.695828434	16.75034662	1.401735344
中央値 (メジアン)	15344	104	85	204	55	60	60
最頻値 (モード)	#N/A	104	55	150	55	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	84	354	348	0	835	835	835
合計	82,402	117,966	105,066	0	35,111,846	34,668,446	34,134,446
平均	980.9761905	333.2372881	301.9137931	#DIV/0!	42050.11497	41519.09701	40879.57605
標準偏差	882.5987228	269.0839884	170.0884785	#DIV/0!	4368.835884	4261.661627	4299.265453
標準誤差	96.2994156	14.30165263	9.117699493	65535	151.1898001	147.480882	148.7822161
中央値 (メジアン)	601	280	280	#NUM!	41076	40595	39812
最頻値 (モード)	601	170	170	#N/A	41474	41474	36459
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	835	835	835	835	835	835	
合計	33,691,046	34,910,018	34,465,903	33,931,903	33,488,503	31,959,372	
平均	40348.55808	41808.40479	41276.53054	40637.00958	40105.99162	38274.69701	
標準偏差	4172.586029	3724.685132	3569.809158	3650.161101	3469.746493	2959.97714	
標準誤差	144.3982939	128.8980441	123.5383401	126.3190337	120.0755288	102.4342329	
中央値 (メジアン)	39308	41022	40545	39761	39235	37528	
最頻値 (モード)	36459	41474	40795	41203	39235	37105	

表8-2 DM・非DM別集計結果表 一病院・診療所計一非DM一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	7,985	7,966	7,986	7,986	1,810	154	2,070
合計	489,060	75,331.69	6,870,844	20,140,212	235,560	12,320	920,475
平均	61.24733876	9.456652021	860.361132	2521.939895	130.1436464	80	444.673913
標準偏差	12.69867418	7.743599258	87.02932411	241.0186598	6.111306431	0	34.21356244
標準誤差	0.142108783	0.086760634	0.973869933	2.697031472	0.143646409	0	0.751991833
中央値(メジアン)	62	7.10	923	2435	130	80	450
最頻値(モード)	58	1.06	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	649	259	3,490	0	4,648	4,705	5,038
合計	188,601	44,631	330,895	0	1,016,105	9,425,201	6,539,532
平均	290.6024653	172.3204633	94.81232092	#DIV/0!	218.6112306	2003.230818	1298.041286
標準偏差	22.10536763	11.99392636	141.1448523	#DIV/0!	116.8877494	1368.282788	1991.959438
標準誤差	0.86771158	0.745266322	2.389199032	65535	1.714493871	19.94784799	28.06411873
中央値(メジアン)	294	174	20	#NUM!	198	1788	312
最頻値(モード)	294	174	10	#N/A	168	30	52
	うちVD <sub>3</sub>	40：処置	I型(230)	I型(207)	II型(166)	II型(188)	III型(171)
標本数	1,795	7,986	169	59	219	529	150
合計	3,870,281	268,557,864	475,410	148,833	452,350	1,223,880	312,075
平均	2156.145404	33628.58302	2813.076923	2522.59322	2065.525114	2313.572779	2080.5
標準偏差	1041.096379	2024.363513	567.8363279	444.0896197	399.4071215	459.9505973	492.6727783
標準誤差	24.57302991	22.6529021	43.67971753	57.81554396	26.98943212	19.99785206	40.2265639
中央値(メジアン)	2201	32378.5	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値(モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	III型(222)	IV型(224)	IV型(235)	V型(262)	V型(266)	特定積層型	ダイア計
標本数	1,781	970	4,110	18	253	70	7,977
合計	4,840,710	2,775,136	12,092,630	58,688	840,826	720,720	23,941,258
平均	2717.973049	2860.964948	2942.245742	3260.444444	3323.422925	10296	3001.285947
標準偏差	491.4666326	301.9412542	638.8613684	617.5399222	524.8911291	0	790.6154752
標準誤差	11.6456056	9.6947494	9.96519305	145.5555556	32.99962255	0	8.852083762
中央値(メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
最頻値(モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うちPTA
標本数	2,376	1,321	2,997	87	28	2,030	12
合計	8,285,400	2,057,569	1,071,908	232,351	64,335	249,635	276,237
平均	3487.121212	1557.584406	357.660327	2670.701149	2297.678571	122.9729064	23019.75
標準偏差	958.8866151	57.57770006	2332.186197	3449.707794	3310.766299	23.23528602	9093.717183
標準誤差	19.67179719	1.584174084	42.60100544	369.8474967	625.6760197	0.515703411	2625.130032
中央値(メジアン)	3900	1560	130	2037	1450	130	23011
最頻値(モード)	3900	1560	130	3130	800	130	14659
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	17	1,028	3,850	1,763	2,879	6,248	6,106
合計	290,512	213,992	1,418,293	865,657	554,475	1,174,641	305,688
平均	17088.94118	208.1634241	368.3877922	491.0136132	192.5929142	188.0027209	50.06354406
標準偏差	13026.17101	1019.568069	460.4866562	594.456913	161.2774974	539.0190684	41.53080884
標準誤差	3159.310528	31.7994544	7.421414443	14.15774956	3.005750605	6.819202993	0.531486196
中央値(メジアン)	15271	104	235.5	350	198	60	60
最頻値(モード)	#N/A	104	55	150	55	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	811	3,633	3,605	1	7,986	7,986	7,986
合計	816,807	1,189,635	1,071,341	37,723	316,344,576	308,055,876	314,287,176
平均	1007.160296	327.4525186	297.1819695	37723	39612.39369	38574.48986	39354.76784
標準偏差	974.1901728	309.2596371	178.2097156	#DIV/0!	3566.621331	3229.431451	3502.390171
標準誤差	34.20844375	5.130864469	2.96810146	0	39.91097613	36.13777567	39.19222074
中央値(メジアン)	798	278	276	37723	39008	37864.5	38713
最頻値(モード)	129	310	310	#N/A	39718	35818	39718
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	7,986	7,986	7,986	7,986	7,986	7,986	
合計	305,998,411	315,272,564	306,960,356	313,191,656	304,902,956	304,902,956	
平均	38316.85587	39478.15728	38437.30979	39217.58778	38179.68395	38179.68395	
標準偏差	3121.415407	3290.383517	2909.712761	3220.752723	2792.01413	2792.01413	
標準誤差	34.92906149	36.81983754	32.56008019	36.04071044	31.24301656	31.24301656	
中央値(メジアン)	37570	38947	37805	38652	37506	37506	
最頻値(モード)	36587	39718	36269	39718	35818	35818	

表 A : 透析点数

年	月	人工腎臓技術料(点)							加算(点)					
S 42	12	920												
S 47	2	1,540												
S 49	10	2,150												
S 53	2	5 時間未満 3,100	5 時間以上 9 時間未満 4,000	9 時間以上 4,100				午後 1 時以 降開始加算 150						
S 56	6	5 時間未満 1,300	5 時間以上 9 時間未満 2,000	9 時間以上 2,100				午後 5 時以 降開始加算 400				透析食 + 管理加算 50 + 10		
S 58	2	5 時間未満 1,300	5 時間以上 9 時間未満 2,000	9 時間以上 2,100				午後 5 時以 降開始加算 400				透析食 + 管理加算 50 + 10		
S 60	3	4 時間未満 1,300	4 時間以上 1,800				午後 5 時以 降開始加算 400	導入期 (1 ヶ月) 300				透析食 + 管理加算 50 + 10		
S 61	4	4 時間未満 1,250	4 時間以上 1,700				午後 5 時・ 9 時～加算 500	導入期 (1 ヶ月) 300				透析食 + 管理加算 60 + 10		
S 63	4	4 時間未満 1,250	4 時間以上 1,700				午後 5 時・ 9 時～加算 500	導入期 (1 ヶ月) 300	水処理加算 30				透析食 + 管理加算 60 + 10	
H 1	4	4 時間未満 1,250	4 時間以上 1,700				午後 5 時・ 9 時～加算 500	導入期 (1 ヶ月) 300	水処理加算 30				透析食 + 管理加算 61 + 10	
H 2	4	4 時間未満 1,250	4 時間以上 1,700				午後 5 時・ 9 時～・休 日加算 500	導入期 (1 ヶ月) 300	水処理加算 30				透析食 + 管理加算 62 + 10	
H 4	4	4 時間未満 1,250	4 時間以上 1,700				午後 5 時・ 9 時～・休 日加算 500	導入期 (1 ヶ月) 300	水処理加算 30	障害者加算 100			透析食 + 管理加算 63 + 10	
H 6	4	4 時間未満 (包括) 1,600	4 時間以上 (包括) 2,100	4 時間未満 (その他) 1,295	4 時間以上 (その他) 1,740			午後 5 時・ 9 時～・休 日加算 500	導入期 (1 ヶ月) 300	包括	除水調整器 加算 30	障害者加算 120	透析食 + 管理加算 63 + 10	
H 8	4	4 時間未満 (包括) 1,600	4 時間以上 5 時間未満 (包括) 2,080	5 時間以上 (包括) 2,180	4 時間未満 (その他) 1,295	4 時間以上 5 時間未満 (その他) 1,730	5 時間以上 (包括) 1,830	午後 5 時・ 9 時～・休 日加算 500	導入期 (1 ヶ月) 300		除水調整器 加算 30	障害者加算 120	透析食 + 管理加算 63 + 10	
H 9	4	4 時間未満 (包括) 1,630	4 時間以上 5 時間未満 (包括) 2,110	5 時間以上 (包括) 2,210	4 時間未満 (その他) 1,325	4 時間以上 5 時間未満 (その他) 1,760	5 時間以上 (包括) 1,860	午後 5 時・ 9 時～・休 日加算 500	導入期 (1 ヶ月) 300	包括		障害者加算 120	透析食加算 63	
H 10	4	4 時間未満 (包括) 1,630	4 時間以上 5 時間未満 (包括) 2,110	5 時間以上 (包括) 2,210	4 時間未満 (その他) 1,335	4 時間以上 5 時間未満 (その他) 1,770	5 時間以上 (包括) 1,870	午後 5 時・ 9 時～・休 日加算 500	導入期 (1 ヶ月) 300			障害者加算 120	透析食加算 63	
H 12	4	4 時間未満 (包括) 1,630	4 時間以上 5 時間未満 (包括) 2,110	5 時間以上 (包括) 2,210	4 時間未満 (その他) 1,335	4 時間以上 5 時間未満 (その他) 1,770	5 時間以上 (包括) 1,870	午後 5 時・ 9 時～・休 日加算 500	導入期 (1 ヶ月) 300			障害者加算 120	透析食加算 63	
H 14	4	一日につき (包括) 1,960				一日につき (その他) 1,590			午後 5 時・ 9 時～・休 日加算 500	導入期 (1 ヶ月) 300			障害者加算 120	廃止
H 16	4	一日につき (包括) 1,960				一日につき (その他) 1,590			午後 5 時・ 9 時～・休 日加算 500	導入期 (1 ヶ月) 300			障害者加算 120	
H 18	4	一日につき (包括) 2,250				一日につき (その他) 1,590			午後 5 時・ 9 時～・休 日加算 300	導入期 (1 ヶ月) 300			障害者加算 120	

の変遷

指導管理料(点)	特定治療材料(円)				加算(円)		コメント	
	実費							
	実費							
	実費							
	手技料に含							
	コイル型	1.5m <sup>2</sup> 未満	1.5m <sup>2</sup> 以上 2.0m <sup>2</sup> 未満	2.0m <sup>2</sup> 以上		特定積層型	滅菌加算	
	7,000	9,000	9,300	9,600		13,800	300	
	コイル型	1.5m <sup>2</sup> 未満	1.5m <sup>2</sup> 以上 2.0m <sup>2</sup> 未満	2.0m <sup>2</sup> 以上		特定積層型	滅菌加算	
	6,500	8,000	8,300	8,600		13,000	300	
	コイル型	1.5m <sup>2</sup> 未満	1.5m <sup>2</sup> 以上 2.0m <sup>2</sup> 未満	2.0m <sup>2</sup> 以上		特定積層型	滅菌加算	
	6,000	7,500	7,900	8,100		12,500	300	
	コイル型	1.5m <sup>2</sup> 未満	1.5m <sup>2</sup> 以上 2.0m <sup>2</sup> 未満	2.0m <sup>2</sup> 以上		特定積層型	滅菌加算	
	6,000	7,500	7,900	8,100		12,500	300	
	コイル型	1.5m <sup>2</sup> 未満	1.5m <sup>2</sup> 以上 2.0m <sup>2</sup> 未満	2.0m <sup>2</sup> 以上		特定積層型	滅菌加算	都道府県知事に対して逆浸透装置及び活性炭を用いて人工腎臓に使用する透析用灌流液の水処理を行なう旨届け出た医療機関において、アルミニウム、エンドトキシン等を除去する目的で当該水処理を行なった場合、所定点数に30点加算(水処理加算)
	6,000	7,000	7,400	7,600		12,500	300	
	コイル型	1.5m <sup>2</sup> 未満	1.5m <sup>2</sup> 以上 2.0m <sup>2</sup> 未満	2.0m <sup>2</sup> 以上		特定積層型	滅菌加算	消費税導入に伴い、食事加算が61点に改定
	6,000	7,000	7,400	7,600		12,500	300	
		1.5m <sup>2</sup> 未満	1.5m <sup>2</sup> 以上			特定積層型	滅菌加算	5時・9時加算に休日追加
		6,800	7,100			12,000	150	
慢透		1.5m <sup>2</sup> 未満	1.5m <sup>2</sup> 以上			特定積層型	滅菌加算	著しく人工透析が困難な心身障害者等に対して行った場合、1日につき100点加算 慢性維持透析患者外来医学管理料《新設》
2,500		6,000	6,200			12,000	150	
慢透		1.5m <sup>2</sup> 未満	1.5m <sup>2</sup> 以上			特定積層型	滅菌加算	手技料が「包括」「その他」に分離される(包括には透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩水が含まれる) 水処理加算が技術料に上乗せされ包括、除水調整器加算《新設》
2,500		5,050	5,250			10,800	150	
慢透		1.5m <sup>2</sup> 未満 (I型)	1.5m <sup>2</sup> 未満 (II型)	1.5m <sup>2</sup> 以上 (I型)	1.5m <sup>2</sup> 以上 (II型)	特定積層型	滅菌加算	透析時間「5時間以上」《新設》
2,500		4,350	4,550	4,550	4,750	10,800	150	
慢透		1.5m <sup>2</sup> 未満 (I型)	1.5m <sup>2</sup> 未満 (II型)	1.5m <sup>2</sup> 以上 (I型)	1.5m <sup>2</sup> 以上 (II型)	特定積層型	廃止	除水調整器加算が廃止され、手技料に上乗せされる ダイアライザー滅菌加算廃止 透析食管理加算の廃止
2,500		4,260	4,460	4,450	4,650	11,100		
慢透		1.5m <sup>2</sup> 未満 (I型)	1.5m <sup>2</sup> 未満 (II型)	1.5m <sup>2</sup> 以上 (I型)	1.5m <sup>2</sup> 以上 (II型)	特定積層型		「その他」(入院)手技料がそれぞれ10点UP 慢透管理料の包括範囲が広がり(心電図、胸部X-P手技料等) 400点UP 一ヶ月15回目以降の手技料が算定不可となる
2,900		3,360	4,020	3,540	4,180	10,700		
慢透		1.5m <sup>2</sup> 未満 (I型)	1.5m <sup>2</sup> 未満 (II型)	1.5m <sup>2</sup> 以上 (I型)	1.5m <sup>2</sup> 以上 (II型)	特定積層型		慢透管理料が100点DOWN
2,800		3,010	3,430	2,970	3,530	10,200		
慢透		1.5m <sup>2</sup> 未満 (I型)	1.5m <sup>2</sup> 未満 (II型)	1.5m <sup>2</sup> 以上 (I型)	1.5m <sup>2</sup> 以上 (II型)	特定積層型		実施時間による評価が廃止、障害等により特別の対応等が必要な患者に対する重点化が図られる 障害者加算対象が見直され追加 食事加算の廃止 慢透管理料が130点DOWN
2,670		2,920	3,090	2,970	3,190	9,720		
慢透		1.5m <sup>2</sup> 未満 (I型)	1.5m <sup>2</sup> 未満 (II型)	1.5m <sup>2</sup> 以上 (I型)	1.5m <sup>2</sup> 以上 (II型)	特定積層型		慢透管理料が210点DOWN
2,460		2,630	2,750	2,420	2,800	8,250		
慢透		1.5m <sup>2</sup> 未満 (I型)	1.5m <sup>2</sup> 未満 (II型)1,660 (III型)1,710 (IV型)2,240 (V型)2,620	1.5m <sup>2</sup> 以上 (I型)	1.5m <sup>2</sup> 以上 (II型)1,880 (III型)2,220 (IV型)2,350 (V型)2,660	特定積層型		人工腎臓手技料が290点UPされるもエリスロポエチンが包括される 慢透管理料が155点DOWN 夜間・休日加算が200点DOWN
2,305		2,300		2,070		7,920		

表 B 慢性維持透析患者外来医学管理料の変遷

年度	点数(改訂前増減比)	含まれる項目
【新設】 平成4年	2,500	—
平成6年	2,500	0.0%
平成8年	2,500	0.0%
平成9年	2,500	0.0%
平成10年	2,900	16.0%
平成12年	2,800	-3.4%
平成14年	2,670	-4.6%
平成16年	2,460	-7.9%
平成18年	2,305	-6.3%

イ)糞便検査 潜血反応検査 ロ)血液形態・機能検査 血小板, 網赤血球数, 末梢血液一般, 末梢血液像, ヘモグロビンA1c  
 ハ)出血・凝固検査 出血時間測定, 凝固時間測定 ニ)血液化学検査 総ビリルビン, 総蛋白, 膠質反応, アルブミン, 尿素窒素, クレアチニン, 尿酸, グルコース, LDH, ALP, ChE, Amy,  $\gamma$ -GTP, LAP, CPK, TG, Na/Cl, K, Ca, Fe, Mg, P/HPO<sub>4</sub>, T-cho, GOT, GPT, 遊離脂肪酸,  $\beta$ -リポP, HDL-cho, UIBC, 蛋白分画測定, 血液ガス分析, Al, フェリチン ホ)内分泌学的検査 T3, T4, TSH, PTH, FT3, FT4 ヘ)肝炎ウイルス関連検査 HBs抗原, HBs抗体 ト)血漿蛋白免疫学的検査 DH50, IgG, IgA, IgM, C3, C4, トランスフェリン, B2-MG

イ)糞便検査 潜血反応検査 ロ)血液形態・機能検査 血小板, 網赤血球数, 末梢血液一般, 末梢血液像, ヘモグロビンA1c  
 ハ)出血・凝固検査 出血時間測定, 凝固時間測定 ニ)血液化学検査 総ビリルビン, 総蛋白, 膠質反応, アルブミン, 尿素窒素, クレアチニン, 尿酸, グルコース, LDH, ALP, ChE, Amy,  $\gamma$ -GTP, LAP, CPK, TG, Na/Cl, K, Ca, Fe, Mg, P/HPO<sub>4</sub>, T-cho, GOT, GPT, 遊離脂肪酸,  $\beta$ -リポP, HDL-cho, UIBC, 蛋白分画測定, 血液ガス分析, Al, フェリチン ホ)内分泌学的検査 T3, T4, TSH, PTH, FT3, FT4 ヘ)肝炎ウイルス関連検査 HBs抗原, HBs抗体 ト)血漿蛋白免疫学的検査 DH50, IgG, IgA, IgM, C3, C4, トランスフェリン, B2-MG

イ)糞便検査 潜血反応検査 ロ)血液形態・機能検査 血小板, 網赤血球数, 末梢血液一般, 末梢血液像, ヘモグロビンA1c  
 ハ)出血・凝固検査 出血時間測定, 凝固時間測定 ニ)血液化学検査 総ビリルビン, 総蛋白, 膠質反応, アルブミン, 尿素窒素, クレアチニン, 尿酸, グルコース, LDH, ALP, ChE, Amy,  $\gamma$ -GTP, LAP, CPK, TG, Na/Cl, K, Ca, Fe, Mg, P/HPO<sub>4</sub>, T-cho, GOT, GPT, 遊離脂肪酸,  $\beta$ -リポP, HDL-cho, UIBC, 蛋白分画測定, 血液ガス分析, Al, フェリチン ホ)内分泌学的検査 T3, T4, TSH, PTH, FT3, FT4 ヘ)肝炎ウイルス関連検査 HBs抗原, HBs抗体 ト)血漿蛋白免疫学的検査 DH50, IgG, IgA, IgM, C3, C4, トランスフェリン, B2-MG

イ)糞便検査 潜血反応検査 ロ)血液形態・機能検査 血小板, 網赤血球数, 末梢血液一般, 末梢血液像, ヘモグロビンA1c  
 ハ)出血・凝固検査 出血時間測定, 凝固時間測定 ニ)血液化学検査 総ビリルビン, 総蛋白, 膠質反応, アルブミン, 尿素窒素, クレアチニン, 尿酸, グルコース, LDH, ALP, ChE, Amy,  $\gamma$ -GTP, LAP, CPK, TG, Na/Cl, K, Ca, Fe, Mg, P/HPO<sub>4</sub>, T-cho, GOT, GPT, 遊離脂肪酸,  $\beta$ -リポP, HDL-cho, UIBC, 蛋白分画測定, 血液ガス分析, Al, フェリチン ホ)内分泌学的検査 T3, T4, TSH, PTH, FT3, FT4 ヘ)肝炎ウイルス関連検査 HBs抗原, HBs抗体 ト)血漿蛋白免疫学的検査 DH50, IgG, IgA, IgM, C3, C4, トランスフェリン, B2-MG

イ)尿中一般物質定性半定量検査 ロ)尿沈渣顕微鏡検査 ハ)糞便検査 潜血反応検査 ニ)血液形態・機能検査 血小板, 網赤血球数, 末梢血液一般, 末梢血液像, ヘモグロビンA1c ホ)出血・凝固検査 出血時間測定, 凝固時間測定 ヘ)血液化学検査 総ビリルビン, 総蛋白, 膠質反応, アルブミン, 尿素窒素, クレアチニン, 尿酸, グルコース, LDH, ALP, ChE, Amy,  $\gamma$ -GTP, LAP, CPK, TG, Na/Cl, K, Ca, Fe, Mg, P/HPO<sub>4</sub>, T-cho, GOT, GPT, 遊離脂肪酸,  $\beta$ -リポP, HDL-cho, UIBC, 蛋白分画測定, 血液ガス分析, Al, フェリチン ト)内分泌学的検査 T3, T4, TSH, PTH, FT3, FT4, CPR, カルシトニン, HANP チ)感染症血清反応 梅毒脂質抗原使用検査 リ)肝炎ウイルス関連検査 HBs抗原, HBs抗体価, HCV抗体価 ヌ)血漿蛋白免疫学的検査 DH50, IgG, IgA, IgM, C3, C4, トランスフェリン, B2-MG ル)心電図検査 ヲ)写真診断 単純撮影(胸部) ヲ)撮影 単純撮影(胸部)

イ)尿中一般物質定性半定量検査 ロ)尿沈渣顕微鏡検査 ハ)糞便検査 潜血反応検査 ニ)血液形態・機能検査 血小板, 網赤血球数, 末梢血液一般, 末梢血液像, ヘモグロビンA1c ホ)出血・凝固検査 出血時間測定, 凝固時間測定 ヘ)血液化学検査 総ビリルビン, 総蛋白, 膠質反応, アルブミン, 尿素窒素, クレアチニン, 尿酸, グルコース, LDH, ALP, ChE, Amy,  $\gamma$ -GTP, LAP, CPK, TG, Na/Cl, K, Ca, Fe, Mg, P/HPO<sub>4</sub>, T-cho, GOT, GPT, 遊離脂肪酸,  $\beta$ -リポP, HDL-cho, UIBC, 蛋白分画測定, 血液ガス分析, Al, フェリチン ト)内分泌学的検査 T3, T4, TSH, PTH, FT3, FT4, CPR, カルシトニン, HANP, BNP チ)感染症血清反応 梅毒脂質抗原使用検査 リ)肝炎ウイルス関連検査 HBs抗原, HBs抗体価, HCV抗体価 ヌ)血漿蛋白免疫学的検査 DH50, IgG, IgA, IgM, C3, C4, トランスフェリン, B2-MG ル)心電図検査 ヲ)写真診断 単純撮影(胸部) ヲ)撮影 単純撮影(胸部)

イ)尿中一般物質定性半定量検査 ロ)尿沈渣顕微鏡検査 ハ)糞便検査 潜血反応検査 ニ)血液形態・機能検査 血小板, 網赤血球数, 末梢血液一般, 末梢血液像, ヘモグロビンA1c ホ)出血・凝固検査 出血時間測定, 凝固時間測定 ヘ)血液化学検査 総ビリルビン, 総蛋白, 膠質反応, アルブミン, 尿素窒素, クレアチニン, 尿酸, グルコース, LDH, ALP, ChE, Amy,  $\gamma$ -GTP, LAP, CPK, TG, Na/Cl, K, Ca, Fe, Mg, P/HPO<sub>4</sub>, T-cho, GOT, GPT, 遊離脂肪酸,  $\beta$ -リポP, HDL-cho, UIBC, 蛋白分画測定, 血液ガス分析, Al, フェリチン ト)内分泌学的検査 T3, T4, TSH, PTH, FT3, FT4, CPR, カルシトニン, HANP, BNP チ)感染症血清反応 梅毒脂質抗原使用検査 リ)肝炎ウイルス関連検査 HBs抗原, HBs抗体価, HCV抗体価 ヌ)血漿蛋白免疫学的検査 DH50, IgG, IgA, IgM, C3, C4, トランスフェリン, B2-MG ル)心電図検査 ヲ)写真診断 単純撮影(胸部) ヲ)撮影 単純撮影(胸部)

イ)尿中一般物質定性半定量検査 ロ)尿沈渣顕微鏡検査 ハ)糞便検査 潜血反応検査 ニ)血液形態・機能検査 血小板, 網赤血球数, 末梢血液一般, 末梢血液像, ヘモグロビンA1c ホ)出血・凝固検査 出血時間測定, 凝固時間測定 ヘ)血液化学検査 総ビリルビン, 総蛋白, 膠質反応, アルブミン, 尿素窒素, クレアチニン, 尿酸, グルコース, LDH, ALP, ChE, Amy,  $\gamma$ -GTP, LAP, CPK, TG, Na/Cl, K, Ca, Fe, Mg, P/HPO<sub>4</sub>, T-cho, GOT, GPT, 遊離脂肪酸,  $\beta$ -リポP, HDL-cho, UIBC, 蛋白分画測定, 血液ガス分析, Al, フェリチン ト)内分泌学的検査 T3, T4, TSH, PTH, FT3, FT4, CPR, カルシトニン, HANP, BNP チ)感染症血清反応 梅毒脂質抗原使用検査 リ)肝炎ウイルス関連検査 HBs抗原, HBs抗体価, HCV抗体価 ヌ)血漿蛋白免疫学的検査 DH50, IgG, IgA, IgM, C3, C4, トランスフェリン, B2-MG ル)心電図検査 ヲ)写真診断 単純撮影(胸部) ヲ)撮影 単純撮影(胸部)

イ)尿中一般物質定性半定量検査 ロ)尿沈渣顕微鏡検査 ハ)糞便検査 潜血反応検査 ニ)血液形態・機能検査 血小板, 網赤血球数, 末梢血液一般, 末梢血液像, ヘモグロビンA1c ホ)出血・凝固検査 出血時間測定, 凝固時間測定 ヘ)血液化学検査 総ビリルビン, 総蛋白, 膠質反応, アルブミン, 尿素窒素, クレアチニン, 尿酸, グルコース, LDH, ALP, ChE, Amy,  $\gamma$ -GTP, LAP, CPK, TG, Na/Cl, K, Ca, Fe, Mg, P/HPO<sub>4</sub>, T-cho, GOT, GPT, 遊離脂肪酸,  $\beta$ -リポP, HDL-cho, UIBC, 蛋白分画測定, 血液ガス分析, Al, フェリチン ト)内分泌学的検査 T3(精密測定), T4(精密測定), TSH(精密測定), PTH(精密測定), FT3(精密測定), FT4(精密測定), CPR(精密測定), カルシトニン(精密測定), HANP(精密測定), BNP(精密測定) チ)感染症免疫学的検査 梅毒脂質抗原使用検査 リ)肝炎ウイルス関連検査 HBs抗原, HBs抗体価, HCV抗体価 ヌ)血漿蛋白免疫学的検査 DH50, IgG, IgA, IgM, C3, C4, トランスフェリン, B2-MG ル)心電図検査 ヲ)写真診断 単純撮影(胸部) ヲ)撮影 単純撮影(胸部)

表C 第1～10回調査までの集計結果

	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年
施設数	34	99	125	128	132	149	182	179	190	185
総数(人)	3,779	3,603	4,519	4,748	5,058	5,274	8,633	8,388	9,078	8,821
病院(人)	1,861	1,636	2,039	2,583	2,719	2,670	4,328	3,913	4,053	3,980
診療所(人)	1,918	1,967	2,480	2,165	2,339	2,604	4,305	4,475	5,025	4,841
透析回数(回)	12.5*	13	13	13	13	13	13	13	13	13
平均年齢(歳)	57.1	56.4	56.9	57.8	58.4	62.6	59.4	60.2	60.8	61.4
透析歴(年)	8.5	8.9	8.7	9.0	9.0	7.8	8.96	9.01	9.1	9.03
管理指導料(点)	2,593.2	3,019.4	3,025.8	2,920.6	2,921.3	2,813.6	2,832.3	2,635.1	2,638.6	2,510.1
在宅注射(%)	7.8	6.1	6.3	7.3	7.6	10.5	8.4	9.3	9.3	9.5
投薬(点)	1,628.1	1,815.0	1,684.3	1,755.5	1,803.1	1,743.4	1,802.6	2,001.7	2,131.4	2,030.9
EPO(%)	72.7	78.1	78.7	79.6	81.9	83.2	82.3	83.0	83.97	—
夜間加算(%)	29.5	30.6	31.1	30.3	29.0	17.9**	30.2	29.6	28.9	28.5
障害者加算(%)	25.9	19.0	17.6	20.8	21.3	24.3	20.8	21.2	20.9	22.1
検査(点)	533.9	600.9	665.3	575.1	608.0	528.5	524.1	506.3	481.2	356.5
画像診断(点)	365.8	158.9	161.2	217.7	208.0	212	228.6	218.1	208.1	186.0
透析食(点)	—	817.9	818	818.7	817.4	—	—	—	—	—
院外処方(%)	19.5	13.3	26.5	27.7	25.6	32.8	33.8	37.6	37.2	44.8
除夜障害手術(点)	43,124.7	43,525.7	43,095.5	42,303.5	42,971.6	39,286.1	39,604.8	38,795.9	38,997.1	38,362.1
透析医療費/(除夜障害手術)1回(点)	3,317.3	3,348.1	3,315.0	3,254.1	3,305.5	3,022.0	3,046.5	2,984.3	2,999.8	2,950.9
請求合計									41,160.8	39,843.1
透析医療費(請求合計)/1回(点)									3,166.2	3,064.9
Ⅱ型(%)	—	—	96.9	98.2	98.7	99.0	98.99	99.60	98.49	—
Ⅳ型(%)										63.57

\* 1997年集計では、月平均透析回数は12.5回であった。

\*\* 2002年調査は、火・木・土の調査であったため、夜間透析比率が少ない。