

[実態調査]

第11回透析医療費実態調査報告

杉崎弘章*1,2 太田圭洋*1,2 大平整爾*1,2 小野山攻*1,2 隈 博政*1,2 鈴木正司*1,2
 山川智之*1,2 吉田豊彦*1,2 鈴木 満*1 小野利彦*1 戸澤修平*1 宮本 孝*1
 山崎親雄*2

key words : 血液透析医療費, 施設別医療費, 男女別医療費, 年齢別医療費, 透析歴別医療費,
 DM・NDMの医療費

要 旨

1997年から始まった透析医療費実態調査も今回で11回目を迎えた。この調査結果は日本医師会や厚生労働省へ提出する要望書の裏づけになっている。今回の調査も、北海道（施設数6）、青森（3）、岩手（4）、宮城（4）、山形（2）、福島（4）、茨城（1）、栃木（2）、群馬（1）、埼玉（1）、千葉（10）、東京（5）、神奈川（1）、新潟（4）、富山（3）、福井（2）、山梨（3）、長野（27）、岐阜（1）、静岡（3）、愛知（12）、三重（2）、京都（4）、大阪（4）、兵庫（3）、奈良（2）、和歌山（5）、鳥取（1）、島根（3）、岡山（5）、広島（3）、山口（2）、徳島（4）、香川（3）、高知（4）、福岡（6）、佐賀（4）、長崎（3）、熊本（15）、大分（3）、宮崎（4）、鹿児島（4）、沖縄（1）のほとんど全国を網羅する43都道府県（184施設）のレセプトを分析した。

今年度は診療報酬の改定はなく、2006年度と大きな違いはなかった。2007年度の1回の平均透析医療費は2,961点、前年比+10点（0.34%）増で、合併症などの治療として自然増の範囲内であった。年齢による透析医療費の差を分析するために、成年層（40～64歳）と後期高齢者（75歳以上）を比較検討したが、夜間加算を除外すると両者間に有意差は認められなかった。したがって透析そのものにかかる医療費は年齢によって左右されないと考えられた。

1 はじめに

外来レセプトの定点観測も第11回目となり、会員

諸兄のご協力により、43都道府県、184施設、9,415件の回答をいただいた。

調査対象は、

- ① 慢性維持透析患者外来医学管理料（慢透）を算定していること
 - ② 6月に月水金（昼・夜など）のシフトで月13回の透析を実施している患者であること
 - ③ HDFやリクセル使用の患者は除外すること
- の条件下に分析した。しかし処置点数の誤り、処置回数が12回と少なかったり、ダイアライザーの本数が12本や14本が混在、あるいは抜けていたり、リクセル使用患者が混入していたり、慢透が抜けていたり、レセプト上の不備を150件に認め、有効回答数は9,265件となった。内訳は病院3,941件、診療所5,324件、平均年齢62.1歳、透析歴9.2年であった。

なお本報告は紙面の都合上すべての集計結果を掲載できないため、表の番号が続いていない部分があることをご了解いただきたい。

2 集計結果

- 1) 病院・診療所別集計結果（表1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-7, 1-8）
- ① 病院と診療所の平均請求点数は39,976.7点、前年度39,843.1点に比し133.6点の増加となった。
- ② 請求点数の84%を占める処置（40）点数は、33,707点、前年度33,668点と比べるとほぼ横ばい。ダイアライザー計は3,069点、前年度2,998点と比べると71点の増加を認めた。

- ③ ダイアライザーの使用区分については、I型（1.5 m²未満：以下小とする）使用は173人、1.8%使用（前年度2.1%）、I型（1.5 m²以上：以下大とする）は58人、0.6%（前年0.7%）、II型（小）は116人、1.2%（前年2.8%）、II型（大）は278人、3.0%（前年6.5%）、III型（小）は119人、1.3%（前年1.9%）、III型（大）は1,195人、12.7%（前年21.3%）、IV型（小）は1,116人、11.9%（前年12.1%）、IV型（大）5,629人、60.0%（前年49.4%）、V型（小）は28人、0.3%（前年0.3%）、V型（大）は582人、6.2%（前年3.0%）、特定積層型は89人、0.9%（前年0.9%）であった。前年度より使用量が増加したダイアライザーはIV型（大）が49.4%→60.0%、V型（大）が3.0%→6.2%と大型の高性能ダイアライザーへ移行している傾向を認めた。積層型は前年度とほぼ同じ使用量であった。
- ④ 夜間加算については、2,605人が請求、全体の28.1%にあたり、前年度28.5%、前々年度28.9%と比べて僅かであるが少しずつ減少傾向を認めた。
- ⑤ 障害者加算については、2,079人で全体の22.4%を占め、前年度22.1%、前々年度20.9%と比べて僅かであるが少しずつ増加傾向を認めた。
- ⑥ 病院と診療所を比較してみると、患者の平均年齢は病院、診療所ともに62.1歳、透析歴は病院9.1年<診療所9.2年と診療所のほうが僅かに長い、従来のように明らかな差は認められなかった。
- ⑦ 平均請求点数は病院39,955点、診療所39,992点で有意差はなかった。
- ⑧ 指導（13）では、病院2,430点<診療所2,595点と診療所が有意に高い。これは特定疾患療養管理料の請求頻度や、その他情報、いわゆる情報提供が病院84点<診療所118点が寄与したものと考えられた。
- ⑨ 投薬（20）では、病院2,271件（58%）、平均2,105点、診療所3,147件（59%）、平均2,110点で有意差はなかった。
院外処方箋は病院1,849件（47%）、平均274点、診療所2,294件（43%）、317点と件数は病院が多いが、1件あたりの点数は診療所のほうが有意に多かった。
- ⑩ 処置（40）では、33,668点、診療所33,736点で有意差はなかった。夜間加算は、病院1,100人（27.9

%）<診療所3,485人（28.3%）と診療所が僅かに多かった、障害者加算は病院922人（22.4%）>診療所1,157人（21.7%）と病院が僅かに多かった。

- ⑪ 検査（60）では、病院393点>診療所326点と病院が有意に高かった。
- ⑫ 画像（70）では、病院291点>診療所93点と病院が有意に高かった。

2) 男女別集計結果（表2-1, 2-2, 2-3）

- ① 男性5,919例、女性3,346例を集計した。年齢は男性61.4歳<女性63.4歳、透析歴は男性8.9年<女性9.6年と、有意に女性が高齢で透析歴も長いことがわかった。
- ② 請求合計は男性40,348点>女性39,319点で、有意に男性が高かった。特に処置（40）で有意差を認め、夜間加算が関与したものと考えられた。従来体重が大きい男性がダイアライザー計で関与していたが、今回の調査では有意差を認めなかった。

もう一つの要因として投薬（20）があげられるが、男性2,145点>女性2,041点と男性が104点高い。これは男性のほうが年齢が若く、透析歴が短いことが関与したものと推測される。それは年齢別透析歴別集計による透析歴10年未満の投薬（20）は、40歳未満2,182点>40~64歳2,152点>64~69歳2,168点>70歳以上2,139点>75歳以上1,910点から推測された（表5-1, 5-2, 5-3, 5-4）。

3) 年齢別集計結果（表3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-7-1, 3-7-2）

- ① 年齢の分布は40歳未満434件（4.7%）、40~64歳4,786件（51.7%）、65~69歳1,373件（14.8%）、70歳以上2,670件（28.8%）であった。70歳以上を二つのグループに分けると、70~74歳1,141件（12.3%）、75歳以上1,529件（16.5%）となり、この40~64歳（成年層）と75歳以上（後期高齢者）を比較して後期高齢者の問題点を前年度の報告と合わせ検討した。
- ② 請求合計点数については、40歳未満40,954点、40~64歳（成年層）40,367点、65~69歳39,784点、70歳以上39,219点、75歳以上（後期高齢者）39,063点と加齢とともに有意に下がっていた。
- ③ 成年層と後期高齢者で有意差を認めた項目は、指

導(13)、投薬(20)、処置(40)であった。

- ④ 指導(13)では、その他情報で成年層91点に比し後期高齢者119点と高いのが有意差に關与した。特定疾患療養管理料の差は認めなかった。
- ⑤ 投薬(20)では、VD3の使用が件数、量ともに關与した。成年層1,330件(27.2%)、2,165点、後期高齢者237件(17.9%)、1,872点であった。
- ⑥ 処置(40)では、成年層34,132点、後期高齢者32,849点で成年層が有意に高く、それに関与したのは夜間加算で、成年層1,953件(41%)、3,517点に対し、後期高齢者40件(2.6%)、2,653点で、件数、点数ともに有意に低かった。

ダイアライザーについては、成年層3,087点、後期高齢者3,032点と成年層が高い傾向を認めたが、前年度のように有意差は認めなかった。

- ⑦ 結論として、成年層と後期高齢者の比較では、請求合計は有意に成年層が多いが、夜間加算を除くと成年層38,932点、後期高齢者38,991点となり有意差を認めなかった(除夜間)。したがって、前年度と同様に夜間加算を除けばかかっている医療費に大きな差はないことを再確認した。

4) 透析歴別集計結果(表4-1, 4-2, 4-3, 4-5-1, 4-5-2)

- ① 10年未満の平均年齢は63.4歳、平均透析歴4.2年、5,700件(62%)、請求合計39,634点、10~14年は平均年齢60.8歳、平均透析歴11.9年、1,497件(16%)、請求合計40,232点、15年以上は平均年齢59.5歳、平均透析歴21.5年、1,964件(21%)、請求合計40,728点で、請求点数間に有意差を認めた。したがって透析歴が長くなると請求点数が高くなることがわかった。
- ② これに関与する因子としては、注射(30)のうちVD3、処置(40)のうちダイアライザー計、検査(60)のうち検体検査が考えられた。

VD3については、10年未満1,993点、10~14年2,092点、15年以上2,284点、ダイアライザー計については、10年未満3,050点、10~14年3,053点、15年以上3,143点、検体検査については、10年未満152点、10~14年207点、15年以上229点であった。

- ③ 透析の長期化により、骨代謝の管理に重点が置か

れていることが推察された。骨代謝改善のために、VD3の投与、リン除去目的でダイアライザーを効率化、骨代謝の進行、改善状況の確認のためのCa、Pをはじめ骨マーカーの検査を行ったためと考えられた。

5) 年齢別・透析歴別集計結果

5-A) 透析歴10年未満の比較(表5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7-1, 5-7-2)

請求合計は、40歳未満40,906点、40~64歳(成年層)39,975点、65~69歳39,447点、70歳以上39,075点、75歳以上(後期高齢者)39,022点で、加齢とともに有意に下がっていた。それに関与した因子はVD3と夜間加算、検査(60)であったが一定の傾向は認めなかった。

また、10年未満の成年層と後期高齢者を比較すると、前記3)と同じ結果を得た。

5-B) 透析歴10~14年の比較(表5-13-1, 5-13-2)

請求合計は、40歳未満41,430点、40~64歳(成年層)40,430点、65~69歳39,975点、70歳以上39,687点、75歳以上(後期高齢者)39,127点で、加齢とともに下がる傾向を認めた。

10~14年の透析歴のなかで、成年層と後期高齢者を比較すると、処置点数が有意に異なるが、夜間加算を除いた除夜間では、成年層39,023点、後期高齢者39,024点でほとんど差は認めなかった。

5-C) 透析歴15年以上の比較(表5-19-1, 5-19-2)

請求点数は40歳未満40,437点、40~64歳(成年層)41,095点、65~69歳40,530点、70歳以上39,405点、75歳以上39,290点で、透析歴が15年以上と長期化すると、加齢による差はなくなった。

成年層と後期高齢者を比較すると、処置点数が有意に異なるが、夜間加算を除いた除夜間では、成年層39,374点、後期高齢者39,163点で有意差はなかった。

6) 院内・院外別処方集計結果(表6-1, 6-2)

- ① 院内処方5,100件(55%)、院外3,863件(42%)、両方280件(3%)、なし22件(0.2%)を集計した。特に院内と院外を比較したが、請求合計、投薬には当然有意差を認めた。

② 請求合計は、院内処方 40,783 点 > 院外処方 38,925 点で、その差は 1,858 点、院内処方の投薬 (20)、処方 (25) の合計 2,443 点に比し院外処方 は 311 点、その差は 2,132 点、請求合計の差 1,858 点と比較すると、その差は 274 点と前年度の 114 点と比較すると差がひらく傾向を認めた。

7) DM・NDM 別集計結果 (表 8-1, 8-2, 8-11-1, 8-11-2, 9-2, 9-5)

① DM 974 例 (10.5%) と NDM 8,291 例 (89.5%) を集計した。DM の平均年齢 63.6 歳、透析歴 5.1 年は、NDM の平均年齢 62.0 歳、透析歴 9.6 年と比較するとともに有意差を認めた。DM は NDM に比し、高齢で透析歴が短いと考えられた。

② 請求合計は DM 41,968 点 > NDM 39,743 点と有意に DM が高かった。

③ 関与した因子は、指導 (13)、処方 (25)、投薬 (30) であった。

指導 (13) は DM 2,540 点 > NDM 2,401 点、処方 (25) は DM 243 点 > NDM 223 点、投薬 (30) は DM 2,308 点 > NDM 2,084 点であった。障害加算では DM 74.4% (725 例) > NDM 16.3% (1,354 例) と有意に DM が多かったが、個別点数では DM 1,525 点 < NDM 1,555 点と有意に NDM が高かった。

④ なお、成年層と後期高齢者に DM の占める割合は、成年層 4,786 例中 DM 487 例 (10.2%)、後期高齢者 1,529 例中 DM 159 例 (10.4%) と有意差はなく、請求合計に関与したとは考えられなかった。ただ、前年度の DM の占める割合は成年層 9.1%、後期高齢者 9.4% で、1 年間でともに 1 ポイント上昇していた。

3 おわりに

この原稿を作成している最中に、中医協は厚生労働大臣に、平成 20 年度の診療報酬改定案を答申した。それによれば、先ず、今年度の要望の第 1 位であった「透析時間」の評価が見直され、4 時間未満、4~5 時間未満、5 時間以上の 3 区分に分類された。具体的には、4 時間未満透析では、従来の 2,250 点からマイナ

ス 133 点、4 時間以上はプラス 17 点、5 時間以上がプラス 147 点であった。4 時間未満と以上の点数差が 150 点、4 時間以上と 5 時間以上の差が 130 点であったことは、今後の透析患者の透析時間にどのような変化を与えるか (より長時間透析への移行が進むか) に関しては、微妙な点数差であると考えられる。また、いろいろの点数を勘案すると、包括された EPO 点数には、ほとんど変化がなかったものと推察される。EPO そのものの薬価は大幅に低下すると推察されており、もし包括点数に含まれる EPO (前回の改定で 1 回あたり 290 点とされている) に大きな減点がなかったとすると、われわれが常々訴えてきたように、これ以上の透析医療費の急激な締め付けは、施設経営に大きく響くことが理解されたともいえよう。

ただダイアライザーの価格は、実勢価格プラス 7.5% に相当する額となるようであるが、かなり大幅なマイナスが予想される。慢性維持透析患者外来医学管理料は、今回の改定では点数に変化はなかった。βリポ蛋白が包括項目からはずれたのは、昨年 の HbA_{1c} と糖尿病の関係のように、メタボリックシンドローム対策と関係するであろう。その他、医療機器安全管理料の新設は、臨床工学技士への点数配分と考えられるが、残念ながら人工腎臓は除外された。現在の医療経済状況を鑑み、ほかの医療分野と比較すると、透析医療費の上昇は考えられず、総額で現状維持に近ければなんとか医療の質は担保できるのではないかと考える。

下記に第 1 回から今回の 11 回までの集計結果の一覧表を提示する。ダイアライザーについては従来 I 型、II 型の分類期間ではほとんどが II 型を使用 (96.9~99.6%)、前年度より I, II, III, IV, V 型の分類となったので、汎用されている IV 型の集計結果を示したが、前年度 63.6% より今年度 72.8% と移行している傾向を認めた。今年度は前年度より注射が +72 点、投薬が +77 点アップであったが、これは合併症対策の自然増であろう。特に骨代謝関連の VD3 やリン吸着薬の使用が幅広く使われたためと考える。請求合計は前年度 39,843 点、今年度 39,977 点で +134 点 (0.34% 増)、これは注射・投薬の +149 点に一致し、自然増の範囲内である。

第1回～第11回調査までの集計結果

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年
施設数(施設)	34	99	125	128	132	149	182	179	190	185	184
総数(人)	3,779	3,603	4,519	4,748	5,058	5,274	8,633	8,388	9,078	8,821	9,265
病院(人)	1,861	1,636	2,039	2,583	2,719	2,670	4,328	3,913	4,053	3,980	3,941
診療所(人)	1,918	1,967	2,480	2,165	2,339	2,604	4,305	4,475	5,025	4,841	5,324
透析回数(回)	12.5	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
平均年齢(歳)	57.1	56.4	56.9	57.8	58.4	62.6	59.4	60.2	60.8	61.4	62.1
透析歴(年)	8.5	8.9	8.7	9.0	9.0	7.8	8.96	9.01	9.1	9.03	9.2
管理指導料(点)	2,593.2	3,019.4	3,025.8	2,920.6	2,921.3	2,813.6	2,832.3	2,635.1	2,638.6	2,510.1	2,525.1
在宅(%)	7.8	6.1	6.3	7.3	7.6	10.5	8.4	9.3	9.3	9.5	10.5
注射(点)	4,633.5	4,419.8	4,186.1	4,198.1	4,697.3	4,432.3	4,637.7	4,452.5	4,602.1	1,291.8	1,363.7
投薬(点)	1,628.1	1,815.0	1,684.3	1,755.5	1,803.1	1,743.4	1,802.6	2,001.7	2,131.4	2,030.9	2,108.1
EPO(%)	72.7	78.1	78.7	79.6	81.9	83.2	82.3	83	83.97	—	—
夜間加算(%)	29.5	30.6	31.1	30.3	29.0	17.9	30.2	29.6	28.9	28.5	28.1
障害者加算(%)	25.9	19.0	17.6	20.8	21.3	24.3	20.8	21.2	20.9	22.1	22.4
検査(点)	533.9	600.9	665.3	575.1	608.0	528.5	524.1	506.3	481.2	356.5	356.9
画像診断(点)	365.8	158.9	161.2	217.7	208.0	212	228.6	218.1	208.1	186	174.3
透析食(点)	—	817.9	818	818.7	817.4	—	—	—	—	—	—
院外処方(%)	19.5	13.3	26.5	27.7	25.6	32.8	33.8	37.6	37.2	44.8	44.7
除夜障害手術(点)	43,124.7	43,525.7	43,095.5	42,303.5	42,971.6	39,286.1	39,604.8	38,795.9	38,997.1	38,362.1	38,498.3
透析医療費(除夜障害手術)/1回(点)	3,317.3	3,348.1	3,315.0	3,254.1	3,305.5	3,022.0	3,046.5	2,984.3	2,999.8	2,950.9	2,961.4
請求合計(点)	45,338.0	45,700.5	45,242.9	44,540.6	45,137.6	40,755.3	41,824.9	41,014.3	41,160.8	39,843.1	39,976.7
透析医療費(請求合計)/1回(点)	3,487.5	3,515.4	3,480.2	3,426.2	3,472.1	3,135.0	3,217.3	3,154.9	3,166.2	3,064.9	3,075.1
Ⅱ型(%)	—	—	96.9	98.2	98.7	99.0	98.99	99.60	98.49	—	—
Ⅳ型(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.57	72.8

表 1-2 病院・診療所別集計結果表 一病院・診療所計一最頻値（モード）データ数一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	9,263	9,161	9,263	9,265	2,076	166	2,423
合 計	575,519	84,017.62	8,017,260	23,395,152	270,400	13,280	1,076,400
平 均	62.1309511	9.171228032	865.5144122	2525.110847	130.2504817	80	444.2426744
最頻値（モード）	58	1.09	923	2305	130	80	450
最頻値 データ数	375	101	5,234	2,641	2,072	166	2,361
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	644	278	4,311	974	5,380	5,418	5,749
合 計	186,993	47,589	444,665	1,776,922	1,209,227	11,421,597	7,840,113
平 均	290.3618012	171.1834532	103.1466017	1824.355236	224.7633829	2108.08361	1363.735084
最頻値（モード）	294	174	10	820	168	61	24
最頻値 データ数	623	269	1,440	91	528	10	233
	うち VD ₃	40：処置	うち I 型(230)	うち I 型(207)	うち II 型(166)	うち II 型(188)	うち III 型(171)
標本数	2,199	9,265	173	58	116	278	119
合 計	4,633,615	312,295,534.00	497,720	148,212	243,688	669,468	247,266
平 均	2107.14643	33707.01932	2876.99422	2555.37931	2100.758621	2408.158273	2077.865546
最頻値（モード）	58	1.09	923	2305	130	80	450
最頻値 データ数	375	101	5,234	2,641	2,072	166	2,361
	うち III 型(222)	うち IV 型(224)	うち IV 型(235)	うち V 型(262)	うち V 型(266)	うち特定積層型	うちダイア計
標本数	1,195	1,116	5,629	28	582	89	9,265
合 計	3,367,740	3,209,696	17,079,095	95,368	1,966,538	915,552	28,440,343
平 均	2818.192469	2876.071685	3034.125955	3406	3378.931271	10287.10112	3069.653859
最頻値（モード）	294	174	10	820	168	61	24
最頻値 データ数	623	269	1,440	91	528	10	233
	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うち PTA
標本数	2,605	2,079	3,832	107	25	2,408	24
合 計	9,095,700	3,210,960.00	1,390,713	315,190	59,092	297,196	405,588
平 均	3491.631478	1544.473304	362.920929	2945.700935	2363.68	123.4202658	16899.5
最頻値（モード）	58	1.09	923	2305	130	80	450
最頻値 データ数	375	101	5,234	2,641	2,072	166	2,361
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	25	1,416	4,912	1,940	4,015	7,257	7,094
合 計	420,736	203,467	1,753,190	1,028,259	708,677	1,264,822	400,627
平 均	16829.44	143.6913842	356.9197883	530.0304124	176.5073474	174.289927	56.47406259
最頻値（モード）	294	174	10	820	168	61	24
最頻値 データ数	623	269	1,440	91	528	10	233
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	790	4,166	4,143	0	9,265	9,265	9,265
合 計	833,483	1,333,335.00	1,234,951	0	370,384,193	361,288,493	367,173,233
平 均	1055.041772	320.0516083	298.081342	#DIV/0!	39976.70729	38994.98036	39630.13848
最頻値（モード）	58	1.09	923	2305	130	80	450
最頻値 データ数	375	101	5,234	2,641	2,072	166	2,361
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	9,265	9,265	9,265	9,265	9,265	9,265	
合 計	358,077,533	368,993,480	359,897,780	365,782,520	356,686,820	354,909,898	
平 均	38648.41155	39826.60335	38844.87642	39480.03454	38498.30761	38306.51894	
最頻値（モード）	294	174	10	820	168	61	
最頻値 データ数	623	269	1,440	91	528	10	

表1-4 病院・診療所別集計結果表 一病院1・2計一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	3,940	3,905	3,940	3,941	713	85	0
合計	244,845	35,494.06	3,089,922	9,577,062	92,950	6,800	0
平均	62.14340102	9.089387964	784.2441624	2430.109617	130.3646564	80	#DIV/0!
標準偏差	12.70516302	7.734043884	79.01195374	165.2718731	6.880316059	0	#DIV/0!
標準誤差	0.202410077	0.123764506	1.25876509	2.6326658	0.257669861	0	65535
中央値(メジアン)	62	7.04	741	2325	130	80	#NUM!
最頻値(モード)	59	4.07	741	2305	130	80	#N/A
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	643	278	1,893	449	2,249	2,271	2,517
合計	186,543	47,589	159,175	825,605	485,419	4,780,269	3,451,699
平均	290.1135303	171.1834532	84.08610671	1838.76392	215.8377056	2104.918098	1371.35439
標準偏差	27.55042707	15.42603686	130.6513585	1419.582994	115.7391989	1408.403229	1985.16941
標準誤差	1.086482784	0.925192209	3.002884462	66.99426358	2.440538957	29.55414807	39.56908127
中央値(メジアン)	294	174	20	1530	198	1880	455
最頻値(モード)	294	174	10	820	168	53	26
	うちVD _s	40：処置	うちI型(230)	うちI型(207)	うちII型(166)	うちII型(188)	うちIII型(171)
標本数	995	3,941	59	23	78	133	63
合計	2,112,722	132,686,942.00	172,500	58,581	165,834	323,736	129,618
平均	2123.338693	33668.34357	2923.728814	2547	2126.076923	2434.105263	2057.428571
標準偏差	999.2685498	1859.885922	386.8747383	456.2322973	219.0796433	131.5507313	499.933438
標準誤差	31.67894272	29.62668703	50.36680086	95.13101014	24.80588488	11.40689506	62.98569281
中央値(メジアン)	2008	32708	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値(モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	うちIII型(222)	うちIV型(224)	うちIV型(235)	うちV型(262)	うちV型(266)	うち特定積層型	うちダイア計
標本数	588	503	2,188	21	329	15	3,941
合計	1,651,014	1,449,280	6,616,425	71,526	1,114,274	154,440	11,907,228
平均	2807.846939	2881.272366	3023.960238	3406	3386.851064	10296	3021.372241
標準偏差	394.9768894	242.3332206	254.7885785	0	387.6086225	0	510.1714107
標準誤差	16.28857239	10.80510425	5.446986476	0	21.3695551	0	8.126675156
中央値(メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
最頻値(モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うちPTA
標本数	1,100	922	1,765	66	12	1,129	13
合計	3,850,200	1,418,400.00	801,192	229,833	40,091	138,776	230,687
平均	3500.181818	1538.394794	453.9331445	3482.318182	3340.916667	122.9193977	17745.15385
標準偏差	915.8397667	167.0177333	2665.037601	5488.633085	4041.60498	24.29713495	9141.974922
標準誤差	27.61360795	5.500436113	63.43529823	675.6040299	1166.710861	0.723116206	2535.527642
中央値(メジアン)	3900	1560	130	2316.5	2523	130	13892
最頻値(モード)	3900	1560	130	3130	1500	130	13892
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	16	628	2,266	950	1,837	2,976	2,871
合計	293,837	96,222	890,438	546,799	331,740	866,607	212,108
平均	18364.8125	153.2197452	392.9558694	575.5778947	180.5879151	291.1985887	73.8794845
標準偏差	10943.62018	508.7523339	490.2983808	561.9463089	168.306707	601.5367015	67.42271431
標準誤差	2735.905046	20.30142826	10.29984066	18.23194577	3.9268729	11.02670273	1.25831576
中央値(メジアン)	13119.5	104	239	360	150	92	78
最頻値(モード)	12733	104	55	150	55	92	92
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	518	1,872	1,849	0	3,941	3,941	3,941
合計	631,718	600,711	507,127	0	157,463,471	153,613,271	156,045,071
平均	1219.532819	320.8926282	274.2709573	#DIV/0!	39955.20705	38978.24689	39595.2984
標準偏差	691.8273045	420.3250959	225.4900259	#DIV/0!	3689.224418	3415.568722	3600.59992
標準誤差	30.39714664	9.714767215	5.24395409	65535	58.76677485	54.40763025	57.35504834
中央値(メジアン)	1291	240	238	#NUM!	39420	38247	39016
最頻値(モード)	528	170	170	#N/A	38340	37277	40319
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	3,941	3,941	3,941	3,941	3,941	3,941	
合計	152,194,871	156,662,279	152,812,079	155,243,879	151,393,679	150,568,074	
平均	38618.33824	39751.91043	38774.95027	39392.00178	38415.04161	38205.55037	
標準偏差	3268.39375	3379.459578	3073.872976	3285.340966	2912.689191	2792.958572	
標準誤差	52.06323547	53.83243674	48.96465506	52.33319282	46.39710965	44.48988431	
中央値(メジアン)	37881	39327	38165	38923	37779	37610	
最頻値(モード)	36137	37488	35615	39515	35615	35615	

表 1-8 病院・診療所別集計結果表 一病院・診療所計-TTEST=P 値一

		年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
病院 1								
病院 2	P 値	0.12592307	0.006808097	0	3.63291E-68	0.510386565	#DIV/0!	#DIV/0!
病院 1								
診療所	P 値	0.591000512	0.800171887	0	9.454E-137	0.384393849	#DIV/0!	#DIV/0!
病院 2								
診療所	P 値	0.1930931	0.006097988	1.36439E-48	4.5524E-156	0.666011838	#DIV/0!	#DIV/0!
病 院								
診療所	P 値	0.93422045	0.380011014	0	9.5815E-236	0.509491103	#DIV/0!	#DIV/0!
		特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
病院 1								
病院 2	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.007500516	0.545078855	2.14141E-30	0.895750598	0.000297886
病院 1								
診療所	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	1.38821E-09	0.580072966	0.79088979	0.849782771	0.243742873
病院 2								
診療所	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	6.58506E-09	0.741511506	4.68575E-35	0.976412304	0.0024686
病 院								
診療所	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	9.45385E-14	0.752290138	1.22295E-06	0.884637804	0.797751816
		うち VD ₃	40：処置	うち I 型(230)	うち I 型(207)	うち II 型(166)	うち II 型(188)	うち III 型(171)
病院 1								
病院 2	P 値	0.379863931	0.020381688	0.426963739	0.007325676	#DIV/0!	#DIV/0!	0.950737248
病院 1								
診療所	P 値	0.787078689	0.507859334	0.598093476	0.399631844	0.15271332	0.093416231	0.583268045
病院 2								
診療所	P 値	0.26003445	0.004862051	0.278474365	0.066309109	#DIV/0!	#DIV/0!	0.77564611
病 院								
診療所	P 値	0.486272859	0.090954557	0.344519869	0.913689544	0.15271332	0.091695193	0.59169394
		うち III 型(222)	うち IV 型(224)	うち IV 型(235)	うち V 型(262)	うち V 型(266)	うち特定積層型	うちダイア計
病院 1								
病院 2	P 値	0.401116009	0.179659869	0.051204252	#DIV/0!	0.337903274	#DIV/0!	1.85458E-05
病院 1								
診療所	P 値	0.229766729	0.92756568	0.000154691	#DIV/0!	0.512594208	0.796804645	8.45555E-10
病院 2								
診療所	P 値	0.923963892	0.161542684	0.983739311	#DIV/0!	0.582732106	0.715542615	0.465266324
病 院								
診療所	P 値	0.344749472	0.546029043	0.002510256	#DIV/0!	0.612239783	0.655140153	6.80869E-08
		夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うち PTA
病院 1								
病院 2	P 値	0.034418398	0.436103415	0.439370898	0.04517435	#DIV/0!	0.215605882	0.202781354
病院 1								
診療所	P 値	0.255156561	0.046393328	0.007956601	0.268153075	0.115613142	0.162352735	0.992712094
病院 2								
診療所	P 値	0.154351823	0.668844598	0.323113955	8.56327E-05	#DIV/0!	0.644743633	0.039287495
病 院								
診療所	P 値	0.69211934	0.073304699	0.015873237	0.110898989	0.115613142	0.313065009	0.538084275
		うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
病院 1								
病院 2	P 値	0.917321661	0.056488953	0.007969587	0.170013546	0.001028504	0.146184611	2.76109E-32
病院 1								
診療所	P 値	0.360543363	0.09221767	9.20359E-10	4.01935E-05	0.005301614	5.20901E-68	1.00181E-80
病院 2								
診療所	P 値	0.303255079	0.07321911	0.260835469	0.192232621	0.076938661	1.34138E-58	1.0406E-136
病 院								
診療所	P 値	0.301674097	0.430297537	9.76324E-08	0.000133666	0.13855994	3.53576E-78	1.3855E-117
		うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
病院 1								
病院 2	P 値	0.066468304	7.53232E-19	5.71303E-44	#DIV/0!	0.337211455	0.677416911	0.258059409
病院 1								
診療所	P 値	1.61065E-14	1.9589E-07	0.752850645	#DIV/0!	0.942120557	0.565430164	0.753492876
病院 2								
診療所	P 値	7.71598E-12	2.30084E-37	3.26725E-94	#DIV/0!	0.247108328	0.91830499	0.124869377
病 院								
診療所	P 値	6.02348E-18	0.87585191	8.32571E-13	#DIV/0!	0.609678457	0.66562443	0.393956157
		除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
病院 1								
病院 2	P 値	0.78556974	0.338898266	0.573692601	0.25196396	0.680900726	0.688654398	
病院 1								
診療所	P 値	0.384405059	0.168271579	0.037690896	0.09235759	0.012366949	0.001928836	
病院 2								
診療所	P 値	0.792569491	0.051571792	0.480549309	0.017751291	0.250646924	0.122128781	
病 院								
診療所	P 値	0.413780923	0.057248532	0.048731206	0.020524709	0.012749709	0.001700905	

表2-2 男女別集計結果表 一病院・診療所計一女性一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	3,344	3,306	3,345	3,346	776	54	902
合計	211,926	31,631.73	2,902,882	8,465,112	100,880	4,320	400,725
平均	63.375	9.567976407	867.8272048	2529.919904	130	80	444.2627494
標準偏差	12.57974563	7.707789324	89.1261473	250.6614201	0	0	35.48748397
標準誤差	0.2175398	0.134053578	1.541015732	4.333357579	0	0	1.181603968
中央値(メジアン)	64	7.12	923	2445	130	80	450
最頻値(モード)	59	1.09	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	235	87	1,550	325	1,890	1,905	2,164
合計	67,473	14,964	164,220	602,955	444,326	3,887,381	2,809,740
平均	287.1191489	172	105.9483871	1855.246154	235.0931217	2040.619948	1298.401109
標準偏差	39.01712663	13.1139904	155.2949793	1397.793109	113.7439697	1285.37123	1913.904284
標準誤差	2.545196703	1.405967349	3.944496418	77.53561117	2.616359868	29.44971425	41.14258608
中央値(メジアン)	294	174	30	1612	210	1824	420.5
最頻値(モード)	294	174	10	820	210	978	24
	うちVD _s	40：処置	うちI型(230)	うちI型(207)	うちII型(166)	うちII型(188)	うちIII型(171)
標本数	800	3,346	114	27	62	88	84
合計	1,677,424	110,831.877	326,140	72,036	129,646	209,996	178,353
平均	2096.78	33123.69307	2860.877193	2668	2091.064516	2386.318182	2123.25
標準偏差	1017.767162	1641.050659	479.9567853	119.5115057	282.7032779	310.107269	344.2673336
標準誤差	35.98350311	28.36997933	44.95207153	23	35.90335219	33.05754595	37.56264561
中央値(メジアン)	1919	32305	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値(モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	うちIII型(222)	うちIV型(224)	うちIV型(235)	うちV型(262)	うちV型(266)	うち特定積層型	うちダイア計
標本数	398	732	1,689	18	138	42	3,346
合計	1,122,210	2,112,544	5,116,890	61,308	463,106	431,640	10,223,869
平均	2819.623116	2885.989071	3029.538188	3406	3355.84058	10277.14286	3055.549611
標準偏差	375.7665129	211.0838939	229.3046487	0	497.1965237	122.2082532	845.6124122
標準誤差	18.83547334	7.801885217	5.579535363	0	42.32417879	18.85714286	14.61868744
中央値(メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
最頻値(モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うちPTA
標本数	397	790	1,484	43	6	904	11
合計	1,293,300	1,216,680	564,098	118,004	8,915	110,702	157,079
平均	3257.68262	1540.101266	380.1199461	2744.27907	1485.833333	122.4579646	14279.90909
標準偏差	1216.375088	159.0051131	2199.349798	4074.141659	959.2297778	22.38677436	5265.814039
標準誤差	61.04811567	5.657148047	57.09227607	621.3007783	391.603917	0.74457304	1587.702671
中央値(メジアン)	3900	1560	130	3130	1165	130	12613
最頻値(モード)	3900	1560	130	3130	800	130	#N/A
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	14	573	1,693	707	1,333	2,616	2,562
合計	216,638	67,483	624,715	377,156	242,033	430,622	143,998
平均	15474.14286	117.7713787	368.9988187	533.4596888	181.5701425	164.6108563	56.20530835
標準偏差	9619.854763	206.0907323	443.4925313	514.5183226	157.7824144	438.1088098	63.34535603
標準誤差	2571.014331	8.609563856	10.77848772	19.35045308	4.321589611	8.565705062	1.251483761
中央値(メジアン)	15148	104	256	360	180	60	60
最頻値(モード)	18889	104	55	530	55	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	277	1,528	1,523	0	3,346	3,346	3,346
合計	271,857	503,588	467,083	0	131,563,155	130,269,855	130,346,475
平均	981.433213	329.5732984	306.6861458	#DIV/0!	39319.53228	38933.01106	38955.91004
標準偏差	738.2985679	304.4504381	167.8293514	#DIV/0!	3417.326116	3269.406655	3269.365857
標準誤差	44.3600617	7.788519763	4.300490221	65535	59.07768342	56.52049725	56.51979195
中央値(メジアン)	873	280	280	#NUM!	38599.5	38215	38193.5
最頻値(モード)	129	310	310	#N/A	35803	35818	35803
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	3,346	3,346	3,346	3,346	3,346	3,346	
合計	129,053,175	130,999,057	129,705,757	129,782,377	128,489,077	127,886,122	
平均	38569.38882	39150.94351	38764.4223	38787.32128	38400.80006	38220.59833	
標準偏差	3092.297455	3109.287947	2959.280873	2956.211045	2773.356061	2650.232656	
標準誤差	53.45868784	53.75241424	51.15913806	51.10606782	47.94492706	45.81640749	
中央値(メジアン)	37833.5	38511	38158	38116	37777	37592	
最頻値(モード)	35818	38210	35818	35615	35818	35818	

表 2-3 男女別集計結果表 一病院・診療所計—TTEST=P 値—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
男 性							
女 性	P 値	5.37538E-13	0.000206089	0.062935505	0.158741863	0.122051251	#DIV/0!
		特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬
男 性							
女 性	P 値	0.027081767	0.552360191	0.355378501	0.604593575	1.08478E-06	0.007331303
		うち VD _s	40：処置	うち I 型(230)	うち I 型(207)	うち II 型(166)	うち II 型(188)
男 性							
女 性	P 値	0.710807329	6.0069E-113	0.529075064	0.08934323	0.683410964	0.313898847
		うち III 型(222)	うち IV 型(224)	うち IV 型(235)	うち V 型(262)	うち V 型(266)	うち特定積層型
男 性							
女 性	P 値	0.925274082	0.079122863	0.262946982	#DIV/0!	0.469936432	0.292723677
		夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス
男 性							
女 性	P 値	7.09747E-08	0.258724007	0.695079886	0.700699926	0.41776453	0.109683694
		うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像
男 性							
女 性	P 値	0.442880268	0.047419809	0.161967869	0.824404152	0.158336908	0.16793802
		うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間
男 性							
女 性	P 値	0.044249276	0.136124451	0.028526597	#DIV/0!	9.34536E-43	0.16191551
		除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
男 性							
女 性	P 値	0.060545434	1.15837E-51	0.047513658	6.88252E-58	0.010807307	0.019632421

表 3-1 年齢別集計結果表 一病院・診療所計—40 歳未満—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標 本 数	434	428	434	434	90	6	99
合 計	14,672	3,397.54	375,706	1,083,825	11,700	480	43,875
平 均	33.80645161	7.93817757	865.6820276	2497.292627	130	80	443.1818182
標準偏差	4.630390108	5.926158219	90.50714337	220.681842	0	0	38.7657443
標準誤差	0.222265838	0.28645167	4.344481908	10.5930674	0	0	3.896103896
中央値 (メジアン)	35	7.03	923	2435	130	80	450
最 頻 値 (モード)	39	1.11	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標 本 数	35	11	185	18	254	255	293
合 計	9,996	1,914	15,490	30,061	55,766	562,701	393,436
平 均	285.6	174	83.72972973	1670.055556	219.5511811	2206.670588	1342.784983
標準偏差	34.61910387	0	154.0746658	879.3507948	115.1602567	1484.837991	1511.880261
標準誤差	5.851696587	0	11.32779472	207.26497	7.225797158	92.98416183	88.32498792
中央値 (メジアン)	294	174	20	1605	205	1943	665
最 頻 値 (モード)	294	174	10	1810	168	1813	2223
	うち VD ₃	40：処置	うち I 型(230)	うち I 型(207)	うち II 型(166)	うち II 型(188)	うち III 型(171)
標 本 数	142	434	3	2	1	13	1
合 計	335,844	15,039,015	8,970	5,382	2,158	31,772	2,223
平 均	2365.098592	34652.10829	2990	2691	2158	2444	2223
標準偏差	1079.968021	1906.378526	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
標準誤差	90.62890308	91.5090976	0	0	0	0	0
中央値 (メジアン)	2223	35605	2990	2691	2158	2444	2223
最 頻 値 (モード)	2223	36205	2990	2691	#N/A	2444	#N/A
	うち III 型(222)	うち IV 型(224)	うち IV 型(235)	うち V 型(262)	うち V 型(266)	うち特定積層型	うちダイア計
標 本 数	48	18	311	1	40	1	434
合 計	134,532	52,640	943,760	3,406	133,000	10,296	1,328,139
平 均	2802.75	2924.444444	3034.598071	3406	3325	10296	3060.228111
標準偏差	406.0685667	52.79730633	181.3713421	#DIV/0!	532	#DIV/0!	393.3658993
標準誤差	58.61094907	12.44444444	10.28462527	0	84.11658576	0	18.88216741
中央値 (メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
最 頻 値 (モード)	2886	2912	3055	#N/A	3458	#N/A	3055
	夜間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うち PTA
標 本 数	264	48	183	4	2	114	1
合 計	928,200	73,800	85,644	35,560	4,253	13,644	11,622
平 均	3515.909091	1537.5	468	8890	2126.5	119.6842105	11622
標準偏差	851.5992154	155.8845727	3503.894925	13807.10687	886.0047968	26.33256196	#DIV/0!
標準誤差	52.41230857	22.5	259.015366	6903.553433	626.5	2.466270391	0
中央値 (メジアン)	3900	1560	130	2485	2126.5	130	11622
最 頻 値 (モード)	3900	1560	130	#N/A	#N/A	130	#N/A
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標 本 数	1	66	201	90	160	333	326
合 計	45,843	10,282	79,820	46,832	32,252	66,887	22,108
平 均	45843	155.7878788	397.1144279	520.3555556	201.575	200.8618619	67.81595092
標準偏差	#DIV/0!	453.9503367	424.7146358	493.3821891	132.8662518	545.2418874	129.2699615
標準誤差	0	55.87742377	29.95706063	52.00704915	10.5039995	29.87907138	7.15960099
中央値 (メジアン)	45843	104	256	361.5	200	78	60
最 頻 値 (モード)	#N/A	104	256	530	256	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標 本 数	35	189	188	0	434	434	434
合 計	40,159	56,508	52,648	0	17,774,006	16,845,806	17,700,206
平 均	1147.4	298.984127	280.0425532	#DIV/0!	40953.93088	38815.2212	40783.88479
標準偏差	934.6168828	263.3938576	149.8245616	#DIV/0!	3779.998743	3423.695665	3771.202062
標準誤差	157.979087	19.15908397	10.9270792	65535	181.445746	164.342651	181.0234918
中央値 (メジアン)	1142	278	275	#NUM!	40387.5	38278	40234
最 頻 値 (モード)	291	136	136	#N/A	42178	36137	42178
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標 本 数	434	434	434	434	434	434	
合 計	16,772,006	17,688,362	16,760,162	17,614,562	16,686,362	16,656,301	
平 均	38645.17512	40756.59447	38617.88479	40586.54839	38447.83871	38378.57373	
標準偏差	3376.334172	2898.849248	2477.591687	2888.53257	2413.114161	2396.331541	
標準誤差	162.0692265	139.1492167	118.9282068	138.6540004	115.8331865	115.0275949	
中央値 (メジアン)	38141.5	40379.5	38206	40151	38125.5	38038.5	
最 頻 値 (モード)	36137	41339	35625	41339	35625	35625	

表 3-2 年齢別集計結果表 一病院・診療所計—40~64 歳—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	4,786	4,737	4,786	4,786	1,095	87	1,180
合計	264,394	49,042.18	4,134,035	12,021,815	142,480	6,960	524,250
平均	55.24320936	10.35300401	863.7766402	2511.871082	130.1187215	80	444.279661
標準偏差	6.339191664	8.234409239	89.41216156	240.0458844	3.928586254	0	35.43187698
標準誤差	0.091632078	0.119641198	1.292439573	3.469827761	0.118721461	0	1.031461817
中央値 (メジアン)	57	8.09	923	2435	130	80	450
最頻値 (モード)	58	1.09	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	318	142	2,194	487	2,785	2,808	2,973
合計	92,178	24,447	199,770	857,632	620,106	6,065,906	4,099,190
平均	289.8679245	172.1619718	91.05287147	1761.051335	222.659246	2160.222934	1378.80592
標準偏差	27.22707717	12.55548668	139.5939292	906.5886878	114.968414	1436.921818	1890.512783
標準誤差	1.526818672	1.053633036	2.980219279	41.08145484	2.178542017	27.11655958	34.67226103
中央値 (メジアン)	294	174	20	1656	210	1941	536
最頻値 (モード)	294	174	10	820	168	2	2223
	うち VD _s	40：処置	うち I 型(230)	うち I 型(207)	うち II 型(166)	うち II 型(188)	うち III 型(171)
標本数	1,300	4,786	36	10	44	126	30
合計	2,814,983	163,356,748	105,110	25,461	94,952	307,004	64,638
平均	2165.371538	34132.20811	2919.722222	2546.1	2158	2436.539683	2154.6
標準偏差	997.6354884	2031.674413	273.9080775	458.214033	0	102.0084429	293.1007359
標準誤差	27.66943006	29.36755319	45.65134625	144.9	0	9.087634374	53.51262822
中央値 (メジアン)	2223	33745.5	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値 (モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	うち III 型(222)	うち IV 型(224)	うち IV 型(235)	うち V 型(262)	うち V 型(266)	うち特定積層型	うちダイア計
標本数	602	372	3,182	14	384	41	4,786
合計	1,692,972	1,068,928	9,652,155	47,684	1,295,686	422,136	14,776,726
平均	2812.245847	2873.462366	3033.361094	3406	3374.182292	10296	3087.489762
標準偏差	379.6384382	267.9809527	206.3232022	0	440.6129342	0	698.6024386
標準誤差	15.47290762	13.89416516	3.657614935	0	22.48493464	0	10.09819494
中央値 (メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
最頻値 (モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うち PTA
標本数	1,953	945	1,825	52	10	1,181	13
合計	6,868,800	1,451,040	602,095	133,451	19,755	144,811	214,801
平均	3517.050691	1535.492063	329.9150685	2566.365385	1975.5	122.6172735	16523.15385
標準偏差	912.0275029	172.6279806	1892.361051	3226.049105	1302.676753	24.73937039	7242.885151
標準誤差	20.63748703	5.615588629	44.29682167	447.3725178	411.9425594	0.719885944	2008.814907
中央値 (メジアン)	3900	1560	130	2360	1500	130	13892
最頻値 (モード)	3900	1560	130	3130	1500	130	13892
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	9	642	2,534	928	2,104	3,704	3,610
合計	120,646	101,058	860,244	470,304	383,855	612,017	201,428
平均	13405.11111	157.411215	339.480663	506.7931034	182.4405894	165.2313715	55.79722992
標準偏差	8236.987942	516.5058886	404.2273054	475.8128868	162.2693067	435.1173335	48.44651687
標準誤差	2745.662647	20.38486141	8.030125657	15.61932322	3.537638999	7.14942139	0.806322832
中央値 (メジアン)	12733	104	228	350	175	60	60
最頻値 (モード)	#N/A	104	55	530	55	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	372	2,156	2,147	0	4,786	4,786	4,786
合計	396,966	669,044	638,260	0	193,198,263	186,329,463	191,747,223
平均	1067.112903	310.3172542	297.2799255	#DIV/0!	40367.37631	38932.19035	40064.19202
標準偏差	766.4972932	271.327332	162.0095564	#DIV/0!	3418.71758	3072.347972	3319.636994
標準誤差	39.74103336	5.843447765	3.496428169	65535	49.41705704	44.41033558	47.98486182
中央値 (メジアン)	1170	276	276	#NUM!	39931	38281.5	39745.5
最頻値 (モード)	442	170	170	#N/A	40487	35818	39718
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	4,786	4,786	4,786	4,786	4,786	4,786	
合計	184,878,423	192,596,168	185,727,368	191,145,128	184,276,328	183,418,696	
平均	38629.00606	40241.57292	38806.38696	39938.38863	38503.20267	38324.00669	
標準偏差	2910.899548	3286.22624	2900.862371	3191.58748	2739.270792	2667.029862	
標準誤差	42.07662248	47.50191432	41.93153657	46.13392504	39.5957542	38.55152224	
中央値 (メジアン)	38004	39874	38234.5	39688	37940.5	37758	
最頻値 (モード)	35818	41678	35818	39718	35818	35818	

表 3-3 年齢別集計結果表 一病院・診療所計—65～69 歳—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	1,373	1,358	1,372	1,373	305	17	382
合計	91,894	12,817.03	1,191,775	3,485,972	39,650	1,360	169,425
平均	66.92935178	9.438166421	868.6406706	2538.945375	130	80	443.5209424
標準偏差	1.417854476	7.783930016	88.7800528	258.4202948	0	0	37.67659495
標準誤差	0.038264531	0.211226809	2.396836134	6.974151044	0	0	1.927702297
中央値 (メジアン)	67	7.09	923	2445	130	80	450
最頻値 (モード)	66	4.07	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	87	40	689	159	830	832	844
合計	25,578	6,699	78,495	277,320	193,669	1,792,236	1,153,548
平均	294	167.475	113.9259797	1744.150943	233.3361446	2154.129808	1366.763033
標準偏差	0	23.20697011	154.3120763	1092.012607	119.7431671	1346.808078	2086.941049
標準誤差	0	3.669344156	5.878821907	86.60223297	4.156346008	46.69216908	71.83547341
中央値 (メジアン)	294	174	30	1581	210	1946.5	379.5
最頻値 (モード)	294	174	10	820	168	2896	24
	うち VD _s	40：処置	うち I 型(230)	うち I 型(207)	うち II 型(166)	うち II 型(188)	うち III 型(171)
標本数	299	1,373	16	6	10	51	16
合計	613,447	45,845.898	43,470	15,525	20,086	124,456	30,267
平均	2051.662207	33391.04006	2716.875	2587.5	2008.6	2440.313725	1891.6875
標準偏差	975.3258978	1684.586884	775.2910744	253.5221884	472.4442824	26.32526558	662.1881625
標準誤差	56.40455303	45.46300586	193.8227686	103.5	149.4	3.68627451	165.5470406
中央値 (メジアン)	1999	32411	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値 (モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	うち III 型(222)	うち IV 型(224)	うち IV 型(235)	うち V 型(262)	うち V 型(266)	うち特定積層型	うちダイア計
標本数	167	183	833	3	93	12	1,373
合計	465,978	526,400	2,532,360	10,218	317,604	123,552	4,209,916
平均	2790.287425	2876.502732	3040.048019	3406	3415.096774	10296	3066.217043
標準偏差	464.5726252	249.8358334	165.2945654	0	340.3081105	0	712.7254946
標準誤差	35.94970906	18.46839623	5.727117249	0	35.2883072	0	19.23477123
中央値 (メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
最頻値 (モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うち PTA
標本数	248	357	595	12	4	374	0
合計	842,700	554,880	166,369	20,700	4,630	46,657	0
平均	3397.983871	1554.285714	279.6117647	1725	1157.5	124.7513369	#DIV/0!
標準偏差	1066.32099	82.48157535	1562.29728	1341.339222	395.6745295	20.23666107	#DIV/0!
標準誤差	67.71145056	4.365387888	64.0479441	387.2112805	197.8372648	1.046412833	65535
中央値 (メジアン)	3900	1560	130	1600	1165	130	#NUM!
最頻値 (モード)	3900	1560	130	3130	1500	130	#N/A
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	5	224	770	322	635	1,111	1,087
合計	82,600	32,382	299,687	182,734	112,542	202,211	60,621
平均	16520	144.5625	389.2038961	567.4968944	177.2314961	182.0081008	55.76908924
標準偏差	3377.262723	356.5697507	506.1316833	584.8273343	163.4858495	445.239224	48.39209334
標準誤差	1510.357805	23.8243186	18.23971978	32.59115315	6.487738038	13.35784463	1.46777551
中央値 (メジアン)	18348	104	228	360	140	78	60
最頻値 (モード)	#N/A	104	55	530	55	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	133	587	579	0	1,373	1,373	1,373
合計	135,184	204,759	178,149	0	54,624,085	53,781,385	54,069,205
平均	1016.421053	348.8228279	307.6839378	#DIV/0!	39784.4756	39170.71012	39380.33867
標準偏差	701.4754819	393.1375489	238.7605581	#DIV/0!	3352.893634	3187.796192	3213.891654
標準誤差	60.82563837	16.2265232	9.92255017	65535	90.48664951	86.03106099	86.73531562
中央値 (メジアン)	1174	280	276	#NUM!	39184	38533	38701
最頻値 (モード)	129	310	310	#N/A	36692	38818	36587
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	1,373	1,373	1,373	1,373	1,373	1,373	
合計	53,226,505	54,457,716	53,615,016	53,902,836	53,060,136	52,782,816	
平均	38766.5732	39663.30371	39049.53824	39259.16679	38645.40131	38443.42025	
標準偏差	3010.62894	3130.910477	2949.914867	2992.055774	2768.832475	2680.634963	
標準誤差	81.2497369	84.4958504	79.61120805	80.7484912	74.72422363	72.34398189	
中央値 (メジアン)	38092	39121	38455	38636	38045	37898	
最頻値 (モード)	36587	36142	36142	36587	36587	36587	

表 3-4 年齢別集計結果表 一病院・診療所計一70歳以上一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	2,670	2,636	2,669	2,670	586	56	762
合計	204,559	18,750.67	2,313,911	6,798,680	76,570	4,480	338,850
平均	76.61385768	7.113304249	866.9580367	2546.322097	130.665529	80	444.6850394
標準偏差	5.2460225	6.308086209	91.54929874	255.1955113	9.285633024	0	34.19285971
標準誤差	0.101525355	0.122864075	1.772069436	4.938754068	0.383585965	0	1.238676615
中央値 (メジアン)	76	5.09	923	2465	130	80	450
最頻値 (モード)	72	1.09	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	204	85	1,242	310	1,510	1,522	1,638
合計	59,241	14,529	150,660	611,909	339,560	3,000,243	2,193,887
平均	290.3970588	170.9294118	121.3043478	1973.9	224.8741722	1971.250329	1339.369353
標準偏差	34.02772256	16.14870497	159.2006041	1865.476829	110.2815605	1195.132348	2180.117045
標準誤差	2.38241711	1.751572981	4.517351799	105.9519641	2.838013319	30.63435037	53.867009
中央値 (メジアン)	294	174	30	1520.5	210	1797	338
最頻値 (モード)	294	174	10	300	168	61	24
	うち VD _s	40：処置	うち I 型(230)	うち I 型(207)	うち II 型(166)	うち II 型(188)	うち III 型(171)
標本数	458	2,670	118	40	61	88	72
合計	869,341	87,989,379	340,170	101,844	126,492	206,236	150,138
平均	1898.124454	32954.8236	2882.79661	2546.1	2073.639344	2343.590909	2085.25
標準偏差	916.1700127	1387.249765	464.5793715	516.0649333	323.0579944	413.0189564	425.3403194
標準誤差	42.80981329	26.84720192	42.76799774	81.59703049	41.36333764	44.02796868	50.12683736
中央値 (メジアン)	1729	32305	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値 (モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	うち III 型(222)	うち IV 型(224)	うち IV 型(235)	うち V 型(262)	うち V 型(266)	うち特定積層型	うちダイア計
標本数	378	542	1,302	10	65	35	2,670
合計	1,074,258	1,558,816	3,947,765	34,060	220,248	359,568	8,119,595
平均	2841.952381	2876.04428	3032.077573	3406	3388.430769	10273.37143	3041.046816
標準偏差	304.6827595	263.5727195	214.1727111	0	410.6796946	133.8724339	863.5923835
標準誤差	15.67119016	11.32141771	5.935518214	0	50.93854692	22.62857143	16.71295226
中央値 (メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
最頻値 (モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うち PTA
標本数	140	729	1,228	39	9	739	10
合計	456,000	1,131,240	536,501	125,479	30,454	92,084	179,165
平均	3257.142857	1551.769547	436.8900651	3217.410256	3383.777778	124.6062246	17916.5
標準偏差	1211.048826	103.5961708	2493.045782	4508.411645	4720.507647	20.27294817	7388.594187
標準誤差	102.3523068	3.836895214	71.1428191	721.9236334	1573.502549	0.745752453	2336.478634
中央値 (メジアン)	3900	1560	130	3130	2523	130	14463
最頻値 (モード)	3900	1560	130	3130	480	130	#N/A
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	10	483	1,407	600	1,116	2,108	2,070
合計	171,647	59,641	513,439	328,389	180,028	383,629	116,392
平均	17164.7	123.4803313	364.9175551	547.315	161.3154122	181.9871917	56.22801932
標準偏差	8981.509859	202.6367197	459.941587	536.4156865	157.3250868	457.9455249	42.55814761
標準誤差	2840.202798	9.220290005	12.2618396	21.8990787	4.709403289	9.974210192	0.935400384
中央値 (メジアン)	13074	104	200	360	82	60	60
最頻値 (モード)	#N/A	104	55	150	55	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	250	1,233	1,228	0	2,670	2,670	2,670
合計	261,174	402,982	365,852	0	104,715,865	104,259,865	103,584,625
平均	1044.696	326.8304947	297.9250814	#DIV/0!	39219.42509	39048.63858	38795.7397
標準偏差	743.6392141	345.4396027	221.8347864	#DIV/0!	3482.514598	3405.585977	3330.243754
標準誤差	47.03187348	9.837632329	6.330389996	65535	67.39649555	65.9077094	64.44962455
中央値 (メジアン)	1114.5	276	273	#NUM!	38387	38249.5	37907.5
最頻値 (モード)	129	170	170	#N/A	36760	35803	35956
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	
合計	103,128,625	104,179,364	103,723,364	103,048,124	102,592,124	101,980,215	
平均	38624.95318	39018.48839	38847.70187	38594.803	38424.01648	38194.83708	
標準偏差	3242.808227	3137.551963	3061.1467	2961.012832	2872.134677	2692.235406	
標準誤差	62.7575001	60.72049404	59.24183635	57.30396314	55.58391977	52.10236066	
中央値 (メジアン)	37758.5	38323	38167.5	37834	37698.5	37502	
最頻値 (モード)	36760	36925	38769	36925	36925	35818	

表3-5 年齢別集計結果表 一病院・診療所計一75歳以上一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	1,529	1,510	1,528	1,529	328	36	426
合計	122,523	9,617.12	1,323,691	3,885,358	42,770	2,880	189,450
平均	80.13276651	6.368953642	866.2899215	2541.11053	130.3963415	80	444.7183099
標準偏差	4.205460206	5.543811321	96.81083765	250.9864652	7.178049195	0	34.10593177
標準誤差	0.107549844	0.14266583	2.47663668	6.418692337	0.396341463	0	1.652437793
中央値(メジアン)	79	5.05	923	2455	130	80	450
最頻値(モード)	76	2.11	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	119	43	708	159	846	853	947
合計	34,545	7,308	84,060	335,398	191,608	1,637,257	1,256,034
平均	290.2941176	169.9534884	118.7288136	2109.421384	226.4869976	1919.410317	1326.329461
標準偏差	23.1415515	18.53818901	156.2412359	2218.752781	112.2709073	1193.849647	2181.290343
標準誤差	2.121382548	2.827047321	5.87190522	175.9585411	3.859953306	40.87663336	70.88241197
中央値(メジアン)	294	174	30	1400	210	1717	350
最頻値(モード)	294	174	10	300	168	61	24
	うちVD ₃	40：処置	うちI型(230)	うちI型(207)	うちII型(166)	うちII型(188)	うちIII型(171)
標本数	237	1,529	92	25	45	48	58
合計	443,787	50,226,570	267,720	62,100	92,462	112,236	121,752
平均	1872.518987	32849.29366	2910	2484	2054.711111	2338.25	2099.172414
標準偏差	921.2268238	1306.772487	414.0207565	638.0168493	368.2889566	415.7150466	416.1510833
標準誤差	59.8401126	33.41921462	43.16464772	127.6033699	54.90127616	60.00329852	54.64331428
中央値(メジアン)	1729	32305	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値(モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	うちIII型(222)	うちIV型(224)	うちIV型(235)	うちV型(262)	うちV型(266)	うち特定積層型	うちダイア計
標本数	221	361	657	7	22	23	1,529
合計	628,926	1,036,000	1,979,875	23,842	74,746	236,016	4,635,675
平均	2845.819005	2869.806094	3013.508371	3406	3397.545455	10261.56522	3031.834532
標準偏差	252.5697092	281.6604261	296.3917619	0	199.9313519	165.1434159	925.1755179
標準誤差	16.9896772	14.82423295	11.56334394	0	42.62550744	34.43478261	23.66030775
中央値(メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	2990
最頻値(モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うちPTA
標本数	40	413	746	27	6	447	6
合計	110,100	642,480	352,727	95,572	22,685	55,626	118,724
平均	2752.5	1555.641646	472.8243968	3539.703704	3780.833333	124.442953	19787.33333
標準偏差	1517.418101	69.06017785	2792.573881	5376.848311	5902.005334	20.3903771	9092.477279
標準誤差	239.924868	3.398229194	102.2433941	1034.77494	2409.483588	0.964431743	3711.988305
中央値(メジアン)	3900	1560	130	3130	1661.5	130	15899
最頻値(モード)	3900	1560	130	3130	480	130	#N/A
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	6	295	773	355	588	1,191	1,168
合計	116,579	38,888	291,838	196,843	92,601	222,293	67,740
平均	19429.83333	131.8237288	377.5394567	554.4873239	157.4846939	186.6439966	57.99657534
標準偏差	11244.71457	236.3658443	483.174166	554.1317602	156.7848647	449.7852756	45.86538167
標準誤差	4590.6355	13.76175151	17.37856685	29.41026014	6.465698846	13.03314879	1.342034222
中央値(メジアン)	15448	104	200	360	73	78	60
最頻値(モード)	#N/A	104	55	530	55	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	144	726	725	0	1,529	1,529	1,529
合計	152,478	226,575	208,105	0	59,728,481	59,618,381	59,086,001
平均	1058.875	312.0867769	287.0413793	#DIV/0!	39063.75474	38991.74689	38643.55853
標準偏差	753.0379672	286.4786146	163.7583567	#DIV/0!	3569.286669	3527.978535	3419.417312
標準誤差	62.75316393	10.6322186	6.081832685	65535	91.28043209	90.22402371	87.44769438
中央値(メジアン)	1178.5	272	271	#NUM!	38209	38149	37704
最頻値(モード)	129	170	170	#N/A	35803	35803	35803
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	1,529	1,529	1,529	1,529	1,529	1,529	
合計	58,975,901	59,375,754	59,265,654	58,733,274	58,623,174	58,287,776	
平均	38571.55069	38833.06344	38761.05559	38412.86723	38340.85939	38121.50164	
標準偏差	3375.109798	3160.380287	3141.067713	2978.074875	2956.240679	2743.747564	
標準誤差	86.31458027	80.82311816	80.32922112	76.16086535	75.60248072	70.16821185	
中央値(メジアン)	37645	38116	38047	37628	37558	37389	
最頻値(モード)	35803	36419	36419	36419	36419	36419	

表 3-7-1 年齢別集計結果表 一病院・診療所計—TTEST=P 値—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)	
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0	3.23375E-09	0.671103683	0.222774143	0.774484155	#DIV/0!	0.768876487
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0	0.000253958	0.547059976	0.00250558	#DIV/0!	#DIV/0!	0.936798008
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0	0.011455123	0.787392986	0.000160259	0.497039794	#DIV/0!	0.685599467
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0	3.93626E-07	0.906807027	0.001007257	0.600997915	#DIV/0!	0.694355423
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0	0.000261497	0.075255676	0.000296373	0.597838759	#DIV/0!	0.720322976
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0	1.7061E-67	0.144261137	6.59516E-09	0.091767769	#DIV/0!	0.802945711
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0	1.61689E-67	0.348649353	4.17505E-05	0.365494098	#DIV/0!	0.824973555
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0	5.42472E-24	0.576222174	0.386164823	0.211126015	#DIV/0!	0.599932478
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0	1.12699E-33	0.497255482	0.819047302	0.335290856	#DIV/0!	0.635523915
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射	
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.393122719	0.629050012	0.49687657	0.675686055	0.680077757	0.62215979	0.751785705
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.024536467	0.359140127	0.018300806	0.781628596	0.10558202	0.59499618	0.856509766
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.442893433	0.531697687	0.00268247	0.493291583	0.479571034	0.005100428	0.979474374
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.352025896	0.47546557	0.00664187	0.407088968	0.390909777	0.001525751	0.904128858
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.158051426	0.0928475	0.000260408	0.846499643	0.020082056	0.913248003	0.873267698
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.84453339	0.521695286	7.40019E-09	0.031789231	0.540912792	1.24034E-05	0.521303111
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.879668366	0.371208969	8.83547E-06	0.00493572	0.393869767	8.83758E-06	0.474143758
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.324650363	0.336652418	0.324086874	0.152874868	0.085204476	0.000707756	0.763547841
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.137060472	0.591082242	0.563405486	0.063456897	0.227131353	0.000157211	0.689472248
	うち VD _s	40：処置	うち I 型(230)	うち I 型(207)	うち II 型(166)	うち II 型(188)	うち III 型(171)	
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.024833656	3.00055E-07	0.663218191	0.676081185	#DIV/0!	0.79307595	#DIV/0!
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.002469606	7.92435E-38	0.558962522	0.603645057	#DIV/0!	0.617535569	#DIV/0!
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	5.08939E-07	2.8276E-102	0.691306226	0.696810743	#DIV/0!	0.384885639	#DIV/0!
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	3.34428E-06	1.9217E-101	0.739920065	0.656150886	#DIV/0!	0.365705738	#DIV/0!
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.07453882	1.19189E-34	0.167955819	0.843024515	0.034617462	0.794922135	0.068045738
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	5.30835E-07	8.2132E-150	0.651308087	1	0.086659222	0.016158868	0.417056155
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	2.77394E-05	2.2215E-114	0.896745404	0.781816856	0.066250663	0.0142642	0.517387634
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.028325635	2.23044E-18	0.223759822	0.84886678	0.583663767	0.097618023	0.144217313
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.030896786	4.83856E-22	0.141953668	0.702345929	0.735215706	0.083253797	0.128615478
	うち III 型(222)	うち IV 型(224)	うち IV 型(235)	うち V 型(262)	うち V 型(266)	うち特定積層型	うちダイア計	
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.868280846	0.42106035	0.918805187	#DIV/0!	0.51085853	#DIV/0!	0.422896701
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.866554805	0.418560676	0.629209129	#DIV/0!	0.243746398	#DIV/0!	0.867255224
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.420836691	0.436947823	0.847959409	#DIV/0!	0.494512856	#DIV/0!	0.649099566
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.344559386	0.411994906	0.247827328	#DIV/0!	0.541348039	#DIV/0!	0.53305058
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.529945735	0.897840476	0.386820406	#DIV/0!	0.403109493	#DIV/0!	0.322149587
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.19955915	0.885134331	0.851668127	#DIV/0!	0.807803128	0.282068435	0.011627207
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.223151528	0.857131618	0.038947426	#DIV/0!	0.805013912	0.183958341	0.012658679
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.124239581	0.98356272	0.3608492	#DIV/0!	0.657061778	0.563931495	0.352741098
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.132649791	0.785786679	0.028773193	#DIV/0!	0.816861984	0.478335093	0.266139383

表 3-7-2 年齢別集計結果表 一病院・診療所計—TTEST=P 値—

		夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うちPTA
40歳未満								
40～64歳	P 値	0.984654909	0.937079977	0.394381103	0.009314485	0.880798838	0.229623959	#DIV/0!
40歳未満								
65～69歳	P 値	0.166116299	0.246311882	0.306708244	0.076984605	0.116405713	0.030341385	#DIV/0!
40歳未満								
70歳以上	P 値	0.012882681	0.373291952	0.882040239	0.066264553	0.726729603	0.021140395	#DIV/0!
40歳未満								
75歳以上	P 値	4.57254E-06	0.148873226	0.984164945	0.15013488	0.72040493	0.037264799	#DIV/0!
40～64歳								
65～69歳	P 値	0.057837084	0.048671119	0.5576003	0.38139204	0.25061706	0.129902466	#DIV/0!
40～64歳								
70歳以上	P 値	0.001506826	0.024444319	0.178577007	0.424001989	0.376368821	0.066824805	0.654893211
40～64歳								
75歳以上	P 値	2.71798E-07	0.022008236	0.133634938	0.317831118	0.358035712	0.164266694	0.410167876
65～69歳								
70歳以上	P 値	0.23519952	0.688601344	0.158592945	0.266328121	0.377770416	0.910158121	#DIV/0!
65～69歳								
75歳以上	P 値	0.000990203	0.804001006	0.131364818	0.259364044	0.409731445	0.828606465	#DIV/0!
		うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
40歳未満								
40～64歳	P 値	#DIV/0!	0.980402698	0.052685302	0.796972959	0.145854465	0.161919464	0.0004774
40歳未満								
65～69歳	P 値	#DIV/0!	0.833415693	0.838679629	0.485420626	0.081596553	0.521051847	0.011263936
40歳未満								
70歳以上	P 値	#DIV/0!	0.318000407	0.348905942	0.653494481	0.002094335	0.4966434	0.001705608
40歳未満								
75歳以上	P 値	#DIV/0!	0.541825005	0.600333004	0.594208665	0.001193182	0.627270044	0.031224403
40～64歳								
65～69歳	P 値	0.440650528	0.730408883	0.004994302	0.063904089	0.479156861	0.262293999	0.986602016
40～64歳								
70歳以上	P 値	0.356837357	0.172001457	0.071873323	0.122411554	0.000386831	0.166203996	0.736247053
40～64歳								
75歳以上	P 値	0.250661221	0.416712857	0.028985433	0.125635844	0.00090859	0.14293897	0.171997119
65～69歳								
70歳以上	P 値	0.880918368	0.318628008	0.25594496	0.59794496	0.044967111	0.999008026	0.783804756
65～69歳								
75歳以上	P 値	0.593258977	0.625461139	0.643401356	0.766458155	0.0315596	0.803911215	0.261913988
		うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
40歳未満								
40～64歳	P 値	0.561770745	0.581081663	0.159539198	#DIV/0!	0.00070075	0.452121187	1.95897E-05
40歳未満								
65～69歳	P 値	0.362539644	0.103777436	0.135501882	#DIV/0!	1.02835E-09	0.046876926	4.92621E-14
40歳未満								
70歳以上	P 値	0.459957031	0.288509959	0.285500262	#DIV/0!	3.84004E-21	0.185833479	4.12568E-29
40歳未満								
75歳以上	P 値	0.553448424	0.569343479	0.595440988	#DIV/0!	2.15925E-21	0.354592911	1.8236E-28
40～64歳								
65～69歳	P 値	0.503788527	0.006128513	0.219838751	#DIV/0!	2.32667E-08	0.011946341	1.34732E-11
40～64歳								
70歳以上	P 値	0.717545111	0.123766543	0.922780102	#DIV/0!	7.62934E-43	0.131455254	2.41864E-55
40～64歳								
75歳以上	P 値	0.912421285	0.880902965	0.142417076	#DIV/0!	2.80741E-37	0.524918906	1.1751E-46
65～69歳								
70歳以上	P 値	0.718125345	0.225218588	0.394714995	#DIV/0!	7.8225E-07	0.270190279	9.35272E-08
65～69歳								
75歳以上	P 値	0.628482468	0.050660662	0.065004558	#DIV/0!	2.50142E-08	0.15346941	2.79141E-09
		除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
40歳未満								
40～64歳	P 値	0.913009117	0.001611715	0.18990232	4.53491E-05	0.684047195	0.680772177	
40歳未満								
65～69歳	P 値	0.477418667	1.40895E-10	0.005903005	8.36345E-16	0.182116746	0.652569106	
40歳未満								
70歳以上	P 値	0.904659946	8.77217E-27	0.137168968	6.98027E-38	0.870016241	0.180938071	
40歳未満								
75歳以上	P 値	0.688434362	3.70963E-29	0.381489972	7.94279E-40	0.489457249	0.076944833	
40～64歳								
65～69歳	P 値	0.125618444	6.64607E-09	0.006398848	2.02561E-12	0.090786394	0.144114758	
40～64歳								
70歳以上	P 値	0.955898599	2.14216E-54	0.563294125	4.87212E-70	0.239626978	0.045725777	
40～64歳								
75歳以上	P 値	0.518602092	2.80328E-48	0.602253869	3.9209E-60	0.047926478	0.01029164	
65～69歳								
70歳以上	P 値	0.178055312	6.49519E-10	0.044505575	1.90649E-11	0.018852498	0.005387539	
65～69歳								
75歳以上	P 値	0.102122218	1.59707E-12	0.011067688	3.25323E-14	0.00433559	0.001437017	

表 4-1 透析歴別集計結果表 一病院・診療所計—10年未満—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	5,698	5,700	5,698	5,700	1,247	111	1,465
合計	360,982	24,124.88	4,933,211	14,354,898	162,630	8,880	650,250
平均	63.35240435	4.232435088	865.7793963	2518.403158	130.4170008	80	443.8566553
標準偏差	13.04078998	2.648079394	90.57158198	241.1660753	7.353882126	0	36.68010711
標準誤差	0.172759794	0.035074668	1.19986043	3.194322702	0.208249246	0	0.958322716
中央値 (メジアン)	64	4.06	923	2435	130	80	450
最頻値 (モード)	59	1.09	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	410	154	2,628	836	3,303	3,324	3,334
合計	118,188	26,100	250,350	1,523,526	729,986	6,948,971	3,780,097
平均	288.2634146	169.4805195	95.26255708	1822.399522	221.0069634	2090.544826	1133.80234
標準偏差	28.50177154	19.370222	142.7101444	1272.789504	112.5578589	1358.081867	1865.489151
標準誤差	1.407602165	1.560896971	2.783826503	44.02034547	1.958490803	23.555669	32.30798927
中央値 (メジアン)	294	174	20	1614.5	200	1880.5	240.5
最頻値 (モード)	294	174	10	820	168	2	24
	うち VD _s	40：処置	うち I 型(230)	うち I 型(207)	うち II 型(166)	うち II 型(188)	うち III 型(171)
標本数	1,007	5,700	152	52	96	195	96
合計	2,006,752	190,955,433	435,160	132,066	200,528	466,616	198,873
平均	1992.802383	33500.95316	2862.894737	2539.730769	2088.833333	2392.902564	2071.59375
標準偏差	900.0380474	1775.605531	495.7670244	495.5052132	298.5734034	292.1835423	456.0621051
標準誤差	28.3626061	23.51846979	40.21201562	68.71420975	30.47302037	20.92369806	46.54664369
中央値 (メジアン)	1801	32405	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値 (モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	うち III 型(222)	うち IV 型(224)	うち IV 型(235)	うち V 型(262)	うち V 型(266)	うち特定積層型	うちダイア計
標本数	733	747	3,325	20	316	51	5,700
合計	2,061,492	2,148,608	10,086,435	68,120	1,061,872	524,304	17,384,074
平均	2812.40382	2876.31593	3033.514286	3406	3360.35443	10280.47059	3049.837544
標準偏差	396.1107101	257.5292103	203.320185	0	487.3597423	110.9021827	722.7084553
標準誤差	14.6306829	9.422501065	3.526019189	0	27.41612747	15.52941176	9.572507338
中央値 (メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
最頻値 (モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うち PTA
標本数	1,329	1,268	2,772	67	17	1,746	12
合計	4,581,000	1,951,800	936,390	214,894	45,076	217,794	195,620
平均	3446.952596	1539.274448	337.8030303	3207.373134	2651.529412	124.7388316	16301.66667
標準偏差	986.028207	159.6704689	2066.839096	4925.623046	3466.945578	21.05613873	7788.479795
標準誤差	27.04748249	4.483993495	39.25636248	601.7606306	840.8578127	0.50391422	2248.340453
中央値 (メジアン)	3900	1560	130	2793	1500	130	13328
最頻値 (モード)	3900	1560	130	3130	1500	130	#N/A
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	19	1,022	3,059	1,177	2,529	4,510	4,422
合計	327,957	148,501	993,897	600,229	384,328	780,064	252,279
平均	17260.89474	145.3043053	324.9091206	509.9651657	151.9683669	172.9631929	57.05088195
標準偏差	10402.86232	440.2717489	422.6660342	514.9431575	148.8777766	447.8845404	45.72872607
標準誤差	2386.580295	13.77194789	7.642010154	15.0096671	2.960434519	6.669262343	0.687669454
中央値 (メジアン)	13259	104	185	350	55	60	60
最頻値 (モード)	18889	104	55	530	55	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	477	2,557	2,546	0	5,700	5,700	5,700
合計	504,530	784,433	738,524	0	225,916,100	221,335,100	223,964,300
平均	1057.714885	306.7786469	290.0722702	#DIV/0!	39634.40351	38830.7193	39291.98246
標準偏差	756.9626602	282.7309121	204.0143208	#DIV/0!	3362.105961	3111.935342	3244.311316
標準誤差	34.6589393	5.591237371	4.043257997	65535	44.53218133	41.21859054	42.97195315
中央値 (メジアン)	1170	272	272	#NUM!	39097.5	38174	38629.5
最頻値 (モード)	129	170	170	#N/A	37638	35669	35962
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	
合計	219,383,300	224,979,710	220,398,710	223,027,910	218,446,910	216,923,384	
平均	38488.29825	39470.12456	38666.44035	39127.70351	38324.0193	38056.73404	
標準偏差	2939.976236	3092.555634	2816.341659	2968.239227	2629.799112	2474.877526	
標準誤差	38.94093654	40.96190003	37.30335655	39.315289	34.83254017	32.78055363	
中央値 (メジアン)	37793	38988.5	38095.5	38532	37726.5	37480	
最頻値 (モード)	35669	35769	35669	36875	35669	35669	

表4-2 透析歴別集計結果表 一病院・診療所計—10~14年—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	1,497	1,497	1,497	1,497	356	33	407
合計	90,968	17,752.83	1,296,777	3,792,720	46,280	2,640	180,225
平均	60.76686707	11.85893788	866.250501	2533.547094	130	80	442.8132678
標準偏差	12.36784787	1.38670015	88.84641356	247.9965727	0	0	39.61339676
標準誤差	0.319656275	0.035840302	2.296301985	6.409656839	0	0	1.963563177
中央値(メジアン)	61	12.03	923	2445	130	80	450
最頻値(モード)	57	12.09	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	104	44	711	90	897	905	992
合計	30,429	7,656	74,905	156,191	205,558	1,967,216	1,593,199
平均	292.5865385	174	105.3516174	1735.455556	229.1616499	2173.719337	1606.047379
標準偏差	14.41453593	0	148.5204595	1344.743116	117.1740424	1349.47118	2079.62593
標準誤差	1.413461538	0	5.569952401	141.7483705	3.912327401	44.85793986	66.02818931
中央値(メジアン)	294	174	30	1410	210	2011	1022
最頻値(モード)	294	174	10	820	168	2072	2223
	うちVD ₃	40：処置	うちI型(230)	うちI型(207)	うちII型(166)	うちII型(188)	うちIII型(171)
標本数	482	1,497	12	4	7	37	10
合計	1,008,214	50,577,366	35,650	10,764	15,106	90,428	22,230
平均	2091.73029	33785.81563	2970.833333	2691	2158	2444	2223
標準偏差	917.9543661	1995.891613	66.39528096	0	0	0	0
標準誤差	41.81167565	51.58531098	19.16666667	0	0	0	0
中央値(メジアン)	2200.5	32708	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値(モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	うちIII型(222)	うちIV型(224)	うちIV型(235)	うちV型(262)	うちV型(266)	うち特定積層型	うちダイア計
標本数	189	140	995	5	105	6	1,497
合計	534,132	402,304	3,022,570	17,030	358,036	61,776	4,570,026
平均	2826.095238	2873.6	3037.758794	3406	3409.866667	10296	3052.789579
標準偏差	341.6411758	285.551865	181.3029971	0	280.3963221	0	495.2796452
標準誤差	24.85073887	24.13353737	5.747691411	0	27.36387912	0	12.80087273
中央値(メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
最頻値(モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うちPTA
標本数	499	229	476	8	2	307	3
合計	1,770,300	355,920	135,645	22,229	7,569	37,698	65,582
平均	3547.695391	1554.235808	284.9684874	2778.625	3784.5	122.7947883	21860.66667
標準偏差	858.6727987	87.22805526	1880.797974	1454.036248	1727.461866	21.44487321	7439.700688
標準誤差	38.43947368	5.76419214	86.20623381	514.0794456	1221.5	1.223923561	4295.313195
中央値(メジアン)	3900	1560	130	3130	3784.5	130	19513
最頻値(モード)	3900	1560	130	3130	#N/A	130	#N/A
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	0	170	777	336	609	1,137	1,109
合計	0	21,636	314,795	188,586	125,777	210,151	62,528
平均	#DIV/0!	127.2705882	405.1415701	561.2678571	206.5303777	184.8293755	56.38232642
標準偏差	#DIV/0!	273.7332908	451.1445559	514.8150744	160.3249357	449.8728448	56.77989594
標準誤差	65535	20.99438504	16.18472079	28.08546485	6.496694248	13.34165011	1.705017415
中央値(メジアン)	#NUM!	104	256	390	200	60	60
最頻値(モード)	#N/A	104	256	530	256	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	138	661	657	0	1,497	1,497	1,497
合計	147,052	212,118	198,438	0	60,227,178	58,456,878	59,871,258
平均	1065.594203	320.9046899	302.0365297	#DIV/0!	40231.91583	39049.3507	39994.16032
標準偏差	714.5812784	295.9574166	183.3610623	#DIV/0!	3440.194718	3132.181047	3367.438221
標準誤差	60.829198	11.51140935	7.153596359	65535	88.91440458	80.95356096	87.0339585
中央値(メジアン)	1232	278	276	#NUM!	39771	38323	39624
最頻値(モード)	442	170	170	#N/A	37663	37663	35818
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497	
合計	58,100,958	60,091,533	58,321,233	59,735,613	57,965,313	57,809,122	
平均	38811.59519	40141.30461	38958.73948	39903.5491	38720.98397	38616.64796	
標準偏差	3003.180764	3297.616618	2950.33076	3218.544855	2809.456058	2717.88413	
標準誤差	77.6194522	85.22936698	76.25350434	83.18569814	72.61249232	70.24574739	
中央値(メジアン)	38162	39721	38304	39526	38113	38008	
最頻値(モード)	35818	35818	37663	35818	35818	35818	

表 4-3 透析歴別集計結果表 一病院・診療所計—15年以上—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	1,964	1,964	1,964	1,964	438	22	506
合計	116,906	42,139.91	1,696,043	4,974,625	56,940	1,760	225,675
平均	59.52443992	21.45616599	863.5656823	2532.904786	130	80	445.9980237
標準偏差	10.25467419	5.180368613	89.78028461	259.1698051	0	0	29.76877885
標準誤差	0.231393484	0.116893381	2.025863762	5.848084786	0	0	1.323383639
中央値 (メジアン)	60	20.1	923	2445	130	80	450
最頻値 (モード)	60	15.09	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	129	65	903	39	1,106	1,115	1,353
合計	38,082	11,223	113,925	83,446	254,800	2,289,238	2,326,267
平均	295.2093023	172.6615385	126.1627907	2139.641026	230.3797468	2053.128251	1719.339985
標準偏差	34.66371356	10.79102191	166.2406461	2066.545802	118.0577453	1332.996931	2119.809962
標準誤差	3.051969802	1.338461538	5.532142303	330.912164	3.549906556	39.92010877	57.62992183
中央値 (メジアン)	294	174	30	1680	210	1872	1424
最頻値 (モード)	294	174	10	300	168	2580	2223
	うち VD _s	40：処置	うち I 型(230)	うち I 型(207)	うち II 型(166)	うち II 型(188)	うち III 型(171)
標本数	682	1,964	7	2	13	44	12
合計	1,557,560	67,302,718	20,930	5,382	28,054	107,536	24,282
平均	2283.812317	34268.18635	2990	2691	2158	2444	2023.5
標準偏差	1142.883346	2044.155606	0	0	0	0	488.2196786
標準誤差	43.76326516	46.12572555	0	0	0	0	140.9368814
中央値 (メジアン)	2223	33865	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値 (モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	うち III 型(222)	うち IV 型(224)	うち IV 型(235)	うち V 型(262)	うち V 型(266)	うち特定積層型	うちダイア計
標本数	266	216	1,229	3	161	32	1,964
合計	751,914	623,392	3,725,690	10,218	546,630	329,472	6,173,500
平均	2826.744361	2886.074074	3031.480879	3406	3395.217391	10296	3143.329939
標準偏差	329.010504	203.8771953	217.1662042	0	386.0615996	0	940.059467
標準誤差	20.17292831	13.87208607	6.194643232	0	30.42591641	0	21.21214493
中央値 (メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
最頻値 (モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うち PTA
標本数	758	561	540	28	5	323	8
合計	2,680,800	870,480	295,234	73,107	4,947	37,794	134,560
平均	3536.675462	1551.657754	546.7296296	2610.964286	989.4	117.0092879	16820
標準偏差	909.6723917	99.4067967	2766.741532	3956.502491	406.9481539	31.00936405	6031.991853
標準誤差	33.04078914	4.196958246	119.0615986	747.7086895	181.9927471	1.72540717	2132.631172
中央値 (メジアン)	3900	1560	130	1293.5	800	130	13892
最頻値 (モード)	3900	1560	130	3130	800	130	13892
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	5	212	1,019	413	825	1,508	1,462
合計	89,329	28,572	425,217	229,874	189,010	267,210	81,465
平均	17865.8	134.7735849	417.2885182	556.5956416	229.1030303	177.1949602	55.72161423
標準偏差	5645.139299	227.3068487	466.0487562	505.909734	178.9769207	463.6710563	70.55363199
標準誤差	2524.583043	15.61149846	14.59971108	24.89419056	6.231176567	11.94013717	1.845209531
中央値 (メジアン)	18348	104	256	490	228	60	60
最頻値 (モード)	#N/A	104	256	530	256	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	170	917	910	0	1,964	1,964	1,964
合計	178,728	328,958	291,363	0	79,989,331	77,308,531	79,118,851
平均	1051.341176	358.7328244	320.1791209	#DIV/0!	40727.76527	39362.79582	40284.54735
標準偏差	792.9317714	397.5606536	165.4195114	#DIV/0!	3717.81445	3457.945145	3636.927176
標準誤差	60.81509072	13.12860942	5.483603406	65535	83.89130867	78.0274399	82.06611291
中央値 (メジアン)	1045.5	302	292	#NUM!	40082.5	38638.5	39734
最頻値 (モード)	442	280	310	#N/A	39718	35818	39718
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	1,964	1,964	1,964	1,964	1,964	1,964	
合計	76,438,051	79,694,097	77,013,297	78,823,617	76,142,817	76,059,371	
平均	38919.5779	40577.44246	39212.47301	40134.22454	38769.25509	38726.76731	
標準偏差	3310.390741	3491.424236	3192.391937	3416.106142	3044.225925	3009.038671	
標準誤差	74.69792139	78.782885	72.03531564	77.08335601	68.69199639	67.89800711	
中央値 (メジアン)	38156.5	40048	38603	39716	38126.5	38093	
最頻値 (モード)	35818	39718	35818	39718	35818	35818	

表 4-5-1 透析歴別集計結果表 一病院・診療所計—TTEST=P 値—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
10年未満 10～14年	P 値 5.67855E-12	0	0.857313563	0.031636139	0.284930756	#DIV/0!	0.618020962
10年未満 15年以上	P 値 6.49759E-32	0	0.349208525	0.024231735	0.235586058	#DIV/0!	0.236065979
10年未満 透析歴不明	P 値 0.579203226	#DIV/0!	0.201441581	1.02149E-05	0.737421206	#DIV/0!	0.261548994
10～14年 15年以上	P 値 0.001257599	0	0.381350607	0.941341926	#DIV/0!	#DIV/0!	0.166018439
10～14年 透析歴不明	P 値 0.008554799	#DIV/0!	0.220756968	0.000368207	#DIV/0!	#DIV/0!	0.224693499
15年以上 透析歴不明	P 値 1.39195E-05	#DIV/0!	0.128874948	0.000506164	#DIV/0!	#DIV/0!	0.367944933
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
10年未満 10～14年	P 値 0.134696328	0.123992139	0.09745349	0.540471895	0.056553854	0.101989126	1.0904E-11
10年未満 15年以上	P 値 0.02258421	0.214856782	8.22358E-08	0.14191461	0.017956682	0.423883689	1.29444E-20
10年未満 透析歴不明	P 値 #DIV/0!	0.368771142	0.363568841	0.490194581	0.009721931	2.7507E-07	0.000114712
10～14年 15年以上	P 値 0.470625415	0.413180244	0.008985433	0.188688535	0.817807294	0.044480672	0.197564722
10～14年 透析歴不明	P 値 #DIV/0!	#DIV/0!	0.162309474	0.652642144	0.064437658	1.1053E-05	0.120576208
15年以上 透析歴不明	P 値 #DIV/0!	0.633963712	0.022667004	0.391374388	0.078316014	1.73431E-07	0.268521001
	うち VD ₃	40：処置	I 型(230)	I 型(207)	II 型(166)	II 型(188)	III 型(171)
10年未満 10～14年	P 値 0.048827961	7.73822E-08	0.453394257	0.547440653	0.543156943	0.289398178	0.298289666
10年未満 15年以上	P 値 6.32206E-09	8.33925E-56	0.499864882	0.670564746	0.407319515	0.247972319	0.733153441
10年未満 透析歴不明	P 値 0.271388868	0.186544166	0.718297645	#DIV/0!	#DIV/0!	0.805404383	#DIV/0!
10～14年 15年以上	P 値 0.00227985	4.40053E-12	0.460832138	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.212844666
10～14年 透析歴不明	P 値 0.610776117	0.009788877	0.699938606	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
15年以上 透析歴不明	P 値 0.639663679	9.80463E-07	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	III 型(222)	IV 型(224)	IV 型(235)	V 型(262)	V 型(266)	特定積層型	ダイア計
10年未満 10～14年	P 値 0.66349519	0.910449663	0.553991239	#DIV/0!	0.323908809	0.734943035	0.881472247
10年未満 15年以上	P 値 0.597613462	0.608537148	0.768732839	#DIV/0!	0.429923714	0.43165873	5.27571E-06
10年未満 透析歴不明	P 値 0.623400562	0.041676445	0.344703509	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.547039371
10～14年 15年以上	P 値 0.983725289	0.631209603	0.466031266	#DIV/0!	0.737655893	#DIV/0!	0.000718603
10～14年 透析歴不明	P 値 0.644048068	0.12170889	0.395402996	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.34854799
15年以上 透析歴不明	P 値 0.634704867	0.024539193	0.333064093	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.139986225

表 4-5-2 透析歴別集計結果表 一病院・診療所計—TTEST=P 値—

		夜間	障害	50:手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うちPTA
10年未満 10~14年	P 値	0.044207892	0.167493314	0.601818256	0.808220751	0.660410033	0.136979453	0.2857605
10年未満 15年以上	P 値	0.039955538	0.089860664	0.043201302	0.571320758	0.30544395	2.80975E-08	0.875691166
10年未満 透析歴不明	P 値	0.662338657	0.552215043	0.534771205	0.431114467	#DIV/0!	0.498826859	#DIV/0!
10~14年 15年以上	P 値	0.829928585	0.732210518	0.082175683	0.907867666	0.01127297	0.006902402	0.272614128
10~14年 透析歴不明	P 値	0.322616094	0.762697997	0.408102523	0.113005404	#DIV/0!	0.881158676	#DIV/0!
15年以上 透析歴不明	P 値	0.372264452	0.700932289	0.97401569	0.502698807	#DIV/0!	0.361282653	#DIV/0!
		うちシャント	うちその他	60:検査	うち生体	うち検体	70:画像	うち胸部
10年未満 10~14年	P 値	#DIV/0!	0.604854443	3.27117E-06	0.107430894	1.78442E-15	0.425103236	0.679280134
10年未満 15年以上	P 値	0.90251273	0.734713385	4.27113E-09	0.111913139	7.06219E-34	0.752915408	0.405737496
10年未満 透析歴不明	P 値	#DIV/0!	0.054532208	0.813568174	0.212875579	0.124798563	0.023794558	0.00237351
10~14年 15年以上	P 値	#DIV/0!	0.769947735	0.57906804	0.900781913	0.013762592	0.671165506	0.798456186
10~14年 透析歴不明	P 値	#DIV/0!	0.012986554	0.281689207	0.394155047	0.320380003	0.012369654	0.021273415
15年以上 透析歴不明	P 値	#DIV/0!	0.004985002	0.213293584	0.364896926	0.072881199	0.023370249	0.075403613
		うち胸部ほか	80:その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
10年未満 10~14年	P 値	0.913218985	0.256899214	0.171605728	#DIV/0!	1.18934E-09	0.015724232	1.59521E-13
10年未満 15年以上	P 値	0.925864375	2.12957E-05	6.31235E-05	#DIV/0!	2.43471E-33	2.32625E-10	1.66782E-29
10年未満 透析歴不明	P 値	0.213285784	0.286418367	0.063814488	#DIV/0!	0.000187319	3.26041E-06	7.68862E-05
10~14年 15年以上	P 値	0.8699007	0.038817326	0.040877405	#DIV/0!	6.09504E-05	0.005973935	0.016337372
10~14年 透析歴不明	P 値	0.184269894	0.203606093	0.016563115	#DIV/0!	0.064741094	0.000147742	0.096677711
15年以上 透析歴不明	P 値	0.245111448	0.138939886	0.001147731	#DIV/0!	0.683010765	0.00937329	0.442987478
		除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
10年未満 10~14年	P 値	0.000164922	1.91414E-13	0.00040568	1.18748E-18	3.08727E-07	2.68314E-14	
10年未満 15年以上	P 値	6.02125E-08	1.6504E-39	9.24277E-13	2.96445E-35	5.71818E-10	2.12414E-22	
10年未満 透析歴不明	P 値	5.30146E-07	0.000113698	8.65798E-07	3.9335E-05	7.9645E-08	4.38833E-10	
10~14年 15年以上	P 値	0.322562628	0.000195383	0.016750846	0.043695889	0.632870713	0.266287259	
10~14年 透析歴不明	P 値	0.000213942	0.126437988	0.000332856	0.183543273	0.000472686	0.000457383	
15年以上 透析歴不明	P 値	0.001977869	0.825001913	0.009874426	0.549493587	0.001811245	0.004237841	

表 5-1 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計—40 歳未満—透析歴 10 年未満—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	283	283	283	283	60	3	61
合計	9,395	1,244.78	244,997	704,886	7,800	240	27,225
平均	33.19787986	4.398515901	865.7137809	2490.763251	130	80	446.3114754
標準偏差	5.001743926	2.718990854	92.51861642	219.7619694	0	0	28.80829798
標準誤差	0.297322815	0.16162723	5.49966089	13.06349311	0	0	3.68852459
中央値 (メジアン)	34	4.09	923	2435	130	80	450
最頻値 (モード)	39	1.11	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	24	6	120	17	167	168	185
合計	6,762	1,044	9,500	28,601	35,019	366,528	235,861
平均	281.75	174	79.16666667	1682.411765	209.6946108	2181.714286	1274.924324
標準偏差	41.50248814	0	164.6862733	904.8019161	113.5917819	1569.301306	1600.797992
標準誤差	8.471659916	0	15.03373114	219.4466983	8.789995988	121.0742243	117.6930091
中央値 (メジアン)	294	174	20	1680	191	1853.5	455
最頻値 (モード)	294	174	10	1810	84	1813	2223
	うち VD ₃	40：処置	うち I 型(230)	うち I 型(207)	うち II 型(166)	うち II 型(188)	うち III 型(171)
標本数	80	283	2	2	0	8	1
合計	198,958	9,799,979	5,980	5,382	0	19,552	2,223
平均	2486.975	34628.90106	2990	2691	#DIV/0!	2444	2223
標準偏差	1112.748712	1917.402866	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
標準誤差	124.4090881	113.9777697	0	0	65535	0	0
中央値 (メジアン)	2223	35594	2990	2691	#NUM!	2444	2223
最頻値 (モード)	2223	36205	2990	2691	#N/A	2444	#N/A
	うち III 型(222)	うち IV 型(224)	うち IV 型(235)	うち V 型(262)	うち V 型(266)	うち特定積層型	うちダイア計
標本数	34	7	202	1	28	1	283
合計	94,128	20,384	614,290	3,406	94,430	10,296	870,071
平均	2768.470588	2912	3041.039604	3406	3372.5	10296	3074.45583
標準偏差	480.3069874	0	116.3688099	#DIV/0!	452.4234742	#DIV/0!	468.3744796
標準誤差	82.37196877	0	8.187680892	0	85.5	0	27.84197286
中央値 (メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
最頻値 (モード)	2886	2912	3055	#N/A	3458	#N/A	3055
	夜間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うち PTA
標本数	168	30	132	3	2	80	0
合計	597,600	46,800	68,646	32,430	4,253	9,840	0
平均	3557.142857	1560	520.0454545	10810	2126.5	123	#DIV/0!
標準偏差	763.1145941	0	4006.819439	16243.0262	886.0047968	21.26683994	#DIV/0!
標準誤差	58.87556913	0	348.7488679	9377.915547	626.5	2.377704989	65535
中央値 (メジアン)	3900	1560	130	1840	2126.5	130	#NUM!
最頻値 (モード)	3900	1560	130	#N/A	#N/A	130	#N/A
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	1	50	124	55	98	224	222
合計	45,843	8,710	48,010	28,820	18,526	42,238	14,280
平均	45843	174.2	387.1774194	524	189.0408163	188.5625	64.32432432
標準偏差	#DIV/0!	521.3975333	381.0593289	438.5356525	129.0857557	540.9596154	88.60933244
標準誤差	0	73.7367463	34.22013793	59.13213532	13.03963046	36.14438466	5.947069001
中央値 (メジアン)	45843	104	256	350	200	69	60
最頻値 (モード)	#N/A	104	256	150	256	13	92
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	21	122	121	0	283	283	283
合計	26,243	36,143	32,963	0	11,576,292	10,978,692	11,529,492
平均	1249.666667	296.2540984	272.4214876	#DIV/0!	40905.62544	38793.96466	40740.25442
標準偏差	955.5344752	298.0686471	140.4017303	#DIV/0!	4072.868323	3799.629109	4072.38639
標準誤差	208.5147172	26.98586734	12.76379366	65535	242.1068915	225.8645062	242.0782435
中央値 (メジアン)	1251	272	272	#NUM!	40311	38169	40205
最頻値 (モード)	291	140	140	#N/A	41469	35625	41469
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	283	283	283	283	283	283	
合計	10,931,892	11,507,646	10,910,046	11,460,846	10,863,246	10,834,645	
平均	38628.59364	40663.06007	38551.39929	40497.68905	38386.02827	38284.96466	
標準偏差	3762.166417	2845.428824	2507.607645	2849.503231	2456.000778	2439.000664	
標準誤差	223.6375803	169.1431868	149.0618021	169.3853851	145.9940923	144.9835404	
中央値 (メジアン)	38038	40266	38127	40130	37996	37872	
最頻値 (モード)	35625	41339	35625	41339	35625	35625	

表 5-2 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計—40~64 歳—透析歴 10 年未満—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	2,631	2,631	2,631	2,631	591	50	630
合計	145,563	11,344.39	2,274,353	6,583,222	76,960	4,000	279,900
平均	55.32611174	4.3118168	864.4443177	2502.174838	130.2199662	80	444.2857143
標準偏差	6.213079425	2.651261764	90.17927981	228.8518421	5.347485454	0	35.42673246
標準誤差	0.12112854	0.051688292	1.758111192	4.461634487	0.219966159	0	1.411434806
中央値 (メジアン)	57	4.08	923	2435	130	80	450
最頻値 (モード)	59	1.09	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	186	68	1,205	420	1,552	1,565	1,491
合計	53,361	11,571	92,975	733,503	338,918	3,367,598	1,625,737
平均	286.8870968	170.1617647	77.15767635	1746.435714	218.375	2151.819808	1090.366868
標準偏差	31.62881247	17.99884764	121.3085836	841.7566064	112.262908	1439.984686	1710.854714
標準誤差	2.31913705	2.182680881	3.494604313	41.07351668	2.849642828	36.3999429	44.30720034
中央値 (メジアン)	294	174	20	1657.5	198	1930	223
最頻値 (モード)	294	174	10	820	168	2	24
	うち VD _s	40：処置	うち I 型(230)	うち I 型(207)	うち II 型(166)	うち II 型(188)	うち III 型(171)
標本数	522	2,631	31	9	32	80	19
合計	1,068,144	89,280,730	90,390	22,770	69,056	194,580	40,185
平均	2046.252874	33934.14291	2915.806452	2530	2158	2432.25	2115
標準偏差	879.9503155	1919.695311	293.2663658	483	0	128.1159977	365.9139243
標準誤差	38.51437901	37.42586787	52.6721942	161	0	14.32380399	83.94641148
中央値 (メジアン)	2052	33361	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値 (モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	うち III 型(222)	うち IV 型(224)	うち IV 型(235)	うち V 型(262)	うち V 型(266)	うち特定積層型	うちダイア計
標本数	310	226	1,724	9	205	18	2,631
合計	872,904	645,120	5,234,390	30,654	685,748	185,328	8,071,125
平均	2815.819355	2854.513274	3036.189095	3406	3345.112195	10296	3067.702395
標準偏差	382.0224408	330.9393262	191.7335649	0	532.0254418	0	634.6342457
標準誤差	21.69741662	22.01375652	4.617740426	0	37.15826866	0	12.37266002
中央値 (メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
最頻値 (モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うち PTA
標本数	960	522	1,245	27	6	804	4
合計	3,329,700	796,080	295,214	67,172	10,586	99,982	61,764
平均	3468.4375	1525.057471	237.1196787	2487.851852	1764.333333	124.3557214	15441
標準偏差	966.1495211	205.0843573	1335.22147	3397.350616	736.5412865	23.02736105	10319.26528
標準誤差	31.18234171	8.976298465	37.84152512	653.8204309	300.6917211	0.812112408	5159.632642
中央値 (メジアン)	3900	1560	130	1640	1500	130	13768
最頻値 (モード)	3900	1560	130	3130	1500	130	#N/A
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	4	447	1,432	493	1,216	2,078	2,036
合計	46,215	75,675	421,733	234,457	183,712	332,043	113,967
平均	11553.75	169.295302	294.5062849	475.5720081	151.0789474	159.7897016	55.9759332
標準偏差	8707.131306	602.730798	379.4327315	471.010725	145.7762489	419.3800013	41.77820118
標準誤差	4353.565653	28.5081885	10.02682149	21.21325617	4.180420641	9.199938944	0.925893105
中央値 (メジアン)	11900.5	104	155	350	55	60	60
最頻値 (モード)	#N/A	104	55	530	55	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	196	1,163	1,161	0	2,631	2,631	2,631
合計	211,278	340,625	336,831	0	105,173,955	101,844,255	104,377,875
平均	1077.94898	292.8847807	290.121447	#DIV/0!	39974.89738	38709.33295	39672.32041
標準偏差	778.4534684	166.236556	159.80282	#DIV/0!	3100.121512	2738.077255	2982.079933
標準誤差	55.60381917	4.874574088	4.689951256	65535	60.43914232	53.38082402	58.13783517
中央値 (メジアン)	1180.5	272	272	#NUM!	39733	38145	39561
最頻値 (モード)	129	170	170	#N/A	36554	35669	36554
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	2,631	2,631	2,631	2,631	2,631	2,631	
合計	101,048,175	104,878,741	101,549,041	104,082,661	100,752,961	100,019,458	
平均	38406.75599	39862.69137	38597.12695	39560.11441	38294.54998	38015.75751	
標準偏差	2543.438721	3134.237348	2764.610474	3024.598436	2580.269203	2449.83229	
標準誤差	49.58620307	61.10425555	53.89810859	58.96676456	50.30424033	47.76127704	
中央値 (メジアン)	37806	39666	38078	39463	37738	37486	
最頻値 (モード)	35669	39835	35669	39688	35669	35669	

表 5-3 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計—65～69 歳—透析歴 10 年未満—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	833	833	832	833	178	13	234
合計	55,742	3,610.31	723,019	2,105,956	23,140	1,040	103,500
平均	66.91716687	4.334105642	869.0132212	2528.158463	130	80	442.3076923
標準偏差	1.424917556	2.697406375	86.27939151	254.6393827	0	0	40.9728187
標準誤差	0.049370467	0.093459592	2.991199712	8.822731693	0	0	2.678476949
中央値 (メジアン)	67	4.07	923	2435	130	80	450
最頻値 (モード)	66	4.07	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	46	24	406	128	496	496	487
合計	13,524	4,002	40,685	217,613	113,443	1,075,280	541,958
平均	294	166.75	100.2093596	1700.101563	228.7157258	2167.903226	1112.850103
標準偏差	0	24.56269706	145.2138245	870.8408087	116.8638413	1353.789269	1895.291753
標準誤差	0	5.013839542	7.206841103	76.97218014	5.247341379	60.78693263	85.88386728
中央値 (メジアン)	294	174	30	1581	205.5	1936	234
最頻値 (モード)	294	174	10	820	168	2793	24
	うち VD ₃	40：処置	うち I 型(230)	うち I 型(207)	うち II 型(166)	うち II 型(188)	うち III 型(171)
標本数	142	833	12	6	8	33	12
合計	258,674	27,670,142	31,510	15,525	15,770	80,464	22,230
平均	1821.647887	33217.45738	2625.833333	2587.5	1971.25	2438.30303	1852.5
標準偏差	723.8662468	1561.163096	885.1446552	253.5221884	528.2087655	32.72659932	735.7999358
標準誤差	60.74550602	54.09109533	255.5192525	103.5	186.75	5.696969697	212.4071455
中央値 (メジアン)	1729	32310	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値 (モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	うち III 型(222)	うち IV 型(224)	うち IV 型(235)	うち V 型(262)	うち V 型(266)	うち特定積層型	うちダイア計
標本数	112	120	490	1	48	5	833
合計	307,248	347,200	1,485,200	3,406	165,186	51,480	2,525,219
平均	2743.285714	2893.333333	3031.020408	3406	3441.375	10296	3031.47539
標準偏差	562.1397894	138.0014209	213.8386611	#DIV/0!	115.1813787	0	609.1019988
標準誤差	53.11721732	12.59774853	9.660246014	0	16.625	0	21.10413343
中央値 (メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
最頻値 (モード)	2886	2912	3055	#N/A	3458	10296	3055
	夜間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うち PTA
標本数	124	197	423	5	1	276	0
合計	416,100	305,280	118,687	14,160	1,500	34,590	0
平均	3355.645161	1549.64467	280.5839243	2832	1500	125.326087	#DIV/0!
標準偏差	1100.354889	110.9438893	1601.859913	666.3482573	#DIV/0!	19.78453502	#DIV/0!
標準誤差	98.81478607	7.904424825	77.88509421	298	0	1.190889063	65535
中央値 (メジアン)	3900	1560	130	3130	1500	130	#NUM!
最頻値 (モード)	3900	1560	130	3130	#N/A	130	#N/A
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	4	149	481	194	407	678	661
合計	64,252	18,245	167,673	104,204	63,096	116,645	36,907
平均	16063	122.4496644	348.5925156	537.1340206	155.027027	172.0427729	55.83509834
標準偏差	3716.926777	286.2046007	474.5900295	582.6340959	152.5631316	422.1298598	38.01413265
標準誤差	1858.463389	23.44679447	21.6394427	41.83069026	7.562273672	16.2117996	1.478578396
中央値 (メジアン)	15934.5	104	195	350	55	78	60
最頻値 (モード)	#N/A	104	55	530	55	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	77	360	356	0	833	833	833
合計	71,065	117,888	103,858	0	32,859,136	32,443,036	32,553,856
平均	922.9220779	327.4666667	291.7359551	#DIV/0!	39446.7419	38947.22209	39080.2593
標準偏差	592.9407702	368.6702734	254.95433	#DIV/0!	3219.081293	3028.42051	3093.167798
標準誤差	67.57187198	19.43062949	13.51255246	65535	111.5345562	104.9285516	107.1719122
中央値 (メジアン)	950	266	249	#NUM!	38818	38396	38451
最頻値 (モード)	129	310	310	#N/A	36692	38818	36692
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	833	833	833	833	833	833	
合計	32,137,756	32,740,449	32,324,349	32,435,169	32,019,069	31,801,456	
平均	38580.7395	39304.2605	38804.7407	38937.77791	38438.2581	38177.01801	
標準偏差	2867.309322	2931.279754	2727.781931	2803.436369	2559.800393	2474.231268	
標準誤差	99.34637978	101.5628239	94.51204222	97.13331313	88.6918269	85.72703243	
中央値 (メジアン)	37974	38729	38360	38396	37922	37735	
最頻値 (モード)	36692	36445	36551	36445	36551	36551	

表 5-4 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計—70 歳以上—透析歴 10 年未満—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	1,951	1,951	1,950	1,951	418	45	540
合計	150,282	7,915.20	1,689,009	4,955,974	54,730	3,600	239,625
平均	77.02819067	4.056996412	866.1584615	2540.22245	130.9330144	80	443.75
標準偏差	5.372171862	2.60430858	92.64077949	252.3604336	10.98681621	0	37.00978284
標準誤差	0.121624555	0.05896086	2.097900541	5.713373686	0.537382747	0	1.592647473
中央値 (メジアン)	76	4.02	923	2455	130	80	450
最頻値 (モード)	72	1.09	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	154	56	896	271	1,087	1,094	1,170
合計	44,541	9,483	106,940	543,809	242,480	2,139,054	1,376,489
平均	289.2272727	169.3392857	119.3526786	2006.675277	223.0726771	1955.259598	1176.486325
標準偏差	26.13902567	19.76707711	160.4342033	1858.439687	110.7037394	1184.921824	2070.28794
標準誤差	2.106342714	2.641486789	5.359730551	112.8921713	3.357743514	35.82457422	60.52542135
中央値 (メジアン)	294	174	30	1580	210	1758.5	241.5
最頻値 (モード)	294	174	10	300	168	61	24
	うち VD _s	40：処置	うち I 型(230)	うち I 型(207)	うち II 型(166)	うち II 型(188)	うち III 型(171)
標本数	263	1,951	107	35	56	74	64
合計	480,976	64,140,088	307,280	88,389	115,702	172,020	134,235
平均	1828.806084	32875.49359	2871.775701	2525.4	2066.107143	2324.594595	2097.421875
標準偏差	890.0447392	1344.289814	486.7408227	549.5083471	336.3771519	448.3304468	412.4331521
標準誤差	54.88250976	30.43436698	47.0550114	92.88386351	44.95028768	52.11735582	51.55414401
中央値 (メジアン)	1729	32305	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値 (モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	うち III 型(222)	うち IV 型(224)	うち IV 型(235)	うち V 型(262)	うち V 型(266)	うち特定積層型	うちダイア計
標本数	277	393	908	9	35	27	1,951
合計	787,212	1,132,992	2,749,500	30,654	116,508	277,200	5,911,692
平均	2841.920578	2882.931298	3028.0837	3406	3328.8	10266.66667	3030.083034
標準偏差	308.2383456	239.0331671	232.2751088	0	556.365559	152.4204711	890.0468419
標準誤差	18.52024726	12.05762827	7.708320221	0	94.04294388	29.33333333	20.15042585
中央値 (メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	2990
最頻値 (モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うち PTA
標本数	77	519	971	32	8	586	8
合計	237,600	803,640	453,739	101,132	28,737	73,382	133,856
平均	3085.714286	1548.439306	467.2904222	3160.375	3592.125	125.225256	16732
標準偏差	1338.863843	122.6559038	2568.382156	4338.810077	5002.001355	18.6694259	7003.656208
標準誤差	152.5776954	5.383996612	82.42330579	767.000507	1768.474539	0.771226876	2476.166399
中央値 (メジアン)	3900	1560	130	3130	2638	130	12925
最頻値 (モード)	3900	1560	130	3130	480	130	#N/A
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	10	375	1,022	435	808	1,529	1,502
合計	171,647	45,767	356,481	232,748	118,994	289,060	87,047
平均	17164.7	122.0453333	348.8072407	535.0528736	147.269802	189.0516678	57.95406125
標準偏差	8981.509859	162.3647955	455.2984373	538.3299696	153.3960671	480.2992842	44.61102768
標準誤差	2840.202798	8.384481986	14.24199116	25.81094645	5.396454807	12.28310592	1.151084648
中央値 (メジアン)	13074	104	180	350	55	78	60
最頻値 (モード)	#N/A	104	55	150	55	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	183	911	907	0	1,951	1,951	1,951
合計	195,944	289,735	264,830	0	76,234,743	75,997,143	75,431,103
平均	1070.73224	318.0406147	291.9845645	#DIV/0!	39074.70169	38952.91799	38662.78985
標準偏差	767.8694081	350.9555582	236.6993226	#DIV/0!	3538.385606	3484.361355	3370.590026
標準誤差	56.76253998	11.62767639	7.859472006	65535	80.10811729	78.88502248	76.30926958
中央値 (メジアン)	1170	274	272	#NUM!	38235	38126	37759
最頻値 (モード)	129	170	170	#N/A	37242	37393	35956
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	1,951	1,951	1,951	1,951	1,951	1,951	
合計	75,193,503	75,781,004	75,543,404	74,977,364	74,739,764	74,195,955	
平均	38541.00615	38842.13429	38720.35059	38430.22245	38308.43875	38029.70528	
標準偏差	3310.054188	3005.206898	2959.956218	2801.028956	2747.874775	2512.44115	
標準誤差	74.93875417	68.03709191	67.01262844	63.41455713	62.21116048	56.88100526	
中央値 (メジアン)	37662	38134	38036	37690	37558	37328	
最頻値 (モード)	35956	38047	38047	38047	38047	38047	

表 5-5 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計—75 歳以上—透析歴 10 年未満—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	1,175	1,175	1,174	1,175	249	27	314
合計	94,435	4,672.92	1,013,962	2,981,634	32,500	2,160	139,500
平均	80.37021277	3.976953191	863.681431	2537.560851	130.5220884	80	444.2675159
標準偏差	4.312135469	2.539851384	98.98120782	248.6780542	8.238415257	0	35.51004577
標準誤差	0.125797921	0.07409508	2.888808149	7.254684451	0.522088353	0	2.003947816
中央値 (メジアン)	80	4.02	923	2455	130	80	450
最頻値 (モード)	75	2.11	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	99	34	547	137	646	651	728
合計	28,812	5,742	64,545	296,039	144,859	1,243,331	887,449
平均	291.030303	168.8823529	117.9981718	2160.868613	224.2399381	1909.878648	1219.023352
標準偏差	20.78679651	20.7784339	155.4821345	2224.930481	112.5049099	1186.527912	2116.332401
標準誤差	2.089151655	3.563472016	6.647936015	190.0886394	4.426446475	46.50369533	78.4364973
中央値 (メジアン)	294	174	30	1400	210	1675	273
最頻値 (モード)	294	174	10	300	168	61	24
	うち VD _s	40：処置	うち I 型(230)	うち I 型(207)	うち II 型(166)	うち II 型(188)	うち III 型(171)
標本数	155	1,175	83	21	40	39	51
合計	283,030	38,565,105	240,810	51,336	81,672	90,240	108,072
平均	1826	32821.36596	2901.325301	2444.571429	2041.8	2313.846154	2119.058824
標準偏差	920.6395504	1318.898855	435.2565016	691.5753445	389.2137505	458.7918653	393.0448021
標準誤差	73.94754819	38.47623405	47.7756078	150.9141126	61.54009741	73.46549438	55.03728085
中央値 (メジアン)	1729	32305	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値 (モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	うち III 型(222)	うち IV 型(224)	うち IV 型(235)	うち V 型(262)	うち V 型(266)	うち特定積層型	うちダイア計
標本数	169	270	486	7	13	19	1,175
合計	483,294	779,072	1,462,875	23,842	43,624	194,832	3,559,669
平均	2859.727811	2885.451852	3010.030864	3406	3355.692308	10254.31579	3029.505532
標準偏差	177.6934137	223.6697552	311.3248197	0	255.5645335	181.6972612	959.763847
標準誤差	13.66872413	13.61210782	14.1219806	0	70.88084843	41.68421053	27.99918908
中央値 (メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	2990
最頻値 (モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うち PTA
標本数	29	313	596	23	6	357	5
合計	72,900	486,480	302,910	76,252	22,685	44,542	89,293
平均	2513.793103	1554.249201	508.238255	3315.304348	3780.833333	124.767507	17858.6
標準偏差	1645.930943	79.30888499	2882.268444	5121.478466	5902.005334	18.43083816	8685.697255
標準誤差	305.6417031	4.482803221	118.0623156	1067.902081	2409.483588	0.975463397	3884.361899
中央値 (メジアン)	3600	1560	130	3130	1661.5	130	12802
最頻値 (モード)	3900	1560	130	3130	480	130	#N/A
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	6	233	594	266	455	902	886
合計	116,579	29,616	214,834	144,530	68,131	171,800	52,113
平均	19429.83333	127.1072961	361.6734007	543.3458647	149.7384615	190.4656319	58.81828442
標準偏差	11244.71457	168.3050432	474.4112329	555.6747256	152.2789427	456.7465247	48.12908424
標準誤差	4590.6355	11.02602999	19.46532867	34.07060342	7.138946944	15.20799576	1.616928208
中央値 (メジアン)	15448	104	195	350	55	78	60
最頻値 (モード)	#N/A	104	55	530	55	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	110	557	556	0	1,175	1,175	1,175
合計	117,766	173,082	158,147	0	45,850,886	45,777,986	45,364,406
平均	1070.6	310.7396768	284.4370504	#DIV/0!	39022.03064	38959.98809	38608.00511
標準偏差	758.2186657	289.4330021	159.6608839	#DIV/0!	3684.2146	3637.647936	3529.690178
標準誤差	72.29331322	12.26366989	6.771129709	65535	107.4795863	106.1210971	102.9716455
中央値 (メジアン)	1196.5	274	272	#NUM!	38105	38031	37624
最頻値 (モード)	129	170	170	#N/A	38475	36817	36650
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	
合計	45,291,506	45,547,976	45,475,076	45,061,496	44,988,596	44,692,557	
平均	38545.96255	38764.23489	38702.19234	38350.20936	38288.16681	38036.21872	
標準偏差	3482.946897	3043.123461	3025.211358	2842.055503	2825.198028	2560.93036	
標準誤差	101.6080039	88.77703556	88.25448581	82.91128036	82.41949727	74.71001705	
中央値 (メジアン)	37571	38031	37970	37543	37457	37287	
最頻値 (モード)	36817	36452	36452	36452	36452	36452	

表 5-7-1 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計—透析歴 10 年未満—TTEST=P 値—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)	
40 歳未満 40～64 歳	P 値	0	0.60211574	0.822422817	0.423718364	0.750279295	#DIV/0!	0.66524637
40 歳未満 65～69 歳	P 値	0	0.729147709	0.58555039	0.027527364	#DIV/0!	#DIV/0!	0.473382715
40 歳未満 70 歳以上	P 値	0	0.040483823	0.939846127	0.001775209	0.511365903	#DIV/0!	0.601299684
40 歳未満 75 歳以上	P 値	0	0.013553407	0.753623119	0.003736973	0.62428953	#DIV/0!	0.67241406
40～64 歳 65～69 歳	P 値	0	0.833232296	0.198201068	0.005506926	0.583471954	#DIV/0!	0.485262454
40～64 歳 70 歳以上	P 値	0	0.001198562	0.529539507	1.05711E-07	0.172332525	#DIV/0!	0.800632969
40～64 歳 75 歳以上	P 値	0	0.000269665	0.815182556	1.84122E-05	0.528505606	#DIV/0!	0.994073045
65～69 歳 70 歳以上	P 値	0	0.011034385	0.447697845	0.249465174	0.2579048	#DIV/0!	0.630081852
65～69 歳 75 歳以上	P 値	0	0.00251476	0.210476784	0.408628468	0.398469101	#DIV/0!	0.549969617
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射	
40 歳未満 40～64 歳	P 値	0.471945859	0.605300483	0.867554393	0.759319	0.343083607	0.79997005	0.163661653
40 歳未満 65～69 歳	P 値	0.047804175	0.481437965	0.177152874	0.937663882	0.067398238	0.912735822	0.302637439
40 歳未満 70 歳以上	P 値	0.235438708	0.568587599	0.010350579	0.476279844	0.147615555	0.028053294	0.536618627
40 歳未満 75 歳以上	P 値	0.11968254	0.554136058	0.01450328	0.38261483	0.137576157	0.01389052	0.737217402
40～64 歳 65～69 歳	P 値	0.1291907	0.471743198	0.001693837	0.588869902	0.077207418	0.826009021	0.806455264
40～64 歳 70 歳以上	P 値	0.463577788	0.80901135	8.74868E-12	0.012637488	0.287396045	0.000203708	0.240291988
40～64 歳 75 歳以上	P 値	0.241054273	0.748694212	3.04744E-09	0.001523686	0.264944432	0.000157542	0.124901638
65～69 歳 70 歳以上	P 値	0.217849083	0.619601077	0.04025969	0.076554854	0.355456883	0.001564672	0.559268337
65～69 歳 75 歳以上	P 値	0.335103866	0.722508751	0.072801999	0.029314857	0.512446644	0.000621342	0.371959237
	うち VD _s	40：処置	I 型(230)	I 型(207)	II 型(166)	II 型(188)	III 型(171)	
40 歳未満 40～64 歳	P 値	6.66856E-05	7.98663E-09	0.726846386	0.661780331	#DIV/0!	0.796978001	#DIV/0!
40 歳未満 65～69 歳	P 値	1.83365E-07	5.10809E-33	0.584046024	0.603645057	#DIV/0!	0.628526273	#DIV/0!
40 歳未満 70 歳以上	P 値	9.81328E-08	9.11695E-77	0.733071656	0.676646926	#DIV/0!	0.455969703	#DIV/0!
40 歳未満 75 歳以上	P 値	2.25798E-06	1.41233E-70	0.775256177	0.626844273	#DIV/0!	0.430558067	#DIV/0!
40～64 歳 65～69 歳	P 値	0.005343783	2.24436E-22	0.110347418	0.79444939	0.043940214	0.789821015	0.195363887
40～64 歳 70 歳以上	P 値	0.00118104	2.20025E-92	0.633149273	0.981838786	0.126860578	0.041176238	0.867679818
40～64 歳 75 歳以上	P 値	0.006955431	5.38983E-70	0.864481233	0.739690137	0.096161583	0.033536568	0.968911339
65～69 歳 70 歳以上	P 値	0.934484599	5.5301E-09	0.135124647	0.788787403	0.492085567	0.149635958	0.10518483
	III 型(222)	IV 型(224)	IV 型(235)	V 型(262)	V 型(266)	特定積層型	ダイア計	
40 歳未満 40～64 歳	P 値	0.504834134	0.646933558	0.724885204	#DIV/0!	0.79529246	#DIV/0!	0.861892278
40 歳未満 65～69 歳	P 値	0.813589985	0.722040838	0.529895316	#DIV/0!	0.318322788	#DIV/0!	0.278986283
40 歳未満 70 歳以上	P 値	0.222841059	0.74811219	0.440682455	#DIV/0!	0.738024581	#DIV/0!	0.411040202
40 歳未満 75 歳以上	P 値	0.056888589	0.75415455	0.169349281	#DIV/0!	0.901557886	#DIV/0!	0.44375879
40～64 歳 65～69 歳	P 値	0.132853061	0.219969263	0.608051834	#DIV/0!	0.214310206	#DIV/0!	0.147252535
40～64 歳 70 歳以上	P 値	0.366290341	0.218102862	0.338802321	#DIV/0!	0.86787863	0.420498297	0.095012659
40～64 歳 75 歳以上	P 値	0.158399104	0.217173357	0.022802307	#DIV/0!	0.943410908	0.337427525	0.146816777
65～69 歳 70 歳以上	P 値	0.027462315	0.650044136	0.816707126	#DIV/0!	0.17596452	0.674155237	0.967127343
65～69 歳 75 歳以上	P 値							

表 5-7-2 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計一透析歴 10 年未満一TTEST=P 値一

		夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うち PTA
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.258796394	0.351529704	0.081458844	0.017920925	0.58241072	0.613308411	#DIV/0!
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.065733497	0.610358788	0.317428296	0.289008911	#DIV/0!	0.363300916	#DIV/0!
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.00056396	0.606201675	0.837884109	0.036238213	0.702929068	0.326080852	#DIV/0!
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	1.14246E-07	0.691884122	0.968583104	0.084513056	0.72040493	0.45189079	#DIV/0!
40～64 歳	P 値	0.22914473	0.110840356	0.583292372	0.825171772	#DIV/0!	0.531921773	#DIV/0!
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.001246639	0.025908371	0.006478759	0.515981157	0.396603621	0.452421236	0.800927529
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	3.93792E-07	0.016082244	0.005866692	0.498413251	0.425661453	0.765674777	0.713395217
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.121737733	0.90413788	0.167071892	0.868350567	#DIV/0!	0.942168247	#DIV/0!
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.001037719	0.585599511	0.141579056	0.837167703	#DIV/0!	0.714367055	#DIV/0!
		うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	#DIV/0!	0.955951911	0.009189415	0.466897815	0.0125413	0.34443439	0.014769313
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	#DIV/0!	0.379359773	0.402256444	0.876871228	0.042072317	0.637286464	0.047913837
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.139665698	0.367860681	0.883812066	0.009848899	0.988832805	0.090875605
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.257086758	0.574365905	0.808223273	0.01778433	0.957175372	0.210110335
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.377577254	0.360777497	0.011443048	0.150759522	0.64028121	0.509611107	0.938676056
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.3082685	0.140932741	0.001330588	0.072947337	0.572970872	0.051696075	0.17634356
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.273003478	0.295461569	0.000792614	0.076525541	0.868738265	0.074381244	0.106989046
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.819795038	0.983775266	0.993288182	0.96520311	0.40473781	0.42622882	0.287873887
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.585363672	0.841441829	0.653205981	0.907704326	0.611172676	0.412568758	0.188239391
		うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.348869453	0.846438129	0.241395247	#DIV/0!	3.6603E-06	0.636021433	4.15506E-08
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.055441033	0.398011414	0.428124102	#DIV/0!	1.16979E-09	0.492062212	1.42948E-12
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.325795294	0.512803951	0.37458862	#DIV/0!	2.45315E-15	0.47854825	1.08698E-20
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.344202872	0.61865125	0.444064334	#DIV/0!	7.08951E-14	0.494550769	2.61927E-18
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.116099282	0.013022697	0.886397603	#DIV/0!	2.23794E-05	0.033326679	7.81575E-07
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.927715287	0.031255529	0.831237638	#DIV/0!	8.59051E-20	0.008106718	1.7707E-26
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.936304484	0.105614665	0.490343464	#DIV/0!	2.14737E-16	0.018994	1.46455E-21
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.132339802	0.670723469	0.986896014	#DIV/0!	0.009142521	0.967278778	0.002192175
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.154443918	0.443785069	0.595090323	#DIV/0!	0.007422688	0.933908273	0.001914971
		除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.18683355	3.94263E-05	0.789723199	6.65261E-07	0.5691907	0.078972557	
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.823539036	1.85673E-11	0.168756291	2.0553E-15	0.76455581	0.524663455	
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.682923186	2.28893E-21	0.360929976	3.78644E-30	0.653005114	0.109060817	
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.724411981	5.76448E-21	0.437481007	6.37384E-29	0.592077696	0.139021369	
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.095566732	5.53222E-06	0.058179993	1.48405E-07	0.160534266	0.098676862	
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.120669927	3.17971E-28	0.147843454	1.99013E-37	0.860909222	0.850498269	
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.166413835	1.36461E-23	0.293074759	1.16686E-30	0.945442402	0.814454989	
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.763057299	0.000185758	0.480920421	1.24793E-05	0.244235225	0.154824381	
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.812802589	7.2E-05	0.435941958	4.70272E-06	0.222967425	0.218484798	

表 5-13-1 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計一透析歴 10~14 年—TTEST=P 値—

		年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
40 歳未満								
40~64 歳	P 値	5.8601E-117	0.485690284	0.803626183	0.585902472	#DIV/0!	#DIV/0!	0.075866632
40 歳未満								
65~69 歳	P 値	5.0423E-242	0.685648615	0.92916915	0.898192527	#DIV/0!	#DIV/0!	0.258240041
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	5.0005E-251	0.279294924	0.597137655	0.050910189	#DIV/0!	#DIV/0!	0.086174629
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	3.4641E-214	0.120359057	0.332724641	0.101968039	#DIV/0!	#DIV/0!	0.166574931
40~64 歳	P 値	2.2115E-121	0.710215584	0.812968712	0.527126727	#DIV/0!	#DIV/0!	0.742491034
40~64 歳								
70 歳以上	P 値	0	0.407698356	0.134810639	0.003466907	#DIV/0!	#DIV/0!	0.894065735
40~64 歳								
75 歳以上	P 値	3.7642E-286	0.107962059	0.052593265	0.04515567	#DIV/0!	#DIV/0!	0.948198696
65~69 歳								
70 歳以上	P 値	6.64E-106	0.345949326	0.363977448	0.007467744	#DIV/0!	#DIV/0!	0.69125321
65~69 歳								
75 歳以上	P 値	3.3086E-167	0.113353261	0.152213316	0.036776636	#DIV/0!	#DIV/0!	0.830602016
		特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
40 歳未満								
40~64 歳	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.806017063	#DIV/0!	0.18771744	0.124007844	0.930000293
40 歳未満								
65~69 歳	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.96936381	#DIV/0!	0.199435418	0.092839948	0.707976014
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.630146136	#DIV/0!	0.452310398	#DIV/0!	0.099815036	0.040520425	0.256868617
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.531853532	#DIV/0!	0.161374553	0.008489673	0.702048566
40~64 歳								
65~69 歳	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.622145371	0.669119909	0.890830709	0.756592415	0.575778128
40~64 歳								
70 歳以上	P 値	0.158509854	#DIV/0!	0.030502161	0.792356034	0.681783599	0.475560268	0.018653319
40~64 歳								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.112163201	0.763749278	0.929355169	0.171584563	0.575186444
65~69 歳								
70 歳以上	P 値	0.564036888	#DIV/0!	0.225936269	0.942655998	0.844695478	0.783742945	0.306231907
65~69 歳								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.33797366	0.984221223	0.970438561	0.337625794	0.992159765
		うち VD _s	40：処置	I 型(230)	I 型(207)	II 型(166)	II 型(188)	III 型(171)
40 歳未満								
40~64 歳	P 値	0.121722353	0.001113506	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40 歳未満								
65~69 歳	P 値	0.409836474	3.11899E-11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.029670078	1.21488E-22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.021752928	5.05581E-25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40~64 歳								
65~69 歳	P 値	0.679837389	6.12273E-07	0.541469739	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40~64 歳								
70 歳以上	P 値	0.199580584	3.33896E-19	0.292351992	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40~64 歳								
75 歳以上	P 値	0.107168187	5.1765E-17	0.292351992	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
65~69 歳								
70 歳以上	P 値	0.219351975	0.015613022	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
65~69 歳								
75 歳以上	P 値	0.131646856	0.000305871	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		III 型(222)	IV 型(224)	IV 型(235)	V 型(262)	V 型(266)	特定積層型	ダイア計
40 歳未満								
40~64 歳	P 値	0.595631169	#DIV/0!	0.182501681	#DIV/0!	0.033814667	#DIV/0!	0.950847896
40 歳未満								
65~69 歳	P 値	#DIV/0!	0.685077414	0.062390271	#DIV/0!	0.06762694	#DIV/0!	0.696252153
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.746373192	0.76738989	0.025560515	#DIV/0!	0.130510924	#DIV/0!	0.93521957
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.656017085	0.721623556	0.134392623	#DIV/0!	0.293390474	#DIV/0!	0.847103046
40~64 歳								
65~69 歳	P 値	0.278649557	0.173400609	0.312680987	#DIV/0!	0.379967186	#DIV/0!	0.684300922
40~64 歳								
70 歳以上	P 値	0.425446376	0.330131766	0.221925705	#DIV/0!	0.464450165	#DIV/0!	0.778113581
40~64 歳								
75 歳以上	P 値	0.88323828	0.239247637	0.481457556	#DIV/0!	0.605472086	#DIV/0!	0.636651679
65~69 歳								
70 歳以上	P 値	0.507462888	0.438152465	0.994741748	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.937205466
65~69 歳								
75 歳以上	P 値	0.358081879	0.649242343	0.633751506	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.90201074

表 5-13-2 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計一透析歴 10~14 年—TTEST=P 値—

		夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うちPTA
40歳未満								
40~64歳	P値	0.691228023	0.755755235	0.562772655	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00876088	#DIV/0!
40歳未満								
65~69歳	P値	0.799545144	#DIV/0!	0.256954169	#DIV/0!	#DIV/0!	0.055132	#DIV/0!
40歳未満								
70歳以上	P値	0.994226727	#DIV/0!	0.58134818	#DIV/0!	#DIV/0!	0.172156748	#DIV/0!
40歳未満								
75歳以上	P値	0.91051745	#DIV/0!	0.537024541	#DIV/0!	#DIV/0!	0.218079415	#DIV/0!
40~64歳	P値	0.954744837	0.559953874	0.356940058	#DIV/0!	#DIV/0!	0.998929561	#DIV/0!
40~64歳								
70歳以上	P値	0.753850272	0.371364872	0.736069393	0.383892339	#DIV/0!	0.217668088	#DIV/0!
40~64歳								
75歳以上	P値	0.974388726	0.522967974	0.418502231	0.290786307	#DIV/0!	0.27424075	#DIV/0!
65~69歳								
70歳以上	P値	0.828045118	#DIV/0!	0.384774033	#DIV/0!	#DIV/0!	0.408465887	#DIV/0!
65~69歳								
75歳以上	P値	0.991882031	#DIV/0!	0.386605213	#DIV/0!	#DIV/0!	0.438191213	#DIV/0!
		うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
40歳未満								
40~64歳	P値	#DIV/0!	0.758068343	0.056740905	0.106889476	0.484803625	0.138103176	0.564170085
40歳未満								
65~69歳	P値	#DIV/0!	0.60694409	0.670568239	0.864730209	0.224044942	0.376849285	0.976082843
40歳未満								
70歳以上	P値	#DIV/0!	0.748730056	0.689735694	0.74881677	0.178679103	0.068876998	0.270398028
40歳未満								
75歳以上	P値	#DIV/0!	0.696166618	0.995251337	0.837581885	0.186344135	0.171500006	0.650954291
40~64歳								
65~69歳	P値	#DIV/0!	0.558025117	0.058662898	0.0455863	0.46320253	0.535807947	0.385737007
40~64歳								
70歳以上	P値	#DIV/0!	0.544008164	0.017262377	0.029061038	0.199675484	0.532426325	0.680550356
40~64歳								
75歳以上	P値	#DIV/0!	0.352767762	0.006150409	0.040622887	0.213434213	0.891642844	0.697082163
65~69歳								
70歳以上	P値	#DIV/0!	0.500140862	0.922393376	0.860278675	0.746161499	0.283405883	0.277171171
65~69歳								
75歳以上	P値	#DIV/0!	0.398071342	0.557770925	0.969714628	0.627063349	0.541197576	0.683147577
		うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
40歳未満								
40~64歳	P値	0.436045879	0.44416116	0.47961247	#DIV/0!	0.011794792	0.655079346	0.010846869
40歳未満								
65~69歳	P値	0.964744924	0.167691015	0.478499593	#DIV/0!	0.001079571	0.731218924	0.000458727
40歳未満								
70歳以上	P値	0.334475517	0.337962206	0.381204151	#DIV/0!	6.90668E-05	0.365781575	1.01976E-05
40歳未満								
75歳以上	P値	0.571837942	0.542872825	0.542872825	#DIV/0!	1.44828E-07	0.996944789	1.64141E-08
40~64歳								
65~69歳	P値	0.281549776	0.001192466	0.546470506	#DIV/0!	0.076848278	0.201147273	0.040467228
40~64歳								
70歳以上	P値	0.601391505	0.293779671	0.653811481	#DIV/0!	0.00053574	0.006864575	2.03882E-05
40~64歳								
75歳以上	P値	0.937837921	0.934268235	0.973748191	#DIV/0!	5.96413E-07	0.501449334	2.47885E-08
65~69歳								
70歳以上	P値	0.181720533	0.076914932	0.810588228	#DIV/0!	0.334230223	0.408852726	0.186990799
65~69歳								
75歳以上	P値	0.448973257	0.0712873	0.6996054	#DIV/0!	0.008508032	0.656380185	0.003373872
		除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
40歳未満								
40~64歳	P値	0.656688443	0.004370468	0.487822625	0.003800502	0.479771383	0.34394948	
40歳未満								
65~69歳	P値	0.823069413	0.001090327	0.732560663	0.000464038	0.824418516	0.845758766	
40歳未満								
70歳以上	P値	0.568764283	2.53501E-05	0.432607748	3.0061E-06	0.662168993	0.864553051	
40歳未満								
75歳以上	P値	0.768491908	1.00107E-07	0.964757895	1.0751E-08	0.729502393	0.530132915	
40~64歳								
65~69歳	P値	0.286594564	0.109206854	0.092832859	0.057880815	0.139494247	0.28254072	
40~64歳								
70歳以上	P値	0.045580145	0.000288471	0.003199661	7.34899E-06	0.027257176	0.041070451	
40~64歳								
75歳以上	P値	0.881191555	3.53032E-07	0.349068989	1.05131E-08	0.702985732	0.829033829	
65~69歳								
70歳以上	P値	0.602934268	0.237463926	0.525253075	0.120850652	0.75279344	0.597965177	
65~69歳								
75歳以上	P値	0.493331683	0.00706598	0.611870764	0.002728166	0.452585515	0.548280675	

表 5-19-1 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計一透析歴 15 年以上—TTEST=P 値—

		年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	1.0403E-111	8.504E-08	0.962790416	0.457011911	#DIV/0!	#DIV/0!	0.533516553
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	1.268E-300	9.89616E-07	0.555573773	0.019890149	#DIV/0!	#DIV/0!	0.680111274
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	1.1664E-216	0.000335551	0.780518543	0.136509207	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	1.052E-149	0.010794015	0.479354248	0.305357948	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～64 歳	P 値	1.5698E-171	0.408834605	0.154375991	0.000226551	#DIV/0!	#DIV/0!	0.439064763
40～64 歳	P 値	0	0.000236142	0.478994398	0.083204758	#DIV/0!	#DIV/0!	0.12951741
70 歳以上	P 値	8.6658E-241	0.000120253	0.190050282	0.556357045	#DIV/0!	#DIV/0!	0.334814127
75 歳以上	P 値	4.2341E-122	0.020087536	0.584903773	0.129977628	#DIV/0!	#DIV/0!	0.3131837
65～69 歳	P 値	2.6009E-182	0.002176796	0.788283308	0.100066492	#DIV/0!	#DIV/0!	0.522272079
75 歳以上	P 値							
		特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.992336858	#DIV/0!	0.471127722	#DIV/0!	0.849385722	0.041646079	0.278637476
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	#DIV/0!	0.544737301	0.112349754	#DIV/0!	0.237509096	0.046281338	0.309733019
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.85244178	#DIV/0!	0.152958252	#DIV/0!	0.662081033	0.338662763	0.593886737
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.446813334	#DIV/0!	0.201213999	#DIV/0!	0.543978517	0.664282993	0.199809494
40～64 歳	P 値	0.978929195	0.01164831	0.019387259	0.924989868	0.027370992	0.915712275	0.980531191
40～64 歳	P 値	0.494441265	#DIV/0!	0.151434675	0.781893922	0.587415532	0.025633205	0.302087306
70 歳以上	P 値	0.046210509	#DIV/0!	0.369257643	0.99612927	0.446521504	0.057734184	0.512078234
75 歳以上	P 値	0.600950807	0.198612185	0.544398435	0.793208559	0.209745203	0.072164174	0.432470836
65～69 歳	P 値	0.02303834	0.478996857	0.662149064	0.957783778	0.593349229	0.08983397	0.569980003
75 歳以上	P 値							
		うち VD _s	40：処置	I 型(230)	I 型(207)	II 型(166)	II 型(188)	III 型(171)
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.133853377	0.66855144	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.170105359	0.037957726	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.872474399	1.25801E-06	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.62474143	9.56485E-08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～64 歳	P 値	0.881273791	1.11679E-06	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.17047066
40～64 歳	P 値	0.023270991	4.43762E-20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.17047066
70 歳以上	P 値	0.339915529	5.71853E-13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.078140749
75 歳以上	P 値	0.087747703	9.93851E-05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.71742836
65～69 歳	P 値	0.436693331	4.44066E-05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.52837149
75 歳以上	P 値							
		III 型(222)	IV 型(224)	IV 型(235)	V 型(262)	V 型(266)	特定積層型	ダイア計
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.598803562	0.381843197	0.407005248	#DIV/0!	0.814901107	#DIV/0!	0.215247991
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	#DIV/0!	0.48017377	0.624461981	#DIV/0!	0.770406745	#DIV/0!	0.215934881
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.663414157	0.442546862	0.432465472	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.399798277
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.541468346	0.411678555	0.169985478	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.690756798
40～64 歳	P 値	0.284379879	0.334759487	0.105718597	#DIV/0!	0.346573421	#DIV/0!	0.637771279
40～64 歳	P 値	0.706542548	0.41877991	0.982018575	#DIV/0!	0.535539734	#DIV/0!	0.455620347
70 歳以上	P 値	0.737478311	0.152010526	0.107945958	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.274592426
75 歳以上	P 値	0.372920622	0.795863492	0.126032457	#DIV/0!	0.432994235	#DIV/0!	0.380051871
65～69 歳	P 値	0.207017215	0.789113306	0.005758632	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.274390542
75 歳以上	P 値							

表 5-19-2 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計一透析歴 15 年以上—TTEST=P 値—

		夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うちPTA
40歳未満								
40～64歳	P値	0.080623226	0.008461285	0.982639233	#DIV/0!	#DIV/0!	0.609560531	#DIV/0!
40歳未満								
65～69歳	P値	0.889585506	6.64948E-05	0.593108557	#DIV/0!	#DIV/0!	0.223891117	#DIV/0!
40歳未満								
70歳以上	P値	0.980408591	7.1352E-05	0.693816477	#DIV/0!	#DIV/0!	0.156009694	#DIV/0!
40歳未満								
75歳以上	P値	0.776668318	0.009574118	0.982769644	#DIV/0!	#DIV/0!	0.189512532	#DIV/0!
40～64歳	P値	0.044341738	0.284948373	0.440599538	0.359471818	0.422649731	0.180345207	#DIV/0!
40～64歳								
70歳以上	P値	0.12133333	0.286948951	0.448385967	0.216102945	#DIV/0!	0.046180256	#DIV/0!
40～64歳								
75歳以上	P値	0.29286213	0.483424087	0.990398152	0.097642465	#DIV/0!	0.072650037	#DIV/0!
65～69歳								
70歳以上	P値	0.920087304	#DIV/0!	0.964049693	0.231793042	#DIV/0!	0.646102684	#DIV/0!
65～69歳								
75歳以上	P値	0.724155006	#DIV/0!	0.60677992	0.158156335	#DIV/0!	0.485972853	#DIV/0!
		うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
40歳未満								
40～64歳	P値	#DIV/0!	0.595785411	0.187043059	0.068885687	0.402452836	0.818011153	0.000468785
40歳未満								
65～69歳	P値	#DIV/0!	0.48147414	0.131948227	0.07138847	0.436518341	0.966338685	0.012999968
40歳未満								
70歳以上	P値	#DIV/0!	0.884873641	0.389369864	0.157569408	0.860787566	0.905035427	0.007813245
40歳未満								
75歳以上	P値	#DIV/0!	0.570574993	0.529947213	0.248318641	0.783355019	0.921845754	0.113838429
40～64歳								
65～69歳	P値	#DIV/0!	0.445510317	0.346806056	0.903392561	0.943664082	0.563869427	0.357456236
40～64歳								
70歳以上	P値	#DIV/0!	0.248191112	0.298948606	0.38060051	0.154090123	0.806021402	0.093235227
40～64歳								
75歳以上	P値	#DIV/0!	0.47199601	0.307613438	0.238910661	0.149373144	0.616479854	0.700145581
65～69歳								
70歳以上	P値	#DIV/0!	0.117366318	0.134535581	0.420157314	0.24077615	0.779914344	0.379263166
65～69歳								
75歳以上	P値	#DIV/0!	0.296403062	0.17978895	0.248602534	0.194454674	0.929502367	0.765519906
		うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
40歳未満								
40～64歳	P値	0.145327282	0.879910588	0.945895089	#DIV/0!	0.177132167	0.045561689	0.342466098
40歳未満								
65～69歳	P値	0.179631759	0.534430733	0.252685103	#DIV/0!	0.838839722	0.004537671	0.430725659
40歳未満								
70歳以上	P値	0.18158937	0.556494536	0.693102466	#DIV/0!	0.019707906	0.069572389	0.00049426
40歳未満								
75歳以上	P値	0.291423539	0.90480278	0.687018807	#DIV/0!	0.015497501	0.113256668	0.000430962
40～64歳								
65～69歳	P値	0.813175985	0.661737164	0.007024396	#DIV/0!	0.020124075	0.119429524	0.000721677
40～64歳								
70歳以上	P値	0.52040001	0.405457021	0.271030615	#DIV/0!	1.25537E-11	0.296143119	3.35107E-15
40～64歳								
75歳以上	P値	0.64425217	0.947512398	0.505206371	#DIV/0!	5.34128E-07	0.530629186	3.96273E-09
65～69歳								
70歳以上	P値	0.480251019	0.678054423	0.195479169	#DIV/0!	6.60273E-05	0.020565055	4.27192E-05
65～69歳								
75歳以上	P値	0.604168895	0.624837056	0.021045008	#DIV/0!	0.000559269	0.111154718	0.000225952
		除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
40歳未満								
40～64歳	P値	0.107900078	0.109896939	0.016991908	0.246552563	0.050265934	0.060510318	
40歳未満								
65～69歳	P値	0.050749199	0.647493733	0.00085596	0.542320882	0.016347479	0.022423595	
40歳未満								
70歳以上	P値	0.477592495	0.048863203	0.075230299	0.002597056	0.423801621	0.495655547	
40歳未満								
75歳以上	P値	0.587723404	0.027761567	0.245348729	0.001691183	0.773670362	0.905706551	
40～64歳								
65～69歳	P値	0.58524054	0.020855425	0.044896191	0.000532388	0.375184668	0.453384025	
40～64歳								
70歳以上	P値	0.0334431	1.20675E-12	0.302330495	1.30712E-16	0.027377555	0.022099005	
40～64歳								
75歳以上	P値	0.140058829	1.03164E-08	0.275281182	2.68571E-11	0.041484213	0.026107551	
65～69歳								
70歳以上	P値	0.017332397	6.80202E-05	0.017617735	4.57047E-05	0.014901816	0.016041156	
65～69歳								
75歳以上	P値	0.076131554	0.000153455	0.043544023	5.8146E-05	0.026981649	0.020620375	

表6-1 院内・院外別処方集計結果表 一病院・診療所計一院 内一

	年齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	5,099	5,026	5,100	5,100	1,155	43	1,375
合計	316,224	45,792.51	4,410,309	12,912,767	150,410	3,440	607,500
平均	62.01686605	9.111124154	864.7664706	2531.915098	130.2251082	80	441.8181818
標準偏差	12.45244032	7.66938168	90.97976093	245.8998277	5.407283093	0	42.13381111
標準誤差	0.174386139	0.108180531	1.273971473	3.443286315	0.159106571	0	1.136264386
中央値(メジアン)	63	7.05	923	2445	130	80	450
最頻値(モード)	60	1.09	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	322	58	3,728	535	5,100	5,100	3,135
合計	92,610	10,092	293,215	1,085,253	1,177,953	11,284,694	4,331,938
平均	287.6086957	174	78.65209227	2028.51028	230.9711765	2212.685098	1381.798405
標準偏差	30.02453284	0	134.807798	1386.454337	111.684117	1322.828108	2078.919121
標準誤差	1.673201799	0	2.207888122	59.94164808	1.563890447	18.52329854	37.12947609
中央値(メジアン)	294	174	20	1810	210	1979	396
最頻値(モード)	294	174	10	300	168	1894	24
	うちVD _s	40：処置	うちI型(230)	うちI型(207)	うちII型(166)	うちII型(188)	うちIII型(171)
標本数	1,144	5,100	98	25	30	113	79
合計	2,444,340	171,558,923	283,590	63,963	60,258	269,216	163,305
平均	2136.660839	33639.00451	2893.77551	2558.52	2008.6	2382.442478	2067.151899
標準偏差	1040.571743	1817.904301	392.0564742	438.6251361	438.8700695	320.194331	433.9751585
標準誤差	30.76514853	25.45575187	39.6036845	87.72502722	80.12634563	30.12134891	48.82602001
中央値(メジアン)	2116.5	32708	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値(モード)	2223	32305	2990	2691	2158	2444	2223
	うちIII型(222)	うちIV型(224)	うちIV型(235)	うちV型(262)	うちV型(266)	うち特定積層型	うちダイア計
標本数	641	606	3,003	28	516	34	5,100
合計	1,799,532	1,735,328	9,108,600	95,368	1,754,004	350,064	15,683,228
平均	2807.382215	2863.577558	3033.166833	3406	3399.232558	10296	3075.142745
標準偏差	397.1849604	309.1896844	202.5909238	0	354.5229972	0	628.5876778
標準誤差	15.68786273	12.55997236	3.69693929	0	15.60700471	0	8.801988063
中央値(メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
最頻値(モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うちPTA
標本数	1,338	1,183	2,125	56	13	1,389	10
合計	4,629,000	1,815,600	760,382	158,841	35,662	172,163	176,557
平均	3459.641256	1534.742181	357.8268235	2836.446429	2743.230769	123.9474442	17655.7
標準偏差	963.4380548	175.7220934	2145.476608	4516.162019	3957.022326	22.14617998	7778.148409
標準誤差	26.33878516	5.108977572	46.54192228	603.4975349	1097.48053	0.594220598	2459.666495
中央値(メジアン)	3900	1560	130	1998.5	1500	130	13768
最頻値(モード)	3900	1560	130	3130	1500	130	#N/A
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	16	735	2,720	1,064	2,224	4,219	4,113
合計	270,345	105,434	956,174	564,907	379,461	677,099	201,398
平均	16896.5625	143.447619	351.5345588	530.9276316	170.6209532	160.4880303	48.96620472
標準偏差	9183.065247	321.5176243	446.6299573	534.3435404	151.8466676	448.6156411	47.13782234
標準誤差	2295.766312	11.85935623	8.563738506	16.38135227	3.219866562	6.90668499	0.735004775
中央値(メジアン)	12822	104	205	350	120	60	32
最頻値(モード)	12733	104	55	530	55	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	420	23	0	0	5,100	5,100	5,100
合計	449,063	36,945	0	0	207,995,430	203,366,430	206,179,830
平均	1069.197619	1606.304348	#DIV/0!	#DIV/0!	40783.41765	39875.77059	40427.41765
標準偏差	802.0676809	1636.486826	#DIV/0!	#DIV/0!	3591.929827	3303.805237	3479.861156
標準誤差	39.13689541	341.2310916	65535	65535	50.297078	46.26252675	48.72780272
中央値(メジアン)	1174	850	#NUM!	#NUM!	40132	39192.5	39757.5
最頻値(モード)	442	440	#N/A	#N/A	38407	36958	37726
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	
合計	201,550,830	207,235,048	202,606,048	205,419,448	200,790,448	199,705,195	
平均	39519.77059	40634.32314	39726.67608	40278.32314	39370.67608	39157.88137	
標準偏差	3135.675561	3321.027332	2994.59302	3205.72003	2815.113519	2701.570985	
標準誤差	43.90824039	46.50368432	41.93268965	44.88905913	39.41947395	37.82956046	
中央値(メジアン)	38818	40070	39115.5	39684	38744.5	38532.5	
最頻値(モード)	37726	38382	36956	37726	38618	38737	

表 8-1 DM・非 DM 別集計結果表 一病院・診療所計—DM—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	974	965	974	974	199	27	29
合計	61,990	4,968.69	842,092	2,338,580	25,870	2,160	13,050
平均	63.64476386	5.148901554	864.5708419	2401.00616	130	80	450
標準偏差	11.14618773	4.598370859	96.40250821	157.8326027	0	0	0
標準誤差	0.357146892	0.148026796	3.088935608	5.057282801	0	0	0
中央値 (メジアン)	64	4.06	923	2315	130	80	450
最頻値 (モード)	59	2.08	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	2	1	480	974	573	576	578
合計	588	87	51,755	1,776,922	139,422	1,329,748	783,529
平均	294	87	107.8229167	1824.355236	243.3193717	2308.590278	1355.586505
標準偏差	0	#DIV/0!	144.6170521	1316.61092	121.5213337	1337.977102	2421.425781
標準誤差	0	0	6.600835135	42.18693507	5.076626544	55.74904592	100.7180347
中央値 (メジアン)	294	87	30	1581	226	2126	172
最頻値 (モード)	294	#N/A	10	820	168	1212	24
	うち VD _s	40：処置	うち I 型(230)	うち I 型(207)	うち II 型(166)	うち II 型(188)	うち III 型(171)
標本数	138	974	30	7	22	36	26
合計	253,176	33,173,528	86,940	16,767	46,978	87,984	53,523
平均	1834.608696	34059.06366	2898	2395.285714	2135.363636	2444	2058.576923
標準偏差	908.4406583	1704.900004	503.9047529	782.3864591	106.1739567	44.94059571	431.1934297
標準誤差	77.33160432	54.62851982	92	295.7142857	22.63636364	7.490099285	84.56398894
中央値 (メジアン)	1729	33865	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値 (モード)	2223	33865	2990	2691	2158	2444	2223
	うち III 型(222)	うち IV 型(224)	うち IV 型(235)	うち V 型(262)	うち V 型(266)	うち特定積層型	うちダイア計
標本数	130	128	532	8	54	10	974
合計	369,630	367,808	1,618,210	27,248	186,732	102,960	2,964,780
平均	2843.307692	2873.5	3041.74812	3406	3458	10296	3043.921971
標準偏差	307.9301956	275.5776753	171.3493268	0	0	0	782.7261082
標準誤差	27.00726474	24.35785537	7.428935478	0	0	0	25.08016225
中央値 (メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
最頻値 (モード)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
	夜間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うち PTA
標本数	152	725	438	12	3	284	2
合計	512,700	1,105,440	146,427	21,753	4,393	35,448	32,510
平均	3373.026316	1524.744828	334.3082192	1812.75	1464.333333	124.8169014	16255
標準偏差	1064.164654	209.1064844	1818.095884	1348.484612	1124.778349	25.63817817	3743.4233
標準誤差	86.31515121	7.766019867	86.87198165	389.273977	649.3910823	1.52134598	2647
中央値 (メジアン)	3900	1560	130	1916.5	830	130	16255
最頻値 (モード)	3900	1560	130	3130	#N/A	130	#N/A
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	3	158	748	233	692	785	772
合計	51,272	21,804	184,060	103,320	80,848	147,255	44,942
平均	17090.66667	138	246.0695187	443.4334764	116.8323699	187.5859873	58.21502591
標準偏差	3792.983566	230.0137077	344.5940832	450.4594361	132.3558034	502.9383463	53.97184626
標準誤差	2189.880083	18.29890806	12.59960753	29.51057885	5.031412696	17.95063933	1.942489252
中央値 (メジアン)	18889	104	55	350	55	78	60
最頻値 (モード)	#N/A	104	55	530	55	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	83	444	439	0	974	974	974
合計	89,436	153,926	133,036	0	40,876,817	40,364,117	39,771,377
平均	1077.542169	346.6801802	303.0432802	#DIV/0!	41967.9846	41441.59856	40833.03593
標準偏差	762.6867193	443.1928038	179.5045577	#DIV/0!	3791.344392	3653.133543	3694.737057
標準誤差	83.71574334	21.03299967	8.567285109	65535	121.4825103	117.053949	118.3870116
中央値 (メジアン)	877	279	274	#NUM!	41283	40749.5	40009.5
最頻値 (モード)	129	84	84	#N/A	38541	38541	38491
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	974	974	974	974	974	974	
合計	39,258,677	40,730,390	40,217,690	39,624,950	39,112,250	37,335,328	
平均	40306.6499	41817.64887	41291.26283	40682.70021	40156.31417	38331.95893	
標準偏差	3548.637715	3527.361809	3378.440436	3425.649616	3267.615197	2896.048895	
標準誤差	113.7056867	113.0239627	108.2522142	109.7648938	104.7011444	92.79539218	
中央値 (メジアン)	39485	41224.5	40657	39946	39413	37624.5	
最頻値 (モード)	38491	37007	37007	38962	37763	35795	

表 8-11-1 DM・非 DM 別集計結果表 —TTEST=P 値—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
病院・診療所計 D M 非 DM P 値	6.32553E-05	3.53129E-67	0.729420169	1.23171E-62	0.514734084	#DIV/0!	0.380187976
病院 1・2 計 D M 非 DM P 値	0.002855757	1.1449E-32	0.050842356	8.37268E-14	0.593369337	#DIV/0!	#DIV/0!
病院 1 D M 非 DM P 値	0.015819598	2.05548E-26	0.00302022	4.07352E-18	0.593814728	#DIV/0!	#DIV/0!
病院 2 D M 非 DM P 値	0.082477048	9.88242E-08	0.352645332	0.037442819	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
診療所 D M 非 DM P 値	0.566068545	3.36727E-32	0.25895021	1.61968E-57	0.712664116	#DIV/0!	#DIV/0!
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
病院・診療所計 D M 非 DM P 値	0.855376197	#DIV/0!	0.466171669	#DIV/0!	3.99504E-05	0.000188635	0.917306093
病院 1・2 計 D M 非 DM P 値	0.841808973	#DIV/0!	0.836951601	#DIV/0!	0.000992795	0.003070599	0.909910649
病院 1 D M 非 DM P 値	0.841808973	#DIV/0!	0.330541199	#DIV/0!	0.002097011	0.006834671	0.395091582
病院 2 D M 非 DM P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.007259605	#DIV/0!	0.54084804	0.196629572	0.148001437
診療所 D M 非 DM P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.892433916	#DIV/0!	0.050612779	0.014271431	0.071451465
	うち VD _s	40：処置	I 型 (230)	I 型 (207)	II 型 (166)	II 型 (188)	III 型 (171)
病院・診療所計 D M 非 DM P 値	0.000838558	8.49417E-10	0.787021495	0.342009374	0.510762319	0.349000931	0.800853047
病院 1・2 計 D M 非 DM P 値	0.0787961	4.44093E-05	0.124218168	0.022342028	0.550695496	0.482632443	0.534887454
病院 1 D M 非 DM P 値	0.106378268	0.000614578	0.251238379	#DIV/0!	0.550695496	0.483877097	0.55064591
病院 2 D M 非 DM P 値	0.415943576	0.021955658	#DIV/0!	0.571606957	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
診療所 D M 非 DM P 値	0.002753362	1.67595E-07	0.403801151	#DIV/0!	0.903678997	0.535088961	0.014314985
	III 型 (222)	IV 型 (224)	IV 型 (235)	V 型 (262)	V 型 (266)	特定積層型	ダイア計
病院・診療所計 D M 非 DM P 値	0.415546384	0.90558193	0.358769312	#DIV/0!	0.155532682	0.724186827	0.252281117
病院 1・2 計 D M 非 DM P 値	0.352141891	0.457122247	0.362432221	#DIV/0!	0.385456794	#DIV/0!	0.035481814
病院 1 D M 非 DM P 値	0.418102462	0.606998984	0.483999825	#DIV/0!	0.402696947	#DIV/0!	0.000208288
病院 2 D M 非 DM P 値	0.694815147	0.252129344	0.520532995	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.621181402
診療所 D M 非 DM P 値	0.953826381	0.216820793	0.878568672	#DIV/0!	0.27370887	0.747163172	0.552831795

表 8-11-2 DM・非DM別集計結果表 —TTEST=P値—

	夜間	障害	50:手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うちPTA
病院・診療所計 D M 非DM P値	0.10966458	1.78863E-06	0.768254096	0.347683829	0.586902183	0.273589455	0.896883314
病院1・2計 D M 非DM P値	0.20845519	0.001070452	0.101887232	0.287451735	#DIV/0!	0.258784649	#DIV/0!
病院1 D M 非DM P値	0.831139013	5.07816E-05	0.153135906	0.353932373	#DIV/0!	0.340707015	#DIV/0!
病院2 D M 非DM P値	0.039005859	0.190242175	0.403737721	#DIV/0!	#DIV/0!	0.417655134	#DIV/0!
診療所 D M 非DM P値	0.296476984	0.000234931	0.561219923	0.169603908	#DIV/0!	0.540381244	#DIV/0!
	うちシャント	うちその他	60:検査	うち生体	うち検体	70:画像	うち胸部
病院・診療所計 D M 非DM P値	0.961638933	0.851665099	5.42109E-14	0.00621199	2.21027E-27	0.379614052	0.337436295
病院1・2計 D M 非DM P値	#DIV/0!	0.638122303	2.04736E-09	0.012253033	7.90526E-15	0.7447144	0.325964377
病院1 D M 非DM P値	#DIV/0!	0.608545176	1.67091E-09	0.008206238	3.20052E-13	0.43660095	0.621689848
病院2 D M 非DM P値	#DIV/0!	0.283458096	0.132399537	0.740826923	0.001708654	0.084976329	0.424063013
診療所 D M 非DM P値	#DIV/0!	0.654628047	1.14917E-06	0.058344052	5.22915E-14	0.184484372	0.739501754
	うち胸部ほか	80:その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
病院・診療所計 D M 非DM P値	0.774592785	0.058535089	0.568630152	#DIV/0!	1.14809E-80	9.3502E-145	5.65481E-32
病院1・2計 D M 非DM P値	0.903145054	0.262245907	0.65350133	#DIV/0!	4.37756E-30	1.4485E-52	7.32108E-12
病院1 D M 非DM P値	0.962154726	0.27994044	0.989284669	#DIV/0!	8.63132E-21	2.49573E-36	5.46513E-08
病院2 D M 非DM P値	0.674446346	0.232791356	0.892437854	#DIV/0!	2.88606E-11	2.52221E-18	1.20573E-05
診療所 D M 非DM P値	0.374479702	0.174073054	0.077210674	#DIV/0!	1.96479E-52	2.32822E-89	7.34629E-23
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
病院・診療所計 D M 非DM P値	2.60945E-73	1.17783E-92	3.7816E-173	9.75554E-37	1.06648E-88	0.752841993	
病院1・2計 D M 非DM P値	4.86679E-26	9.63709E-40	3.34363E-71	1.55737E-16	5.04055E-37	0.994800313	
病院1 D M 非DM P値	2.14126E-17	1.35291E-28	6.16804E-52	1.73382E-11	3.99531E-26	0.374884571	
病院2 D M 非DM P値	9.45462E-11	9.40488E-13	8.61636E-21	1.40126E-06	2.08945E-12	0.171042582	
診療所 D M 非DM P値	4.6408E-47	6.94852E-56	5.2333E-99	5.13563E-24	5.0122E-52	0.61001216	

表 9-2 年齢別 DM・非 DM 別集計結果表 一病院・診療所計—40～64 歳—DM—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	487	484	487	487	100	15	3
合計	27,171	2,485.36	419,888	1,160,214	13,000	1,200	1,350
平均	55.7926078	5.135041322	862.1930185	2382.36961	130	80	450
標準偏差	6.389944098	4.784504167	90.42710563	131.5365154	0	0	0
標準誤差	0.289556006	0.217477462	4.097643293	5.960488465	0	0	0
中央値 (メジアン)	57	4.05	923	2315	130	80	450
最頻値 (モード)	59	1.04	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	1	0	239	487	292	293	289
合計	294	0	21,835	857,632	69,129	686,352	339,813
平均	294	#DIV/0!	91.35983264	1761.051335	236.7431507	2342.498294	1175.823529
標準偏差	#DIV/0!	#DIV/0!	133.2895542	906.5886878	124.1650567	1365.522218	2305.061222
標準誤差	0	65535	8.621784531	41.08145484	7.266210336	79.77465979	135.5918366
中央値 (メジアン)	294	#NUM!	30	1656	213.5	2195	159
最頻値 (モード)	#N/A	#N/A	10	820	168	1595	24
	うち VD ₃	40：処置	うち I 型(230)	うち I 型(207)	うち II 型(166)	うち II 型(188)	うち III 型(171)
標本数	72	487	8	1	8	12	10
合計	128,147	16,734,425	23,920	2,691	17,264	29,516	21,717
平均	1779.819444	34362.26899	2990	2691	2158	2459.666667	2171.7
標準偏差	732.4385534	1768.596477	0	#DIV/0!	0	54.2709253	162.224844
標準誤差	86.31871132	80.14275632	0	0	0	15.66666667	51.3
中央値 (メジアン)	1729	33865	2990	2691	2158	2444	2223
最頻値 (モード)	2223	33865	2990	#N/A	2158	2444	2223
	うち III 型(222)	うち IV 型(224)	うち IV 型(235)	うち V 型(262)	うち V 型(266)	うち特定積層型	うちダイア計
標本数	57	47	300	5	41	1	487
合計	162,282	134,400	913,210	17,030	141,778	10,296	1,474,104
平均	2847.052632	2859.574468	3044.033333	3406	3458	10296	3026.907598
標準偏差	294.0461833	362.4335468	164.9690319	0	0	#DIV/0!	404.2618861
標準誤差	38.94736842	52.86636622	9.524491499	0	0	0	18.31885467
中央値 (メジアン)	2886	2912	3055	3406	3458	10296	3055
最頻値 (モード)	2886	2912	3055	3406	3458	#N/A	3055
	夜間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うち PTA
標本数	122	363	218	7	2	140	1
合計	412,500	546,960	48,511	8,403	3,563	17,520	13,608
平均	3381.147541	1506.77686	222.5275229	1200.428571	1781.5	125.1428571	13608
標準偏差	1024.842819	253.1946652	965.1906627	1256.421354	1388.050611	32.24938155	#DIV/0!
標準誤差	92.78490923	13.28927346	65.37096034	474.882635	981.5	2.725570203	0
中央値 (メジアン)	3900	1560	130	870	1781.5	130	13608
最頻値 (モード)	3900	1560	130	50	#N/A	130	#N/A
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	0	81	386	109	363	387	382
合計	0	12,820	90,779	50,193	41,391	65,678	22,739
平均	#DIV/0!	158.2716049	235.1787565	460.4862385	114.0247934	169.7105943	59.52617801
標準偏差	#DIV/0!	291.860755	333.3433808	444.6815676	130.1408372	472.9578616	66.40587913
標準誤差	65535	32.42897278	16.96673135	42.5927694	6.83062249	24.04179924	3.397620349
中央値 (メジアン)	#NUM!	104	55	360	55	60	60
最頻値 (モード)	#N/A	104	55	530	55	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	36	221	219	0	487	487	487
合計	37,157	75,878	68,618	0	20,479,650	20,067,150	19,932,690
平均	1032.138889	343.3393665	313.3242009	#DIV/0!	42052.6694	41205.64682	40929.54825
標準偏差	758.303036	462.5047693	177.8692694	#DIV/0!	3508.08705	3235.738309	3399.097005
標準誤差	126.3838393	31.11143754	12.01929138	65535	158.9665983	146.6252988	154.0277879
中央値 (メジアン)	774.5	292	284	#NUM!	41651	40674	40342
最頻値 (モード)	528	84	84	#N/A	40783	40783	38018
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	487	487	487	487	487	487	
合計	19,520,190	20,431,139	20,018,639	19,884,179	19,471,679	18,614,047	
平均	40082.52567	41953.05749	41106.03491	40829.93634	39982.91372	38221.86242	
標準偏差	3102.6613	3408.637447	3148.370245	3299.858634	3015.263172	2770.82636	
標準誤差	140.5950039	154.4601066	142.6662739	149.530868	136.6346167	125.5581274	
中央値 (メジアン)	39558	41557	40638	40304	39454	37644	
最頻値 (モード)	39789	40783	40783	38018	38018	37597	

表9-5 年齢別DM・非DM別集計結果表 一病院・診療所計一75歳以上一DM一

	年齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	159	156	159	159	30	6	18
合計	12,677	773.07	138,193	389,774	3,900	480	8,100
平均	79.72955975	4.955576923	869.1383648	2451.408805	130	80	450
標準偏差	3.978877035	3.806951747	116.9943998	202.4222061	0	0	0
標準誤差	0.315545474	0.304800077	9.278259432	16.05312516	0	0	0
中央値(メジアン)	79	4.045	923	2335	130	80	450
最頻値(モード)	77	6.10	923	2305	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	1	0	84	159	95	95	93
合計	294	0	10,505	335,398	24,208	212,988	140,256
平均	294	#DIV/0!	125.0595238	2109.421384	254.8210526	2241.978947	1508.129032
標準偏差	#DIV/0!	#DIV/0!	141.7861406	2218.752781	114.4569954	1346.099005	2566.394346
標準誤差	0	65535	15.47013623	175.9585411	11.74303996	138.1068439	266.1226967
中央値(メジアン)	294	#NUM!	40	1400	252	2006	240
最頻値(モード)	#N/A	#N/A	10	300	282	#N/A	6
	うちVD ₃	40：処置	うちI型(230)	うちI型(207)	うちII型(166)	うちII型(188)	うちIII型(171)
標本数	19	159	16	2	4	5	10
合計	28,507	5,339,280	47,840	3,312	8,632	12,220	21,033
平均	1500.368421	33580.37736	2990	1656	2158	2444	2103.3
標準偏差	607.3003294	1468.948865	0	1463.711037	0	0	378.5246359
標準誤差	139.3242507	116.4952227	0	1035	0	0	119.7
中央値(メジアン)	1197	33722	2990	1656	2158	2444	2223
最頻値(モード)	1197	33865	2990	#N/A	2158	2444	2223
	うちIII型(222)	うちIV型(224)	うちIV型(235)	うちV型(262)	うちV型(266)	うち特定積層型	うちダイア計
標本数	29	27	64	1	0	3	159
合計	83,028	78,624	194,110	3,406	0	30,888	483,093
平均	2863.034483	2912	3032.96875	3406	#DIV/0!	10296	3038.320755
標準偏差	123.6730952	0	176.25	#DIV/0!	#DIV/0!	0	1038.607413
標準誤差	22.96551724	0	22.03125	0	65535	0	82.36692559
中央値(メジアン)	2886	2912	3055	3406	#NUM!	10296	2990
最頻値(モード)	2886	2912	3055	#N/A	#N/A	10296	3055
	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血	うちペンレス	うちPTA
標本数	5	109	71	0	0	52	0
合計	12,300	170,040	8,153	0	0	6,253	0
平均	2460	1560	114.8309859	#DIV/0!	#DIV/0!	120.25	#DIV/0!
標準偏差	1971.801207	0	21.2125205	#DIV/0!	#DIV/0!	21.15106728	#DIV/0!
標準誤差	881.8163074	0	2.517463026	65535	65535	2.933125293	65535
中央値(メジアン)	3900	1560	130	#NUM!	#NUM!	130	#NUM!
最頻値(モード)	3900	1560	130	#N/A	#N/A	130	#N/A
	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体	70：画像	うち胸部
標本数	0	19	111	39	101	122	116
合計	0	1,900	29,196	16,350	12,532	36,327	6,706
平均	#DIV/0!	100	263.027027	419.2307692	124.0792079	297.7622951	57.81034483
標準偏差	#DIV/0!	12.85820101	409.5909369	544.6367433	135.063295	654.0407404	37.5114855
標準誤差	65535	2.949873622	38.87665128	87.2116762	13.43930016	59.21406638	3.482853992
中央値(メジアン)	#NUM!	104	85	190	55	78	60
最頻値(モード)	#N/A	104	55	150	55	13	13
	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計	除夜間	除障害
標本数	23	71	71	0	159	159	159
合計	26,722	19,225	18,725	0	6,649,060	6,636,760	6,479,020
平均	1161.826087	270.7746479	263.7323944	#DIV/0!	41817.98742	41740.62893	40748.55346
標準偏差	771.5462428	205.4148553	180.8678253	#DIV/0!	4153.763404	4141.993303	4008.808953
標準誤差	160.8785127	24.37825826	21.46506176	65535	329.4148654	328.4814357	317.9192297
中央値(メジアン)	1220	228	228	#NUM!	40922	40918	39542
最頻値(モード)	129	84	84	#N/A	38750	38750	38491
	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在	
標本数	159	159	159	159	159	159	
合計	6,466,720	6,640,907	6,628,607	6,470,867	6,458,567	6,123,169	
平均	40671.19497	41766.71069	41689.3522	40697.27673	40619.91824	38510.49686	
標準偏差	4006.156088	4145.947338	4134.12084	4001.43727	3998.744213	3152.803366	
標準誤差	317.7088438	328.7950111	327.8571087	317.3346172	317.1210439	250.0335708	
中央値(メジアン)	39433	40818	40817	39433	39358	37577	
最頻値(モード)	38491	38721	38721	37161	37161	41203	