

第14回透析医療費実態調査報告

太田圭洋^{*1} 杉崎弘章^{*1} 隅 博政^{*1} 篠田俊雄^{*1} 鈴木正司^{*1} 戸澤修平^{*1} 村上秀一^{*2}
山川智之^{*1} 吉田豊彦^{*2} 山崎親雄^{*3}

key words : 診療報酬改定, 包括点数, 透析液水質確保加算, 薬剤費, 5型ダイアライザー

要 旨

2010年の透析医療費実態調査の結果から、維持透析1回あたりの請求額は3,064点と、前回の3,081点から約17点の減少が認められた。同年4月の診療報酬改定では、代表的な4時間以上透析で、処置料（人工腎臓点数）が2,267点から2,235点へと32点引き下げられた。10点の水質確保加算が新設されたものの、理論上20点以上の減少が想定されていたが、投薬料の増加が減少幅を圧縮した結果となった。

1 はじめに

日本透析医会の透析医療費実態調査は、1997年より開始して今年で14回目となる。この調査結果は、日本医師会や厚生労働省へ提出する要望書の裏付けになっている。今回も会員諸兄のご協力により、44都道府県の208施設より10,803件の外来レセプトコピーをいただき分析を行った。

調査対象は例年のごとく、①慢性維持透析患者外来医学管理料（慢透）を算定していること、②定点観測は6月分とし、月水金（昼・夜すべてのシフト）で月13回の透析を実施していること、③HDFやリクセル使用は除外することで、対象を従来通り一定の基準に絞った。しかし、基準外のレセプトが110件あり、有効レセプト10,693件（病院4,822、診療所5,871）を分析対象とした。

2 調査結果の概要と年次推移

表1（以下、表については文末に掲載）に今回の調査を含む過去14回の集計結果の時系列表を示す。今回の調査の平均年齢は63.4歳（前年62.9歳）、透析歴9.2年（前年9.3年）と患者の高齢化傾向を認めた。請求合計点数は39,835.2点であり、前年の40,054.4点に比し219.2点のマイナスであった。投薬は2,887.5点と前年に比べ124.7点の増加、注射は1467.6点と前年に比し13.8点のマイナスであった。今回の調査は2010年4月の診療報酬改定後の調査であり、改定により透析技術料（処置料）が引き下げられたことが影響し（処置点数は32,886.5点と前年の33,244.8と比べ358.3点の大幅マイナス）、使用薬剤が大幅に増加したにもかかわらず、請求合計が減少する結果となった。

透析1回あたりに割り返すと、透析1回点数は3,064.2点と、前回調査の3,081.1点と比較し16.9点の減少となった。処置料の減少は27.6点の減少であった。今回の診療報酬改定で、4時間以上透析が2,267点から2,235点に引き下げられたため、32点引き下がるところが、水質確保加算10点の新設分があり、処置点数27.6点の減少は、ほぼ診療報酬改定分の点数ダウンがあったことがわかる。投薬料の増加は1回あたり9.6点分あり、この投薬料の増加が、処置料の減少を圧縮し、1回あたりの請求合計点数の引き下げが16.9点にとどまった結果となった。

夜間加算の算定割合は26.2%となり、例年通り減少傾向の継続が認められた。また障害加算の算定割合

*1 日本透析医会適正医療経済部会/同常任理事会 *2 同適正医療経済部会 *3 同常任理事会

は23.9%と前年と同様であった。

使用ダイアライザーは、IV型76.7%と前回の79.5%から減少、V型21.4%（前回16.9%）とIV・V型の高性能ダイアライザーの使用は合計して98.1%と増加した。特にV型ダイアライザーの使用比率の増加が目立った。

3 病院・診療所全体の集計結果（表2）

- ① 病院と診療所の平均請求合計点数は39,835.2点であり、09年の40,054.4点と比し219.2点（0.5%）のマイナスであった。
- ② 請求合計の77.8%を占める処置点数（40）は32,886.5点であり、09年の33,244.8点と比べ358.3点（1.1%）のマイナスであった。
- ③ ダイアライザーの使用区分はⅢ型255件（2.4%）、IV型8,197件（76.7%）、V型2,284件（21.4%）であった。この4年間でⅢ型は14.2%→5.3%→2.8%→2.4%と減少傾向、IV型は72.8%→81.2%→79.5%→76.7%と減少傾向、V型が6.6%→10.5%→16.9%→21.4%と増加傾向を示し、特にV型ダイアライザーへのシフトが鮮明となつた。
- ④ ダイアライザーの平均点数は、材料費の引き下げにより、高機能ダイアライザーへのシフトにもかかわらず2,360点と、09年調査の2,404点から44点の減少となった。
- ⑤ 透析時間に関しては、4～5時間透析は82.2%と前年の71.3%から大幅な増加を認めた。本年の調査では、透析時間別の請求合計数が全サンプル数を超過しており、毎回4時間透析ではなく、一部4時間未満透析や、一部5時間以上透析が混入した可能性もあり、今後の集計に注意する必要があると考えられた。
- ⑥ 投薬（20）は、08年2,292点→09年2,762点→今年2,887点と増加傾向を認めた。CKD-MBD関連の新しい治療薬および、透析皮膚瘙痒症関連の新しい治療薬の増加が原因と考えられた。
- ⑦ 注射（30）に関しては、逆に09年の1,481点から1,467点へと減少した。そのうちVitD3製剤が1,872点から1,819点へと減少していた。VitD3製剤の使用比率は30.0%から33.6%へと増加しており、薬価改定の影響およびレグパラ使用対象

症例の増加によるVitD3製剤の低容量投与の増加が増えたものと考えられた。

4 病院1、病院2と診療所別集計結果の比較（表3,4）

今年も昨年に続き、病院1（200床未満）、病院2（200床以上）、診療所を区別し、外来レセプトを分析した。病院1は3,617件、病院2は1,205件、診療所は5,871件であった。

- ① 患者の平均年齢は、病院1が63.5歳、病院2が64.3歳、診療所が63.2歳であった。透析歴は、病院1が9.2年、病院2が8.2年、診療所が9.4年で、病院2が有意に短かった。病院2は導入患者が多いためと考えられた。
- ② 請求合計は、病院1が40,302点、病院2が39,065点、診療所が39,705点で、病院2<診療所<病院1で、昨年と同様に各規模別に有意差を認めた。これは院外処方比率が病院2：66.2%>診療所：47.8%>病院1：40.3%となっており、投薬（20）が全体の請求合計に大きく影響を及ぼしたと考えられた。実際に院外処方のみでの請求合計を比較すると、病院1が38,459点、病院2が37,998点、診療所が38,322点となり、差が圧縮された。

5 男女別集計結果（表5）

- ① 毎年のレセプト調査と同様、男性6,963件、女性3,715件と本年も男性が有意に多かった。年齢は、男性62.6歳、女性64.9歳と女性が高齢であった。毎年、レセプト調査では、月水金のレセプトを集計しており、夜間透析比率が男性34.0%，女性11.7%と男性の夜間透析比率が高いことから、若い世代の患者が多く集計されていることが原因と考えられている。
- ② 請求合計は、男性40,242点>女性39,076点で有意に男性が高いが、夜間加算を除くと、男性39,023点>女性38,682点と差は縮まった。
- ③ 透析時間では、5時間以上透析の比率は男性15.8%>女性11.5%と男性が多かった。V型ダイアライザー使用の比率も男性23.3%>女性17.7%と男性が多い傾向にあった。
- ④ 注射のうちVD3使用比率は、男性33.6%，女性33.7%，投薬のうちレグパラ等の使用比率は男

性 14.5%，女性 14.3% と CKD-MBD 関連の治療内容に関しての差は認められなかった。

6 年齢別集計結果（表 6）

今回の調査での年齢分布は、40 歳未満 4.0% (423 件), 40~64 歳 48.7% (5,205 件), 65~69 歳 14.9% (1,592 件), 70 歳以上 32.3% (3,458 件) (うち 75 歳以上 19.9% (2,127 件)) であった。以下 40~64 歳を成年, 65~69 歳を前期高齢者, 70 歳以上を中後期高齢者と呼ぶ。

① 請求合計は成年 40,456 点, 前期高齢者 39,595 点, 中後期高齢者 38,890 点と, 加齢とともに有意に低下傾向を認めた。

② しかし, 夜間加算の算定割合がそれぞれ, 40.8%, 16.3%, 5.8% と異なっており, 夜間加算が全体の請求点数合計の差に大きく影響を及ぼしていた。夜間加算を除いた請求合計は, 成年 38,999 点, 前期高齢者 39,023 点, 中後期高齢者 38,701 点と, 中後期高齢者の点数が若干低いことに有意差がまだ残るもの大きな差は認められなくなつた。

7 レグパラ, ホスレノール, レミッチ等の高額薬剤について（表 7）

昨年の調査から, 新たに使用が始まった高額な薬剤としてレグパラ, ホスレノール, レミッチの集計を実施している。

① 投薬 (20) のある 5,954 件のうち, レグパラ使

用頻度は 1,073 件 (18%), ホスレノールは 662 件 (11.1%), レミッチは 67 件 (1.2%) と, それぞれ昨年の 13.4%, 9.6%, 0.6% から増加していた。

② 使用の平均点数はレグパラ 2,231 点, ホスレノール 2,087 点, レミッチ 4,964 点と, 昨年のデータ (レグパラ 2,364 点, ホスレノール 1,875 点, レミッチ 4,937 点) と比較し, レグパラがわずかに減少した以外, ホスレノール, レミッチとも増加していた。

③ 請求合計に対する比率は, レグパラ 0.56%, ホスレノール 0.32%, レミッチ 0.08% といまだ大きくはないものの, 院内処方症例でのレグパラ等の使用比率 25.9% は昨年の 19.3% から大幅に増加しており, 今年の投薬料増加のかなりの部分を占めている計算となった。今後もこれらの高額薬剤の使用状況の推移に注目していく必要があると考えられた。

8 おわりに

——慢性透析医療費の推計と国民医療費に占める割合について

日本透析医会がレセプト調査を実施し今年で 14 回目となった（表 1）。この一部を図 1 に示すが、診療報酬改定のたびに 1 回当たりの透析単価は引き下げられてきていることがわかる。特に 2002 年の改定では 10% 弱の大幅な単価の引き下げが行われている。

この単価に、日本透析医学会が発表している同年末の透析患者数 × 156 回（1 年間の透析回数）を掛けた




図 1 1回あたり透析医療費と透析患者数の推移




図2 透析医療費の推移




図3 透析医療費の国民医療費に占める割合の推移

ものが図2である。これによると、2009年では、年間1兆3,000億円を超える医療費が維持透析に費やされていることとなる。

入院している患者にはより高額な医療費がかかっていると推察される。また約3%の患者が実施している腹膜透析は腹膜透析薬剤費が高額であるため、血液透析より1カ月あたりの医療費がかかることが知られており、透析関連としてはより多額な医療費が費やされていることとなる。

このように、透析医療費は増加を続けているが、全体の国民医療費も増加している。前述の推計した維持透析医療費を利用し、全体の国民医療費に占める割合を試算した結果が図3である。1997年には3.31%であったものが2008年には3.86%と増加している。しかし、2001年以降は、厳しい透析医療費の抑制と、

透析患者数の増加ペースの減少、および他の国民医療費の増加から、透析医療費の国民医療費に占める割合が一定になってきていることがわかる。

今後とも、透析医療費の増加に対して、医療財源の不足から厳しい対応が行われることが予想される。しかし、徐々に患者数の増加ペースが低下していることは、日本透析医学会の統計調査の最近の結果を見てみても明らかであり、全体の医療費に占める割合も低下していくことが予想される。透析医療費の一定以上の締め付けは、すでに限界に近付きつつある地方の小規模透析医療施設の経営に多大なダメージを与え、地域の透析医療供給体制を崩壊させる可能性もある。今後とも日本透析医会としては、様々なデータ分析を行い、適切な透析医療が供給できる医療制度、診療報酬の確保に努力していくつもりである。

表1 第1回～第14回調査までの集計結果

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
平成9年 1997年	平成10年 1998年	平成11年 1999年	平成12年 2000年	平成13年 2001年	平成14年 2002年	平成15年 2003年	平成16年 2004年	平成17年 2005年	平成18年 2006年	平成19年 2007年	平成20年 2008年	平成21年 2009年	平成22年 2010年	
施設数(施設)	34	99	125	128	132	149	182	179	190	185	184	199	200	208
総数(人)	3,779	3,603	4,519	4,748	5,058	5,274	8,633	8,388	9,078	8,821	9,265	9,903	10,447	10,693
病院(人)	1,861	1,636	2,039	2,583	2,719	2,670	4,328	3,913	4,053	3,980	3,941	4,273	4,602	4,822
診療所(人)	1,918	1,967	2,480	2,165	2,339	2,604	4,305	4,475	5,025	4,841	5,324	5,630	5,845	5,871
透析回数(回)	12.5	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
平均年齢(歳)	57.1	56.4	56.9	57.8	58.4	62.6	59.4	60.2	60.8	61.4	62.1	62.4	62.9	63.4
透析歴(年)	8.5	8.9	8.7	9.0	9.0	7.8	8.96	9.01	9.1	9.03	9.2	9.3	9.3	9.2
管理指導料(点)	2,593.2	3,019.4	3,025.8	2,920.6	2,921.3	2,813.6	2,832.3	2,635.1	2,638.6	2,510.1	2,525.1	2,529.2	2,535.6	2,534.8
在宅(%)	7.8	6.1	6.3	7.3	7.6	10.5	8.4	9.3	9.3	9.5	10.5	11.1	11.7	12.5
注射(点)	4,633.5	4,419.8	4,186.1	4,198.1	4,697.3	4,432.3	4,637.7	4,452.5	4,602.1	1,291.8	1,363.7	1,420.0	1,481.4	1,467.6
投薬(点)	1,628.1	1,815.0	1,684.3	1,755.5	1,803.1	1,743.4	1,802.6	2,001.7	2,131.4	2,030.9	2,108.1	2,292.0	2,762.8	2,887.5
EPO(%)	72.7	78.1	78.7	79.6	81.9	83.2	82.3	83	83.97	—	—	—	—	—
夜間加算(%)	29.5	30.6	31.1	30.3	29.0	17.9	30.2	29.6	28.9	28.5	28.1	27.4	26.8	26.2
障害者加算(%)	25.9	19.0	17.6	20.8	21.3	24.3	20.8	21.2	20.9	22.1	22.4	22.9	23.9	23.9
検査(点)	533.9	600.9	665.3	575.1	608.0	528.5	524.1	506.3	481.2	356.5	356.9	311.5	329.7	315.7
画像診断(点)	365.8	158.9	161.2	217.7	208.0	212	228.6	218.1	208.1	186	174.3	176.1	201.6	215.2
透析食(点)	—	817.9	818	818.7	817.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
院外処方(%)	19.5	13.3	26.5	27.7	25.6	32.8	33.8	37.6	37.2	44.8	44.7	45.6	48.2	47.4
除夜障害手術(点)	43,124.7	43,525.7	43,095.5	42,303.5	42,971.6	39,286.1	39,604.8	38,795.9	38,971.1	38,362.1	38,498.3	38,162.6	38,534.1	38,330.4
透析医療費(除夜障害手術/1回)	3,317.3	3,348.1	3,315.0	3,254.1	3,305.5	3,022.0	3,046.5	2,984.3	2,999.8	2,950.9	2,961.4	2,935.6	2,964.2	2,948.5
請求合計(点)	45,338.0	45,700.5	45,242.9	44,540.6	45,137.6	40,755.3	41,824.9	41,014.3	41,160.8	39,843.1	39,976.7	39,659.0	40,054.4	39,835.2
透析医療費(請求合計)/1回	3,487.5	3,515.4	3,480.2	3,426.2	3,472.1	3,135.0	3,217.3	3,154.9	3,166.2	3,064.9	3,075.1	3,050.7	3,081.1	3,064.2
I型(%)	—	—	96.9	98.2	98.7	99.0	98.99	99.60	98.49	—	—	—	—	—
IV型(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.57	72.8	81.2	79.5	76.7

表2 病院・診療所全体の集計結果

	年齢	透析歴	再診計	13:指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	10,678	10,670	10,693	10,693	2,682	209	2,944
合計	677,196	98,169.32	9,828,308	27,104,494	348,920	16,720	1,316,925
平均	63.41974152	9.200498594	919.1347611	2534.788553	130.0969426	80	447.3250679
標準偏差	12.57957985	7.857515719	44.90167044	243.4992118	3.54934286	0	24.39070576
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14:在宅	25:処方	20:投薬	うちレグパラほか
標本数	751	265	5,036	1,340	5,924	5,954	1,540
合計	218,883	42,804	512,877	2,488,255	1,268,575	17,192,467	4,108,443
平均	291.4553928	161.5245283	101.8421366	1856.906716	214.1416273	2887.549043	2667.82013
標準偏差	19.18521152	30.54914636	139.8148027	1277.830408	115.7400213	2157.570814	1689.925311
	30:注射	うちVD3	40:処置	うち4時間未満	うち4~5時間	うち5時間以上	うちダイア計
標本数	7,050	3,594	10,693	1,615	8,789	1,526	10,693
合計	10,346,478	6,539,038	351,655,091.00	30,707,050.00	241,355,415.00	38,545,680	25,242,832
平均	1467.585532	1819.431831	32886.47629	19013.65325	27461.07805	25259.29227	2360.687553
標準偏差	1819.562944	815.5434452	2067.364915	10527.0645	5249.6605	9460.444631	528.3356186
	III型 1.5m ² 未満	III型 1.5m ² 以上	うちIII型(157)	うちIII型(157)	うちIV型(177)	うちIV型(180)	うちV型(189)
標本数	75	73	72	183	1,399	6,798	131
合計	130,548	122,110	105,399	357,266	3,061,584	15,257,264	279,767
平均	1740.64	1672.739726	1463.875	1952.273224	2188.408863	2244.375405	2135.625954
標準偏差	233.4600284	260.7161626	715.2467109	82.30866386	211.5554969	245.1318633	461.8195508
	うちV型(202)	うち特定積層型	夜間	障害	50:手術	手術・麻酔	うち輸血
標本数	2,153	98	2,805	2,559	5,015	152	39
合計	5,183,874	743,314.00	9,943,800	3,956,520.00	2,190,241	636,816	168,120
平均	2407.744542	7584.836735	3545.026738	1546.119578	436.737986	4189.578947	4310.769231
標準偏差	400.3175038	988.7740581	886.4133606	125.9903185	2447.605921	5067.451402	3316.05792
	うちベンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60:検査	うち生体	うち検体
標本数	2,954	54	31	2,045	6,566	2,559	5,594
合計	367,945	904,762	459,517	290,235	2,072,900	1,373,814	696,473
平均	124.5582261	16754.85185	14823.12903	141.9242054	315.7021017	536.855803	124.5035753
標準偏差	36.58845025	8857.577752	6471.028789	1035.425556	453.7177974	539.1018948	149.8777477
	70:画像	うち胸部	うち胸部ほか	80:その他	院外処方	請求合計	除夜間
標本数	8,078	7,829	1,132	5,127	5,066	10,693	10,693
合計	1,738,220	361,972	1,400,726.00	1,594,092	1,363,666	425,957,948	416,014,148
平均	215.1794999	46.23476817	1237.390459	310.9210064	269.1800237	39835.21444	38905.27897
標準偏差	574.5929462	53.50048889	1033.700057	383.0517139	172.5317601	4157.201303	3867.441314
	除障害	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標本数	10,693	10,693	10,693	10,693	10,693	10,693	10,693
合計	422,001,428	412,057,628	423,767,707	413,823,907	419,811,187	409,867,387	407,379,132
平均	39465.20415	38535.26868	39630.38502	38700.44955	39260.37473	38330.43926	38097.73983
標準偏差	4074.663167	3735.769802	3845.77765	3508.827024	3765.034357	3372.782457	3268.692286

表 3-1 病院・診療所別集計結果表 —病院1・病院2・診療所—

	年齢	透析歴	再診計	13:指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
病院1	標本数	3,616	3,615	3,617	3,617	666	90
	平均	63.53042035	9.153098202	903.1166713	2464.954382	130.1951952	80
	標準偏差	12.65239773	7.963927895	32.34840737	178.7789703	5.037397679	0
病院2	標本数	1,192	1,200	1,205	1,205	372	62
	平均	64.29697987	8.242291667	915.0356846	2401.709544	130	80
	標準偏差	12.62169541	7.212803658	32.59921561	151.3957772	0	0
診療所	標本数	5,870	5,855	5,871	5,871	1,644	57
	平均	63.17342419	9.426152007	929.8444899	2605.125873	130.0790754	80
	標準偏差	12.51911099	7.90390728	50.3340477	268.3637085	3.206213554	0
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14:在宅	25:処方	20:投薬	うちレグバラほか
病院1	標本数	751	265	1,947	500	2,264	2,280
	平均	291.4553928	161.5245283	90.47663071	1944.142	214.9381625	2621.066129
	標準偏差	19.18521152	30.54914636	129.119406	1402.732096	113.5460828	1635.052229
病院2	標本数	0	0	491	164	496	498
	平均	#DIV/0!	#DIV/0!	73.75763747	1731.493902	148.891129	2456.813253
	標準偏差	#DIV/0!	#DIV/0!	119.5426161	1234.873862	112.6133469	2364.810746
診療所	標本数	0	0	2,598	676	3,164	3,176
	平均	#DIV/0!	#DIV/0!	115.6674365	1822.809172	223.8005689	3010.687028
	標準偏差	#DIV/0!	#DIV/0!	149.2427951	1185.589143	114.5182671	2169.362342
	30:注射	うちVD3	40:処置	うち4時間未満	うち4~5時間	うち5時間以上	うちダイア計
病院1	標本数	2,502	1,317	3,617	584	3,006	477
	平均	1556.158673	1830.252847	32932.08184	18522.21747	27341.20259	2345.707769
	標準偏差	1958.002588	778.9579543	2031.157631	10685.97922	5446.836116	9365.924157
病院2	標本数	774	392	1,205	158	1,001	137
	平均	1375.574935	1794.47449	32651.38755	20579.27215	28083.74625	26294.89051
	標準偏差	1540.439459	1012.336322	1886.944045	10138.27418	4255.879016	9365.528008
診療所	標本数	3,774	1,885	5,871	873	4,782	912
	平均	1427.735559	1817.061538	32906.63073	19059.04926	27406.09159	25194.24342
	標準偏差	1774.690123	794.79203	2121.360226	10471.77514	5303.530062	9524.27641
	III型 1.5m ² 未満	III型 1.5m ² 以上	うちIII型(157)	うちIII型(157)	うちIV型(177)	うちIV型(180)	うちV型(189)
病院1	標本数	23	26	25	112	496	2,118
	平均	1650	1627.653846	1893.36	1952.214286	2198.522177	2237.809254
	標準偏差	386.9333981	384.7037242	88.2	77.74993741	180.386878	250.1843656
病院2	標本数	7	5	1	4	138	909
	平均	1794	1729	1911	1963	2180.869565	2261.667767
	標準偏差	0	29.06888371	#DIV/0!	0	228.0316544	193.8617055
診療所	標本数	45	42	46	67	765	3,771
	平均	1778.666667	1693.952381	1220.73913	1951.731343	2183.211765	2243.894988
	標準偏差	102.859127	164.0322622	797.2825913	92.23793049	226.6835493	253.0622586

表3-2 病院・診療所別集計結果表 一病院1・病院2・診療所—

	うちV型(202)	うち特定積層型	夜間	障害	50:手術	手術・麻酔	うち輸血
病院1	標本数 平均 標準偏差	836 2380.677033 461.3092495	23 7332 1594.617423	985 3510.152284 927.6568508	1,001 1543.576424 141.3888129	1,769 539.5449406 2723.850083	69 3797.869565 4000.804323
	標本数 平均 標準偏差	147 2407.183673 366.6542364	9 7774 0	265 3534.339623 927.8467853	277 1558.700361 16.09889387	627 546.8995215 3301.61386	24 5212.625 6616.717496
	標本数 平均 標準偏差	1,170 2427.155556 353.9979335	66 7647.151515 752.882139	1,555 3568.938907 851.6052482	1,281 1545.386417 126.5257932	2,619 340.9240168 1958.91321	59 4231.525424 5487.17831
病院2	うちペンレス	うちP.T.A	うちシャント	うちその他	60:検査	うち生体	うち検体
	標本数 平均 標準偏差	1,182 122.2690355 23.00731479	26 16655.5 8857.678139	15 12277.13333 4003.853838	581 209.2030981 1470.230232	2,371 372.8958245 521.4489709	984 618.097561 601.6978036
	標本数 平均 標準偏差	331 125.4561934 17.51917692	7 21946.14286 13028.80513	4 22117.5 12282.84195	294 103.9659864 127.6712349	776 351.935567 511.7897764	382 544.0104712 585.8346402
診療所	うちペンレス	うちP.T.A	うちシャント	うちその他	60:検査	うち生体	うち検体
	標本数 平均 標準偏差	1,441 126.2297016 47.26041162	21 15147.42857 6837.693124	12 15574.16667 4883.724898	1,170 118.0529915 891.5409669	3,419 267.8157356 377.635429	1,193 467.5557418 452.940205
	うちP.T.A	うち胸部	うち胸部ほか	院外処方	請求合計	除夜間	
病院1	70:画像	うち胸部	うち胸部ほか	院外処方	請求合計	除夜間	
	標本数 平均 標準偏差	2,671 332.6630475 729.3915783	2,540 45.56889764 74.03463243	580 1356.313793 1025.668484	1,498 380.2089453 557.191388	1,459 282.7607951 206.2610807	3,617 40302.81145 4347.991744
	標本数 平均 標準偏差	1,063 365.9341486 790.9820122	1,037 68.95949855 32.81062279	201 1615.552239 1154.485603	807 220.9392813 372.497263	798 178.2932331 137.7661056	1,205 39065.96432 4234.537801
病院2	うちペンレス	うち胸部	うち胸部ほか	院外処方	請求合計	除夜間	
	標本数 平均 標準偏差	4,344 106.0517956 328.6203212	4,252 41.09031044 39.77427288	351 824.3247863 821.1580202	2,822 299.8727853 239.2405547	2,809 287.9458882 153.0384564	5,871 39705.02334 3985.264346
	うちP.T.A	うち胸部ほか	院外処方	請求合計	除夜間		
診療所	70:画像	うち胸部	うち胸部ほか	院外処方	請求合計	除夜間	
	標本数 平均 標準偏差	3,617 39875.6287 4270.533028	3,617 38919.72602 3942.529987	3,617 40038.93116 4034.584989	3,617 39083.02848 3714.002942	3,617 39611.74841 3954.088611	3,617 38655.84573 3572.483267
	うちP.T.A	うち胸部ほか	院外処方	請求合計	除夜間		
病院1	うちP.T.A	うち胸部ほか	院外処方	請求合計	除夜間		
	標本数 平均 標準偏差	1,205 38707.65726 4183.365976	1,205 37930.39585 3916.99619	1,205 38781.39502 3519.770142	1,205 38004.13361 3215.136448	1,205 38423.08797 3451.807814	1,205 37645.82656 3077.782034
	うちP.T.A	うち胸部ほか	院外処方	請求合計	除夜間		
病院2	うちP.T.A	うち胸部ほか	院外処方	請求合計	除夜間		
	標本数 平均 標準偏差	5,871 39367.83376 3896.974729	5,871 38422.56038 3538.278588	5,871 39552.94021 3756.887547	5,871 38607.66684 3407.326645	5,871 39215.75064 3677.365721	5,871 38270.47726 3278.779253
	うちP.T.A	うち胸部ほか	院外処方	請求合計	除夜間		
診療所	うちP.T.A	うち胸部ほか	院外処方	請求合計	除夜間		
	標本数 平均 標準偏差	5,871 39367.83376 3896.974729	5,871 38422.56038 3538.278588	5,871 39552.94021 3756.887547	5,871 38607.66684 3407.326645	5,871 39215.75064 3677.365721	5,871 38270.47726 3278.779253
	うちP.T.A	うち胸部ほか	院外処方	請求合計	除夜間		

表4 病院・診療所別集計結果表 —病院1・病院2・診療所— TTEST=P 値

	年齢	透析歴	再診計	13:指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
病院1 病院2	0.069568525	0.000448311	4.44771E-28	5.73935E-28	0.455107218	#DIV/0!	#DIV/0!
病院1 診療所	0.179162834	0.103451163	1.2129E-171	5.3388E-164	0.50870222	#DIV/0!	0.249769339
病院2 診療所	0.004799873	1.65662E-06	1.57286E-22	3.2742E-137	0.634414612	#DIV/0!	0.382001459
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14:在宅	25:処方	20:投薬	うちレグバラほか
病院1 病院2	#DIV/0!	#DIV/0!	0.009332678	0.083499017	3.84489E-31	0.000817667	0.643310765
病院1 診療所	#DIV/0!	#DIV/0!	2.69311E-09	0.108974641	0.004800257	0.00061164	0.294942239
病院2 診療所	#DIV/0!	#DIV/0!	4.64718E-09	0.380398245	5.4286E-41	1.77855E-07	0.361484026
	30:注射	うちVD3	40:処置	うち4時間未満	うち4~5時間	うち5時間以上	うちダイア計
病院1 病院2	0.01880228	0.458243062	0.397979491	0.037379186	0.000444341	0.741679184	0.884805568
病院1 診療所	0.007106408	0.641294822	6.49663E-29	0.154441476	0.009457012	0.737172836	0.053638023
病院2 診療所	0.446699339	0.626600658	1.80996E-10	0.19413911	0.032544378	0.888943494	0.269023337
	III型 1.5m ² 未満	III型 1.5m ² 以上	うちIII型(157)	うちIII型(157)	うちIV型(177)	うちIV型(180)	うちV型(189)
病院1 病院2	0.336725713	0.683159682	#DIV/0!	0.45364739	0.322205071	0.067763293	0.644344849
病院1 診療所	0.000421902	0.00046304	0.002503636	4.04316E-10	0.465692308	9.23145E-24	0.002223892
病院2 診療所	0.262227355	0.12615342	#DIV/0!	0.259416184	0.526433286	9.76269E-17	0.228936023
	うちV型(202)	うち特定積層型	夜間	障害	50:手術	手術・麻酔	うち輸血
病院1 病院2	0.083904594	0.006528109	0.706413973	0.075871341	0.956280487	0.216655651	0.996249037
病院1 診療所	6.46584E-16	0.016717837	0.101760892	0.74748718	0.005001275	0.607033617	0.393549454
病院2 診療所	8.43262E-07	0.159116002	0.546451109	0.080689094	0.042281236	0.489007031	0.440116171
	うちベンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60:検査	うち生体	うち検体
病院1 病院2	0.019545863	0.214502918	0.013080287	0.221040882	0.328965557	0.039824524	3.13867E-05
病院1 診療所	0.008430899	0.524985239	0.065131752	0.108106381	7.94702E-19	3.61242E-11	0.009762211
病院2 診療所	0.769460237	0.083942674	0.135079157	0.78707264	1.94414E-07	0.00783549	0.00841961
	70:画像	うち胸部	うち胸部ほか	80:その他	院外処方	請求合計	除夜間
病院1 病院2	0.219724129	2.40003E-22	0.00290254	4.25369E-13	2.09182E-36	9.94558E-18	5.75341E-15
病院1 診療所	4.99171E-69	0.001205028	5.47319E-16	4.6386E-11	0.353288441	7.72923E-12	4.42444E-13
病院2 診療所	2.72144E-60	3.13048E-93	2.05757E-19	7.10758E-13	3.13083E-71	5.41552E-07	6.69526E-05
	除障害	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
病院1 病院2	1.79798E-16	4.92496E-14	6.79381E-22	2.6527E-19	1.74372E-20	2.09286E-18	2.02353E-18
病院1 診療所	2.92765E-09	2.09706E-10	2.80108E-09	1.90843E-10	7.57674E-07	7.96845E-08	2.84014E-06
病院2 診療所	1.27055E-07	1.6095E-05	5.67367E-11	1.63145E-08	6.245E-12	1.21958E-09	6.26483E-11

表5-1 男女別集計結果表 —病院・診療所計— 男性/女性

	年齢	透析歴	再診計	13:指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
男性	標本数	6,963	6,953	6,963	6,963	1,784	128
	平均	62.63090622	8.939024881	919.0916272	2535.199339	130.1457399	80
	標準偏差	12.42262712	7.826402004	43.99726354	244.1205767	4.351501158	0
女性	標本数	3,715	3,702	3,715	3,715	896	73
	平均	64.89825034	9.70967315	919.2454913	2534.250875	130	80
	標準偏差	12.73935657	7.898933639	46.63560234	242.6991941	0	0
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14:在宅	25:処方	20:投薬	うちレグバラほか
男性	標本数	500	190	3,322	908	3,909	3,927
	平均	291.06	163.0105263	101.46177	1884.592511	211.6456894	2941.491215
	標準偏差	20.60061092	28.97818729	140.2991123	1293.669348	116.1578249	2216.235631
女性	標本数	250	75	1,699	430	2,000	2,012
	平均	292.236	157.76	102.6668629	1799.862791	219.046	2788.256461
	標準偏差	16.03824195	34.12728163	139.2391691	1246.065271	115.1556612	2040.907254
	30:注射	うちVD3	40:処置	うち4時間未満	うち4~5時間	うち5時間以上	うちダイア計
男性	標本数	4,537	2,340	6,963	974	5,729	1,100
	平均	1533.244875	1841.331624	33213.70358	18514.32238	27386.06476	25122
	標準偏差	1902.059368	797.7192088	2176.434254	10673.66623	5341.371827	9472.988763
女性	標本数	2,506	1,253	3,715	641	3,045	426
	平均	1351.899042	1778.440543	32277.83445	19772.3869	27594.35961	25613.80282
	標準偏差	1655.11141	846.9388757	1687.188322	10262.11413	5082.828971	9429.829546
	III型 1.5m ² 未満	III型 1.5m ² 以上	うちIII型(157)	うちIII型(157)	うちIV型(177)	うちIV型(180)	うちV型(189)
男性	標本数	40	51	22	133	500	4,709
	平均	1711.2	1680.039216	1543.5	1949.37594	2176.488	2250.923763
	標準偏差	299.4215963	220.8509869	693.583088	95.60680221	261.2824811	223.3063671
女性	標本数	35	22	50	50	898	2,077
	平均	1774.285714	1655.818182	1428.84	1959.98	2195.007795	2230.802118
	標準偏差	116.6312872	341.3052867	728.6969741	21.35462479	177.9079307	284.2651443

表 5-2 男女別集計結果表 —病院・診療所計— 男性/女性

	うちV型(202)	うち特定積層型	夜間	障害	50:手術	手術・麻酔	うち輸血
男性	標本数 平均 標準偏差	1,577 2413.497781 395.8814125	56 7539.071429 1097.803226	2,370 3577.974684 834.7887251	1,633 1544.568279 131.6075211	3,172 430.184111 2332.740602	95 4446.915789 5120.595103
							23 4776.869565 3905.565194
女性	標本数 平均 標準偏差	572 2393.797203 410.309303	42 7645.857143 830.4606295	435 3365.517241 1111.00772	923 1548.819068 115.6243674	1,829 450.4013122 2644.140803	56 3826.232143 5013.293844
							16 3640.75 2161.818756
	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60:検査	うち生体	うち検体
男性	標本数 平均 標準偏差	1,905 125.6367454 42.23226735	35 16918.68571 7401.850042	18 13234.11111 3290.444184	1,251 149.1302958 1121.337397	4,368 311.6641484 460.5287923	1,633 544.7140233 557.9093555
							3,791 123.8491163 149.5287582
女性	標本数 平均 標準偏差	1,035 122.6057971 22.84924873	19 16453.05263 11286.0857	13 17023.30769 8961.897096	792 130.6439394 884.9547887	2,185 324.1153318 439.6782076	921 522.5863192 503.6539243
							1,790 126.5899441 150.9438815
	70:画像	うち胸部	うち胸部ほか	80:その他	院外処方	請求合計	除夜間
男性	標本数 平均 標準偏差	5,273 217.035274 578.9631298	5,096 45.15384615 41.92574253	733 1260.611187 1029.511449	3,299 300.1715671 365.5228355	3,263 262.8939626 168.4138807	6,963 40241.67629 4218.91917
							6,963 39023.83915 3891.504432
女性	標本数 平均 標準偏差	2,791 206.5299176 560.5670981	2,719 48.20522251 70.29879854	389 1181.383033 1051.239183	1,828 330.3205689 412.2017113	1,803 280.5562951 179.232172	3,715 39076.44092 3935.959482
							3,715 38682.36285 3819.341478
	除障害	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
男性	標本数 平均 標準偏差	6,963 39879.43588 4143.626806	6,963 38661.59874 3756.808876	6,963 40045.70559 3972.672006	6,963 38827.86845 3598.455802	6,963 39683.46517 3901.609749	6,963 38465.62803 3462.479164
							6,963 38219.87046 3357.661193
女性	標本数 平均 標準偏差	3,715 38691.63338 3832.086507	3,715 38297.55532 3691.757967	3,715 38854.69556 3472.59853	3,715 38460.6175 3327.859802	3,715 38469.88802 3362.557676	3,715 38075.80996 3189.216526
							3,715 37867.48129 3088.658132

表6-1 年齢別集計結果表 一病院・診療所計

		年齢	透析歴	再診計	13:指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
40歳未満	標本数	423	422	423	423	101	6	116
	平均	33.80851064	7.688151659	918.5768322	2514.06383	130	80	448.0603448
	標準偏差	4.760991116	5.771494568	29.48793845	234.3388161	0	0	20.89072554
40~64歳	標本数	5,205	5,198	5,205	5,205	1,309	85	1,390
	平均	55.61210375	10.26338015	919.6972142	2525.658982	130.0993125	80	447.7338129
	標準偏差	6.445655239	8.340446195	48.46504959	239.4717298	3.593134953	0	22.47487215
65~69歳	標本数	1,592	1,587	1,592	1,592	441	37	456
	平均	67.06218593	9.946099559	920.1300251	2544.00691	130	80	447.0394737
	標準偏差	1.371076734	8.157573345	46.50976043	249.5568731	0	0	25.66706914
70歳以上	標本数	3,458	3,448	3,458	3,458	829	73	982
	平均	77.11711972	7.45949536	917.9303065	2547.071139	130.1568154	80	446.7922607
	標準偏差	5.451327394	6.790077709	39.93754961	247.4649863	4.515086626	0	26.6866443
75歳以上	標本数	2,127	2,120	2,127	2,127	483	41	595
	平均	80.37470616	6.54145283	917.8824636	2545.458862	130	80	445.8403361
	標準偏差	4.414887539	5.914131472	40.62541767	244.2318098	0	0	30.33427216
		特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14:在宅	25:処方	20:投薬	うちレグバラほか
40歳未満	標本数	30	12	180	20	244	246	85
	平均	294	159.5	67.30555556	1668.35	200.8688525	3398.280488	2980.929412
	標準偏差	0	33.86470407	111.0401859	1302.967434	101.3183428	2601.315308	1866.426531
40~64歳	標本数	361	109	2,418	640	2,932	2,948	914
	平均	292.37119111	163.6238532	93.34119107	1821.198438	210.1350614	3109.312415	2771.198031
	標準偏差	15.40907564	28.32705453	137.7543753	1019.377815	116.3315837	2277.670943	1749.931375
65~69歳	標本数	102	45	795	219	891	892	220
	平均	292.5588235	154.6666667	100.072956	1883.917808	223.1425365	2826.028027	2405.963636
	標準偏差	14.55516888	36.57806099	134.2324189	1409.035724	118.9875307	1894.291494	1485.311571
70歳以上	標本数	257	99	1,628	459	1,842	1,853	320
	平均	289.4241245	162.5757576	119.235258	1903.352941	217.951683	2503.055046	2476.471875
	標準偏差	25.57852267	29.53313287	146.7283759	1517.280319	115.0316696	1952.606509	1557.188409
75歳以上	標本数	174	68	1,008	264	1,123	1,129	162
	平均	287.2413793	165.0441176	117.9642857	1882.204545	218.3143366	2348.899026	2416.765432
	標準偏差	30.87583394	26.63430277	143.259581	1638.841317	114.9404327	1890.511002	1659.857988
		30:注射	うちVD3	40:処置	うち4時間未満	うち4~5時間	うち5時間以上	うちダイア計
40歳未満	標本数	293	197	423	50	339	104	423
	平均	1539.211604	2065.35533	33799.89835	16641.5	26674.95575	23973.46154	2374.48227
	標準偏差	1358.243155	922.6185647	2176.493525	11166.27188	6225.624318	10105.41206	472.7524116
40~64歳	標本数	3,441	1,922	5,205	651	4,312	927	5,205
	平均	1421.654461	1887.072841	33478.4073	16309.94624	27225.84532	25752.97735	2362.59366
	標準偏差	1647.296444	875.9646848	2168.085649	11041.91577	5602.935274	8952.624311	413.2491133
65~69歳	標本数	1,029	526	1,592	203	1,343	193	1,592
	平均	1563.574344	1693.570342	32565.28769	19349.63054	27821.83917	25480.56995	2352.029523
	標準偏差	2002.680433	661.9685029	1826.005479	10558.82903	4742.388651	9501.672725	468.1547
70歳以上	標本数	2,280	948	3,458	711	2,780	302	3,458
	平均	1487.882018	1700.901899	32036.65934	21560.09142	27738.92266	24045.29801	2360.222094
	標準偏差	2021.182331	709.3170116	1619.600494	9292.405613	4749.778514	10559.79464	691.3782375
75歳以上	標本数	2,280	948	3,458	711	2,780	302	3,458
	平均	1487.882018	1700.901899	32036.65934	21560.09142	27738.92266	24045.29801	2360.222094
	標準偏差	2021.182331	709.3170116	1619.600494	9292.405613	4749.778514	10559.79464	691.3782375
		III型 1.5m ² 未満	III型 1.5m ² 以上	うちIII型(157)	うちIII型(157)	うちIV型(177)	うちIV型(180)	うちV型(189)
40歳未満	標本数	0	0	1	11	24	279	8
	平均	#DIV/0!	#DIV/0!	1911	1963	2208.75	2219.870968	1921.5
	標準偏差	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	69.81045767	319.8581259	744.9567581
40~64歳	標本数	12	17	15	96	364	3,414	38
	平均	1529.5	1723.647059	1479.8	1959.854167	2175.082418	2244.695958	2161.236842
	標準偏差	497.4210764	21.58686284	740.1618742	30.82274593	264.3363619	243.1340506	451.0768158
65~69歳	標本数	2	8	8	27	191	1,069	11
	平均	1794	1570	1506.75	1963	2203.303665	2260.011225	2279.181818
	標準偏差	0	412.9503602	748.5255507	0	161.4955497	190.1753573	331.0594563
70歳以上	標本数	61	48	48	49	819	2,024	74
	平均	1780.42623	1671.833333	1442.4375	1929.102041	2190.21978	2240.26087	2124.283784
	標準偏差	106.0145366	275.3859445	721.8438243	151.832315	197.8369412	257.1940669	447.0448637
75歳以上	標本数	61	48	48	49	819	2,024	74
	平均	1780.42623	1671.833333	1442.4375	1929.102041	2190.21978	2240.26087	2124.283784
	標準偏差	106.0145366	275.3859445	721.8438243	151.832315	197.8369412	257.1940669	447.0448637

表 6-2 年齢別集計結果表 —病院・診療所計—

		うちV型(202)	うち特定積層型	夜間	障害	50:手術	手術・麻酔	うち輸血
40歳未満	標本数	112	3	220	43	188	2	1
	平均	2409.410714	7774	3605.454545	1560	187.4414894	2379	5075
	標準偏差	384.1695983	0	786.1630263	0	793.8232617	1062.074385	#DIV/0!
40~64歳	標本数	1,356	30	2,126	1,061	2,298	56	15
	平均	2420.851032	7255.733333	3566.980245	1541.451461	399.727154	4534.928571	4784.8
	標準偏差	376.459684	1674.792729	843.9297471	139.9938164	2458.269825	5528.994174	3127.744354
65~69歳	標本数	296	11	259	438	773	23	5
	平均	2418.445946	7774	3514.285714	1541.09589	381.9805951	3689	3671.6
	標準偏差	377.6121817	0	945.8951358	157.0106467	2136.048073	4691.337627	3770.830121
70歳以上	標本数	385	54	200	1,014	1,742	70	18
	平均	2355.714286	7718.62963	3285	1552.544379	539.1762342	4188.071429	4050.833333
	標準偏差	488.1365838	406.8874628	1243.950184	94.11318039	2677.34712	4927.117064	3571.191814
		うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60:検査	うち生体	うち検体
40歳未満	標本数	119	1	0	72	226	86	188
	平均	119.9915966	9767	#DIV/0!	85.52777778	275.8274336	478.0116279	113.7074468
	標準偏差	29.79235933	#DIV/0!	#DIV/0!	21.10802012	404.7189877	487.5245875	114.0879413
40~64歳	標本数	1,381	21	8	911	3,073	1,103	2,653
	平均	124.204924	19530.19048	15051.125	158.5708013	307.2632607	552.6264733	126.0324161
	標準偏差	20.51402854	10311.45236	4641.173603	1298.297736	443.8787108	541.4100533	148.5951194
65~69歳	標本数	466	6	7	303	1,027	395	885
	平均	129.3562232	10755.66667	16853.85714	112.3168317	335.4264849	576.0025316	130.7039548
	標準偏差	77.53709992	3420.266695	10879.69266	287.018457	490.7141166	574.1160166	172.4956503
70歳以上	標本数	974	26	16	757	2,227	970	1,855
	平均	123.3562628	16166.42308	13820.6875	139.2126816	322.6317916	507.8793814	121.128841
	標準偏差	21.41124218	7842.616024	4829.600449	914.2047696	453.7661806	524.4869968	143.4137545
		70:画像	うち胸部	うち胸部ほか	80:その他	院外処方	請求合計	除夜間
40歳未満	標本数	315	303	36	192	191	423	423
	平均	176.9746032	44.15181518	1170.694444	282.234375	266.0157068	40844.71395	38969.53664
	標準偏差	458.7339119	25.85575221	766.8644067	278.4426065	235.4226988	4014.894802	3535.510596
40~64歳	標本数	3,893	3,764	515	2,446	2,430	5,205	5,205
	平均	202.4022605	44.67879915	1224.576699	289.7089125	267.1868313	40456.31201	38999.36676
	標準偏差	562.1406807	42.29024356	1070.024877	306.8750035	159.2431916	4110.115533	3762.965304
65~69歳	標本数	1,224	1,183	175	761	747	1,592	1,592
	平均	221.1535948	46.78275571	1261.131429	331.6662286	285.1218206	39595.15138	39023.41771
	標準偏差	576.6114404	56.87760457	1017.786764	404.0599441	224.9404804	4010.126754	3859.101959
70歳以上	標本数	2,632	2,565	396	1,728	1,698	3,458	3,458
	平均	230.4183131	48.45263158	1237.590909	334.9982639	265.3751472	38890.65095	38700.65674
	標準偏差	597.6571847	67.33549172	1026.929835	469.3270269	154.8138884	4125.226011	4061.253443
75歳以上	標本数	1,605	1,567	243	1,067	1,049	2,127	2,127
	平均	221.6523364	48.46266752	1168.934156	338.4076851	260.8703527	38593.14951	38498.65021
	標準偏差	544.8997483	63.32039375	866.0086246	486.0424433	147.6246154	3900.475824	3869.241086
		除障害	除夜間障害	除手術	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
40歳未満	標本数	423	423	423	423	423	423	423
	平均	40686.13239	38810.95508	40761.40662	38886.22931	40602.82506	38727.64775	38648.76596
	標準偏差	4017.351691	3511.312979	3996.862328	3493.502024	3998.100555	3467.593587	3432.53242
40~64歳	標本数	5,205	5,205	5,205	5,205	5,205	5,205	5,205
	平均	40142.09875	38685.15351	40279.83305	38822.8878	39965.61979	38508.67454	38284.74236
	標準偏差	4039.820525	3637.049411	3880.266516	3496.894267	3810.89001	3366.868622	3276.292091
65~69歳	標本数	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592
	平均	39171.15641	38599.42274	39409.67965	38837.94598	38985.68467	38413.95101	38154.79397
	標準偏差	3888.549853	3705.852329	3702.06635	3518.097113	3576.175506	3355.847651	3251.555665
70歳以上	標本数	3,458	3,458	3,458	3,458	3,458	3,458	3,458
	平均	38435.39358	38245.39936	38619.03586	38429.04164	38163.77848	37973.78427	37721.14141
	標準偏差	3984.141838	3910.346378	3601.779714	3516.670176	3453.944668	3356.340046	3216.292341
75歳以上	標本数	2,127	2,127	2,127	2,127	2,127	2,127	2,127
	平均	38139.2708	38044.77151	38381.441	38286.9417	37927.56229	37833.063	37599.44664
	標準偏差	3751.781331	3713.437839	3520.250737	3481.32401	3363.77978	3316.460239	3173.779803

表7 病院・診療所別集計結果表 —レグパラ他—

病院・診療所計

	うちレグパラほか	レグパラ	ホスレノール	レミッチ
標本数	1,540	1,073	662	67
合計	4,108,443	2,393,900	1,381,938	332,605
平均	2667.82013	2231.034483	2087.519637	4964.253731
標準偏差	1689.925311	1177.835131	1049.607586	1637.941043

病院1・2計

	うちレグパラほか	レグパラ	ホスレノール	レミッチ
標本数	702	482	303	31
合計	1,832,785	1,035,057	631,100	166,628
平均	2610.804843	2147.421162	2082.838284	5375.096774
標準偏差	1612.784414	1035.88683	922.1412906	1657.463169

病院1

	うちレグパラほか	レグパラ	ホスレノール	レミッチ
標本数	620	421	283	29
合計	1,625,061	882,772	583,081	159,208
平均	2621.066129	2096.845606	2060.35689	5489.931034
標準偏差	1635.052229	938.9203589	903.7946892	1621.90155

病院2

	うちレグパラほか	レグパラ	ホスレノール	レミッチ
標本数	82	61	20	2
合計	207,724	152,285	48,019	7,420
平均	2533.219512	2496.47541	2400.95	3710
標準偏差	1440.000412	1513.128917	1130.600189	1682.914139

診療所

	うちレグパラほか	レグパラ	ホスレノール	レミッチ
標本数	838	591	359	36
合計	2,275,658	1,358,843	750,838	165,977
平均	2715.582339	2299.226734	2091.470752	4610.472222
標準偏差	1751.464016	1278.850302	1147.4913	1557.60137

—TTEST=P値—

	うちレグパラほか	レグパラ	ホスレノール	レミッチ
病院1 病院2 P値	0.643310765	0.004753639	0.110545318	0.144648772
病院1 診療所 P値	0.294942239	0.005885169	0.708684052	0.029910068
病院2 診療所 P値	0.361484026	0.26045107	0.240836917	0.432439659
病院 診療所 P値	0.225704693	0.035667308	0.916132422	0.056106886

病院・診療所計 請求合計に対する合計の割合

	うちレグパラほか	レグパラ	ホスレノール	レミッチ
標本数	1,540	1,073	662	67
比率(%)	0.96%	0.56%	0.32%	0.08%
合計	4,108,443	2,393,900	1,381,938	332,605
請求合計	425,957,948	425,957,948	425,957,948	425,957,948